

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____

«___» _____ 20__ г.

Стандартная операционная процедура:

«ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ / КОМА»

Общие положения

Параметр	Содержание
Показания	Глюкоза < 3,9 ммоль/л (состояние); < 2,8 ммоль/л (кома)
Кто выполняет	Врач, фельдшер
Оснащение	Глюкометр, декстроза 40%, NaCl 0,9%, системы для инфузий
Документация	Карта вызова

Алгоритм по шагам

Шаг	Действие	Конкретно	Примечание
1	Глюкометрия	Обязательна при любом нарушении сознания	—
2	Если в сознании	Декстроза 40% — 20–60 мл перорально	—
3	Если без сознания	Катетеризация вены; Декстроза 40% — 50–100 мл в/в струйно	Вводить до восстановления сознания
4	После восстановления сознания	Декстроза 10% — 500 мл в/в капельно	30–40 кап/мин
5	Контроль	Повторная глюкометрия	—

Препараты

Препарат	Доза	Путь	Когда
Декстроза 40%	20–60 мл	перорально	В сознании
Декстроза 40%	50–100 мл	в/в струйно	Без сознания
Декстроза 10%	500 мл	в/в капельно	Поддержание
NaCl 0,9%	500 мл	в/в капельно	При необходимости

Тактика

Ситуация	Действие
Госпитализация	Обязательна при коме; транспортировка на носилках
Отказ от госпитализации	Актив на «03» через 2 часа; при повторном отказе — актив в ЛПУ