DEPI - Seminar 1

Variabile aleatoare și probabilități

- 1. Fie A o variabilă aleatoare continuă cu distribuția $\mathcal{U}[0, 6]$ (distribuție uniformă între 0 și 6).
 - a. Reprezentați grafic funcția densitate de probabilitate a lui A (distribuția lui A)
 - b. Calculați probabilitatea P(A > 1)
 - c. Calculați probabilitatea $P(A \in (0, 2))$
 - d. Reprezentați funcția de repartiție $F_A(x)$ și scrieți-i expresia matematică
 - e. Care e distribuția variabilei aleatoare B definită ca B = A 2?
 - f. Care e distribuția variabilei aleatoare C definită ca C = 3 * A?
- 2. Fie A o variabilă aleatoare continuă cu distribuția normală $\mathcal{N}(\mu=1,\sigma^2=20)$.
 - a. Calculați probabilitatea $P(A \in [2, 4])$
 - b. Care e distribuția variabilei aleatoare B definită ca B = A 2?
 - c. Care este valoarea maximă a distribuției $w_A(x)$, și pentru ce valoare x se atinge?
 - d. (**) Care e distribuția variabilei aleatoare C definită ca C = 3 * A?
- 3. Considerând că scorul IQ urmează o distribuție \mathcal{N} ($\mu = 100, \sigma = 15$), calculați:
 - a. Probabilitatea ca o persoană oarecare să aibă IQ > 130
 - b. Dacă populația globului este 8 miliarde, câți oameni au IQ mai mic decât 75
 - c. (**)Ce IQ minim trebuie să ai pentru a fi între primii 2\%?
- 4. Fie A o variabilă aleatoare discretă, cu valorile posibile $\{0,1,2,\dots 10\}$, toate având aceeași probabilitate.
 - a. Reprezentați grafic distribuția lui A
 - b. Calculați probabilitatea $P(A \in [3, 7]$
 - c. Care e probabilitatea ca A să fie număr impar?
- 5. Calculați probabilitatea ca 3 variabile aleatoare X, Y, Z, independente și identic distribuite (i.i.d) cu distribuția normală $\mathcal{N}(\mu = 1, \sigma^2 = 1)$ să fie pozitive simultan.

6. Calculați probabilitatea ca cel puțin una dintre trei variabilele aleatoare X,Y and Z i.i.d. $\mathcal{N}(-1,1)$ să fie pozitivă