

Метод Ритца (Рэля-Ритца) #2

Николай Животенко

niko.zvt@gmail.com

МГТУ им. Н. Э. Баумана — 19 июня 2020 г.

Введение



Информация: Вариационное исчисление – математическая дисциплина, посвящённая отысканию экстремальных (наибольших и наименьших) значений функционалов – переменных величин, зависящих от выбора одной или нескольких функций. Вариационное исчисление является естественным развитием той главы математического анализа, которая посвящена задаче отыскания экстремумов функций. Возникновение и развитие вариационного исчисления тесно связано с задачами механики, физики и других технических наук.

Ещё в античные времена появились первые вариационные проблемы, относящиеся к категории изопериметрических задач – например, задача Дидоны. Первый вариационный принцип сформулировал Герон Александрийский для траекторий отражённых световых лучей в работе «Катоптрика» (I в. н.э.). В средневековой Европе изопериметрическими задачами занимались И. Сакробоско (XIII в.) и Т. Брадвардин (XIV в.). После разработки анализа появились новые типы вариационных задач, в основном механического характера. Ньютон в «Математических началах натуральной философии» (1687 г.) решает задачу: найти форму тела вращения, обеспечивающую наименьшее сопротивление при движении в газе или жидкости при заданных размерах. Важной исторической задачей, давшей толчок к развитию современного варианта вариационного исчисления, стала задача о брахистохроне (1696 г.). Её быстрое решение сразу несколькими математиками показало огромные возможности новых методов. Среди других задач стоит отметить определение формы цепной линии, то есть формы равновесия тяжёлой однородной нити (1690 г.). Общих методов решения вариационных задач в этот период ещё не существовало, каждая задача решалась с помощью остроумных и не всегда безупречных геометрических рассуждений.

Решающий вклад в развитие вариационного исчисления внесли Леонард Эйлер и Жозеф Лагранж. Эйлеру принадлежит первое систематическое изложение вариационного исчисления и сам термин (1766 г.). Лагранж независимо получил многие основополагающие результаты и ввёл понятие вариации (с 1755 г.). На этом этапе были выведены уравнения Эйлера – Лагранжа.

Методы вариационного исчисления широко применяются в различных областях математики. Например, в дифференциальной геометрии с их помощью ищут геодезические линии и минимальные поверхности. В физике вариационный метод – одно из мощнейших орудий получения уравнений движения, как для дискретных, так и для распределённых систем, в том числе и для физических полей. Методы вариационного исчисления применимы и в статике.

Выделяют два основных типа методов решения вариационных задач. К первому типу относятся методы, сводящие исходную задачу к решению дифференциальных уравнений. Альтернативой являются так называемые прямые методы. Эти методы тем или иным способом решают исходную задачу по поиску функции в заданном классе, которая доставляла бы экстремальное значение заданному функционалу. Один из самых популярных методов этого класса — метод Ритца (также называемый методом Рэля-Ритца).

1 Вариационное исчисление

1.1 Понятие функционала

В курсе высшей математики вводилось понятие функции. Если некоторому числу x из области D ставится в соответствие по определённому правилу или закону число y , то говорят, что задана функция $y = f(x)$. Область D называют областью определения функции $f(x)$.

Если же функции $y(x)$ ставится в соответствие по определённому правилу или закону число J , то говорят, что задан функционал $J = J[y]$. Примером функционала может быть определённый интеграл от функции $y(x)$ или от некоторого выражения, зависящего от $y(x)$,

$$J[y] = \int_a^b y(x) dx, \quad (1)$$

$$J[y] = \int_a^b [y''(x) + P(x)y'(x) + q(x)y(x)] dx. \quad (2)$$

Если теперь функции $y(x)$ ставится в соответствие по определённому правилу или закону вновь функция $z(x)$, то говорят, что задан оператор $z = L(y)$ или $z = Ly$. Примерами дифференциальных операторов могут служить:

$$Ly = y'' + P(x)y' + q(x)y, \quad (3)$$

$$Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}. \quad (4)$$

Дадим более строгое определение функционала. Пусть A – множество элементов произвольной природы, и пусть каждому элементу $u \in A$ приведено в соответствие одно и только одно число $J[u]$. В этом случае говорят, что на множестве A задан функционал J . Множество A называется областью определения функционала J и обозначается через $D(J)$; число $J[u]$ называется значением функционала J на элементе u . Функционал J называется вещественным, если все его значения вещественны. Функционал J называется линейным, если его область определения есть линейное множество и если

$$J[\alpha u + \beta v] = \alpha \cdot J[u] + \beta \cdot J[v]. \quad (5)$$

1.2 Задачи, приводящие к экстремуму функционала

Зарождение вариационного исчисления относят обычно к 1696 году, когда И. Бернулли поставил так называемую задачу о брахистохроне: определить форму кривой, лежащей в вертикальной плоскости, по которой тяжёлая материальная точка, двигаясь под действием только одной силы тяжести и не имеющая начальной скорости, перейдёт из верхнего положения A в нижнее положение B за минимум времени, рисунок 1. Эта задача сводится к отысканию исходной функции $y(x)$ – брахистохроны.




Рис. 1: Задача о брахистохроне

Пусть уравнение кривой AB есть $y = u(x)$. Рассмотрим некоторый момент времени t , и пусть в этот момент движущаяся точка находится на расстоянии y от оси x . Тогда $v = \sqrt{2gy}$, где v – скорость движущейся точки, g – ускорение свободного падения. В то же время:

$$v = \frac{dS}{dt} = \sqrt{1 + u'^2} \frac{dx}{dt}, \quad (6)$$

отсюда следует, что

$$dt = \sqrt{\frac{1 + u'^2}{2gu}} dx, \quad (7)$$

Обозначим через T время, в течение которого материальная точка достигает точки B . Интегрируя, находим

$$T = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^a \sqrt{\frac{1 + u'^2}{u}} dx. \quad (8)$$

Задача сводится к следующему: надо найти функцию $y = u(x)$, удовлетворяющую условию $u(0) = 0$, $u(a) = b$ и сообщающую интегралу наименьшее значение. Условия означают, что искомая кривая должна проходить через заданные точки A и B . Такого типа условия принято называть граничными, или краевыми, так как они относятся к концам промежутка, на котором должна быть определена искомая функция.



Информация: Данная задача относится к ветви математического анализа, называемой вариационным исчислением. Примером применения кривой в виде брахистохроны служит образующая цилиндрических поверхностей, используемых на детских площадках, в аттракционах для спуска с возвышения, на трамплинах.

1.3 Первая вариация функционала

Задача вариационного исчисления состоит в следующем: дан функционал J с областью определения $D(J)$; требуется найти элемент $u_0 \in D(J)$, сообщающий функционалу либо минимальное значение, либо максимальное. Задача о максимуме функционала J тождественна с задачей о минимуме функционала $-J$.

Будем рассматривать функционал J . Возьмём произвольный элемент $u \in D(J)$ и произвольный элемент $\eta \in M$. Обозначим через α произвольное вещественное число. Нетрудно видеть, что элемент $u + \alpha\eta \in D(J)$. Составим выражение $J[u + \alpha\eta]$. Данное выражение есть непрерывно дифференцируемая функция от α . Вычислим её производную и возьмём значение этой производной при $\alpha = 0$:

$$\frac{dJ[u + \alpha\eta]}{d\alpha}. \quad (9)$$

В результате получим число, которое можно рассматривать как значение функционала, зависящего от двух элементов u и η . Функционал

$$\frac{dJ[u + \alpha\eta]}{d\alpha} \cdot \alpha \quad (10)$$

называется первой вариацией функционала J на элементе u и обозначается символом $\delta J[u, \eta]$:

$$\delta J[u, \eta] = \frac{dJ[u + \alpha\eta]}{d\alpha} \cdot \alpha. \quad (11)$$

При этом разность двух функций $u \in D(J)$ и $u_1 \in D(J)$ называют вариацией функции u и обозначают $\delta u = u(x) - u_1(x)$.

1.4 Необходимое условие минимума функционала

Пусть функционал J достигает на некотором элементе u_0 относительного минимума. Возьмём произвольный элемент $\eta \in M$ и произвольное вещественное число α . По определению относительного минимума при достаточно малых значениях α

$$dJ[u_0 + \alpha\eta] \geq dJ[u_0]. \quad (12)$$

Это неравенство означает, что функция одной вещественной переменной α , равная $dJ[u_0 + \alpha\eta]$, имеет при $\alpha = 0$ относительный минимум. Но тогда необходимо, чтобы $\delta J[u_0, \eta] = 0$.



Важно! Если функционал в некоторой точке достигает минимума, то в этой точке первая вариация функционала равна нулю. В этом заключается необходимое условие экстремума функционала.

1.5 Уравнение Эйлера. Связь между вариационной и краевой задачами



Базовая версия леммы Лагранжа. Если непрерывная функция f на открытом интервале (a, b) удовлетворяет равенству

$$\int_a^b f(x) \cdot h(x) \cdot dx = 0$$

для всех финитных гладких функций h на (a, b) , тогда f является тождественным нулём.

Рассмотрим основную лемму вариационного исчисления - лемму Лагранжа. Пусть $f(x, y)$ – функция, непрерывная в области D с контуром Γ . Если непрерывной в области D вместе со своими частными производными до n -го порядка включительно и обращающейся в нуль на границе $\Gamma(\eta(x, y)|_{\Gamma} = 0)$, то $f(x, y) = 0$. Для примера, рассмотренного в главе , было получено в точке минимума функционала условие:

$$\delta J[u, \eta] = \int_a^b [\Phi'_u - \frac{d}{dx} \Phi'_u] \alpha \eta dx = 0. \quad (13)$$

Из леммы Лагранжа, можем записать

$$\Phi'_u - \frac{d}{dx} \Phi'_u = 0. \quad (14)$$

Уравнение 14 называют уравнением Эйлера. Если предположить существование непрерывной второй производной от $u(x)$, то уравнение можно записать в виде:

$$\Phi''_{u'u'} \cdot u'' + \Phi''_{uu'} \cdot u' + \Phi''_{xu'} - P h'_u = 0. \quad (15)$$

Таким образом, условие минимума функционала при краевых условиях приводит к краевой задаче для уравнения Эйлера при тех же краевых условиях. Иными словами, существует тесная связь между вариационной задачей о минимуме функционала и краевой задачей для уравнения Эйлера для этого функционала.



Важно! Решения уравнения Эйлера для функционала, удовлетворяющие краевым условиям, называют экстремалами функционала.

1.6 Пути решения вариационных задач

Один из путей решения вариационной задачи, т. е. задачи нахождения минимума некоторого функционала $J[u]$ при заданных краевых условиях, состоит в сведении этой задачи к краевой задаче для дифференциального уравнения при тех же краевых условиях, которое является уравнением Эйлера для этого функционала, с последующим решением этой задачи.

Второй путь решения вариационной задачи состоит в применении прямых методов, которые позволяют приближённо найти функцию u_0 , дающую минимум функционалу $J[u]$ и удовлетворяющую заданным краевым условиям.

2 Прямые методы вариационного исчисления

Основным вопросом, возникающим в связи с любой вариационной проблемой, является вопрос о существовании решения. Классические методы вариационного исчисления приводят этот вопрос в первую очередь к вопросу о существовании решения дифференциального уравнения. При этом ищется решение не в окрестности какой-либо точки, а во всей области - при определённых краевых условиях (решение в целом). Доказательство существования таких решений теория дифференциальных уравнений даёт лишь в редких случаях. Это обстоятельство заставило искать другие подходы к вариационным проблемам и привело к созданию так называемых прямых методов.

Прямые методы вариационного исчисления оказались полезными и для теории дифференциальных уравнений. Действительно, если некоторое дифференциальное уравнение можно рассматривать, как уравнение Эйлера для некоторого функционала и если каким-то приёмом установлено, что этот функционал имеет экстремум в классе достаточное число раз дифференцируемых функций, то тем самым доказано, что исходное дифференциальное уравнение имеет решение в целом при рассматриваемых краевых условиях. Так как прямой метод состоит в построении последовательности функций, сходящейся к искомой функции, то с помощью прямого метода не только устанавливается существование решения в целом, но и даётся некоторый способ для приближённого построения этого решения.

2.1 Метод Ритца

Одним из важнейших практических методов для построения минимизирующих последовательностей является метод, предложенный в 1908 году Вальтером Ритца. Состоит он в следующем. Вычисляется n -ое приближение к минимизируемой функции $u_0(x)$ в виде

$$u_n(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \varphi_i(x), \quad (16)$$

Здесь значение функционала $J[u]$ рассматривается не на произвольных допустимых кривых данной вариационной задачи, а лишь на всевозможных линейных комбинациях с постоянными коэффициентами. Коэффициенты составлены из n первых функций некоторой выбранной последовательности функций

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \varphi_3(x), \dots, \varphi_n(x). \quad (17)$$



Информация: Данные функции часто называют координатными, базисными или финитными.

На линейных комбинациях функционал $J[u]$ превращается в функцию $\varphi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ коэффициентов $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Эти коэффициенты выбираются так, чтобы функция $\varphi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ достигала экстремум. Следовательно, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ должны быть определены из условий стационарности, то есть из системы

$$\frac{d\varphi}{d\alpha_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (18)$$

Получившаяся в результате последовательность функций сходится к минимуму по функционалу. Заканчивая процесс вычислений, получают значение $J[\tilde{\varphi}]$, приближённо равное глобальному минимуму (при этом сама функция $\tilde{\varphi}$ может сильно отличаться от оптимальной).

На практике последовательность финитных функций $\{\varphi_n\}$ обычно строят с помощью системы многочленов $1, x, x^2, x^3, \dots, x^n$ или системы тригонометрических функций $\sin(x), \sin(2x), \sin(3x), \dots, \sin(nx)$. Обе системы являются полными в пространстве непрерывных функций.

2.2 Практическое применение метода Ритца для решения вариационных задач

Имеем линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка:

$$\frac{d}{dx}(x^2 \frac{d\varphi}{dx}) - 2\varphi = -1 - \ln x^2. \quad (19)$$

Граничные условия, которого:

$$\text{А) } \varphi'(1) = 0, \varphi(2) = 1; \quad (20)$$

$$\text{В) } \varphi(1) = 0, \varphi(2) + \varphi'(2) = 1. \quad (21)$$

Решая исходное линейное дифференциальное уравнение

$$x^2 \varphi'' + 2x \varphi' - 2\varphi = -1 - \ln x^2. \quad (22)$$

получим общее решение дифференциального уравнения в виде:

$$\phi(x) = \frac{C_2}{x^2} + C_1 x + \frac{\ln x^2}{2} + 1 \quad (23)$$

$$\phi'(x) = -\frac{2C_2}{x^3} + C_1 + \frac{1}{x}. \quad (24)$$

Пользуясь граничными условиями составим системы уравнений из которых определим неизвестные коэффициенты и составим таблицу 1.

Граничные условия	Коэффициенты	Точные значения коэффициентов
$\varphi'(1) = 0$ $\varphi(2) = 1$	$C_1 = -\frac{1}{17} - \frac{8}{17} \ln 2$ $C_2 = \frac{8}{17} - \frac{4}{17} \ln 2$	$C_1 = -0.385010437910562$ $C_2 = 0.307494781044718$
$\varphi(1) = 0$ $\varphi(2) + \varphi'(2) = 1$	$C_1 = -\frac{1}{3} \ln 2 - \frac{1}{6}$ $C_2 = \frac{1}{3} \ln 2 - \frac{5}{6}$	$C_1 = -0.397715726853315$ $C_2 = -0.602284273146684$

Таблица 1: Точные коэффициенты

Исходные функции принимают вид

$$\text{А) } \phi(x) = \frac{0.307494781044718}{x^2} - 0.385010437910562x + \frac{\ln x^2}{2} + 1, \quad (25)$$

$$\text{В) } \phi(x) = -\frac{0.602284273146684}{x^2} - 0.397715726853315x + \frac{\ln x^2}{2} + 1. \quad (26)$$

Данные кривые будут единственными кривыми возможного экстремума функционала с данными граничными условиями (см. приложение ??).

$$I = \int_a^b f(x) dx. \quad (27)$$

```
hello.py

#!/usr/bin/python

import sys
sys.stdout.write("Hello World!\n")
```

Command Line

```
$ chmod +x hello.py
$ ./hello.py

Hello World!
```



Notice: In congue risus leo, in gravida enim viverra id. Donec eros mauris, bibendum vel dui at, tempor commodo augue. In vel lobortis lacus. Nam ornare ullamcorper mauris vel molestie. Maecenas vehicula ornare turpis, vitae fringilla orci consectetur vel. Nam pulvinar justo nec neque egestas tristique. Donec ac dolor at libero congue varius sed vitae lectus. Donec et tristique nulla, sit amet scelerisque orci. Maecenas a vestibulum lectus, vitae gravida nulla. Proin eget volutpat orci. Morbi eu aliquet turpis. Vivamus molestie urna quis tempor tristique. Proin hendrerit sem nec tempor sollicitudin.

Question 1

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

- (a) Do this.
- (b) Do that.
- (c) Do something else.

Algorithm 1: FastTwoSum

Input: (a, b) , two floating-point numbers

Result: (c, d) , such that $a + b = c + d$

```
if  $|b| > |a|$  then
    | exchange  $a$  and  $b$ ;
end
 $c \leftarrow a + b$ ;
 $z \leftarrow c - a$ ;
 $d \leftarrow b - z$ ;
return  $(c, d)$ ;
```

Question 2 (*with optional title*)

In congue risus leo, in gravida enim viverra id. Donec eros mauris, bibendum vel dui at, tempor commodo augue. In vel lobortis lacus. Nam ornare ullamcorper mauris vel molestie. Maecenas vehicula ornare turpis, vitae fringilla orci consectetur vel. Nam pulvinar justo nec neque egestas tristique. Donec ac dolor at libero congue varius sed vitae lectus. Donec et tristique nulla, sit amet scelerisque orci. Maecenas a vestibulum lectus, vitae gravida nulla. Proin eget volutpat orci. Morbi eu aliquet turpis. Vivamus molestie urna quis tempor tristique. Proin hendrerit sem nec tempor sollicitudin.