Tabla para test de Spearman (muestras chicas)

n	.100	.050	.025	.010	.005	.001
11	.427	.536	.618	.709	.764	.855
12	.406	.503	.587	.678	.734	.825
13	.385	.484	.560	.648	.703	.797
14	.367	.464	.538	.626	.679	.771
15	.354	.446	.521	.604	.657	.750
16	.341	.429	.503	.585	.635	.729
17	.329	.414	.488	.566	.618	.711
18	.317	.401	.474	.550	.600	.692
19	.309	.391	.460	.535	.584	.675
20	.299	.380	.447	.522	.570	.660
21	.292	.370	.436	.509	.556	.647
22	.284	.361	.425	.497	.544	.633
23	.278	.353	.416	.486	.532	.620
24	.275	.344	.407	.476	.521	.608
25	.265	.337	.398	.466	.511	.597
26	.260	.331	.390	.457	.501	.586
27	.255	.324	.383	.449	.492	.576
28	.250	.318	.376	.441	.483	.567
29	.245	.312	.369	.433	.475	.557
30	.241	.307	.363	.426	.467	.548

$$\mathbb{P}_{H_0}\left(|\rho_s| > c \right) = \alpha$$

"densidad" de ρ_s

$n = 17$

$\alpha = 0,05$

$0,025$

$0,025$

-1

$-0,488$

$0,488 = c$

1