



Heparin [2.18.0 - 26/09-2021] Tilføjelser Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

Heparin

Link til VIP-instruksen

Anvendelse

Indikation

STEMI i forbindelse med primær PCI (se instruks for AKS).

Dosis

10.000 IE, Kun efter aftale med Kardiolog

Indgiftsmåde

IV

Indgiftsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 1.000 IE heparin.
Ampulstørrelse: 10 ml hætteglas.

Vigtigt

Kontraindikationer

- Intrakraniel blødning
- Hæmoragisk diatese (øget blødningstendens)
- Akut ulcus ventriculi eller duodeni
- Udtalt leverinsufficiens
- Uræmi
- Svær hypertension

Bivirkninger

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Interaktioner

Samtidig indgift af andre stoffer, der påvirker trombocytfunktionen forstærker den antikoagulerende effekt

Særligt

Særlige forhold

Gives kun efter ordination fra kardiolog

Medikament

Farmakologi

Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer ved at forstærke virkningen af antitrombin. Hæmmer fortsat trombedannelse (blodpropsdannelse) i en allerede aktiveret koagulationsproces.

Farmakokinetik

Virker efter:

Virker straks efter intravenøs injektion

Virkningsvarighed:

Dosisafhængig

T_{1/2}:

40-150 minutter (dosisafhængig)

Holdbarhed

Se udløbsdato på hætteglas.

✓ Forstået

Ikke forstået