



Acetylsalicylsyre [4.62.0 - 26/09-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX



Vis sidehoved

# Acetylsalicylsyre

## Link til VIP-instruksen

### Anvendelse

#### Indikation

Ved mistanke om AKS

#### Dosis

300 mg

#### Indgiftsmåde

PO (tygges hvis muligt)

#### Indgiftsform

Tabletter á 150 mg.

### Vigtigt

#### Kontraindikationer

- Kendt allergi overfor acetylsalicylsyre / NSAID præparater
- Aktiv blødning

#### Bivirkninger

- Øget blødningstendens
- Mavesmerter
- Sure opstød
- Allergisk reaktion (herunder diarré, urticaria, angioødem, hypotension og/eller respirationsbesvær)

#### Interaktioner

Andre former for antikoagulantia (clopidogrel, prasugrel etc.) forstærker effekten af acetylsalicylsyre.

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

### Medikament

#### Farmakologi

Hæmmer blodpladernes tendens til at klæbe til karvæggen og til at klumpe sig sammen.  
Herved nedsættes risikoen for dannelse af blodpropper.

#### Farmakokinetik

Optages via mave-tarm kanalen og nedbrydes i leveren og udskilles i urinen.

T<sub>1/2</sub>:

2-3 timer

#### Holdbarhed

Se pakningen



Forstået

Ikke forstået