

Furosemid [2.24.0 - 26/09-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

# Furosemid

Link til VIP-instruksen

Anvendelse (kun paramedciner)

Indikation

Lungeødem/lungestase med BT >110 mmHg

Dosis

20 - 40 mg IV

- kan gentages efter 5 min op til en samlet maksimal dosis på 80 mg.

Indgiftsmåde

IV

Indgiftsform

Injektionsvæske. 10 mg/ml.  
Ampulstørrelse: 4 ml = 40 mg OG 5 ml = 50 mg

Vigtigt

Kontraindikationer

- Allergi over for furosemid.
- Allergi over for sulfonamider (fx sulfonamid- antibiotika eller sulfonylurin- $\rightarrow$ stoffer), kan udvise krydsallergi over for furosemid.
- Hypovolæmi eller dehydrering.
- Gravide og ammende kvinder.
- Lungeødem udløst af andre årsager, f.eks. pga. inhalation af gasser (klorgas eller lignende)

For lungeødem/lungestase:

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

- Hypotension
- Kvalme
- Øresusen/hørenedsættelse

Interaktioner

Ingen ved korrekt indikation.

Særligt

Særlige forhold

Nitrolingualspray er førstevalgsspræparat til behandling af både lungeødem/-stase.

Ved samtidig indgift af NTG og furosemid og evt. fentanyl, kan ses betydeligt blodtryksfald.

Vær opmærksom på at patienter med pneumoni, ofte kan have sekretophobning (sekretstagnation), der kan forveksles med lungeødem/lungestase. I disse tilfælde er furosemid **IKKE** indiceret.

Medikament

Farmakologi

Loop-diuretikum. Øger nyrernes blodgennemstrømning. Hæmmer reabsorptionen af salt og vand i nyrerne, hvorved saltudskillelsen i nyrerne øges.

Ved intravenøs indgift ses en næsten øjeblikkelig vasodilation i de centrale vener, således at fyldningstrykket til venstre ventrikel (preload) nedsættes.

Farmakokinetik

Der ses initialt et blodtryksfald, hvorefter effekten af den øgede væskeudskillelse først kommer i løbet af halve til hele timer.

Virker efter:

Maksimalt 5-7 minutter.

Virkningsvarighed:

2-4 timer

T<sub>1/2</sub>:

0,5-2 timer

Holdbarhed

Se udløbsdato på ampul.

✓ Forstået

Ikke forstået