

Paracetamol [1.13.0 - 18/01-2023]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

Vis sidehoved

Paracetamol

[Link til VIP-instruksen](#)

Anvendelse

Indikation

Smertebehandling: Voksne og børn med svage smerter (smertescorre ≤4) og/eller kombinationsbehandling med NSAID og fentanyl ved moderate og stærke smerter.

Federnedsættende behandling: Voksne og børn med feber

Dosis

Voksne ≥ 12 år (50 kg):

1000 mg PO :

Børn > 11 år (40 kg):

500 mg

Børn ≥ 5 år (20 kg):

250 mg

Indgiftsmåde

PO

Indgiftsform

Tabletter á 500 mg (delekærv)

Vigtigt

Kontraindikationer

- Børn < 5 år
- Kendt allergi overfor paracetamol

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

- Indtag af paracetamol indentor 6 timer

Bivirkninger

- Allergiske reaktioner
- Kvalme / opkast

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin

Særligt

Særlige forhold

Paracetamol er et godt valg ved svage knogle-, ligament- og muskelsmerter, suppleret med ibuprofen opnås bedre effekt.

Tabletten kan knuses og blandes med en lille mængde mad, for at lette administrationen, til patienter der føler ubehag ved tabletbehandling

Man kan i udvalgte tilfælde, hvis patienten afsluttes på stedet, udlevere paracetamol svarende til 2 doser, såfremt patienten ikke selv har paracetamol.

Medikament

Farmakologi

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscenteret i hypothalamus

Farmakokinetik

Optages proximalt i tyndtarmen og nedbrydes i leveren og udskilles gennem nyrerne.

T_{1/2}:

2-3 timer

Holdbarhed

Se pakning

✓ Forstået

Ikke forstået