

Solu-medrol [1.26.0 - 18/01-2023]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

Solu-medrol

Link til VIP-instruksen

Anvendelse (kun paramedciner)

Astma og KOL

Indikation

Svært påvirkede Astma og KOL patienter i akut eksacerbation hvor der er indikation for indlæggelse.

Dosis

Voksne:

40 mg IV

Anafylaksi

Indikation

Anafylaksi ved refraktære reaktioner eller ved vedvarende astma/shock

Dosis

Voksne:

80 mg IV

Børn < 25 kg:

2 mg/kg (max 80 mg)

- Ved børn kun efter konference med AMK-læge

Indgiftsmåde

IV

Indgiftsform

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Kontraindikationer

- Graviditet/amning
- Mælkeallergi
- Kramper
- Infektiose tilstande

(Bivirkningerne er afhængige af dosis og behandlingsvarighed)

Bivirkninger

Ingen bivirkninger i den akutte fase

Interaktioner

- Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning
- Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika

Særligt

Særlige forhold

Brugsanvisning for todelt hætteglas:

1.

Tryk plastikhætten hårdt nedad, så solvensen løber ned i underste del af hætteglasset.
2.




Ryst hætteglasset indtil pulveret er opløst.
3.

Fjern den runde plastikbeskytter, der dækker gummimembranen.
4.

Desinficer gummimembranen.
5.

Stik kanylen vinkelret ind igennem midten af gummimem indtil spidsen af kanylen er synlig.
6.

Vend hætteglasset om og træk den ønskede dosis op.



VIGTIGT! Rutinemæssig brug af Solu-medrol ved behandling af anafylaksi anbefales ikke.

Medikament

Farmakologi

Antiinflammatorisk virkning: Nedsætter organismens respons på infektioner/inflammationer og allergiske reaktioner.

Farmakokinetik

Metaboliseres hovedsagligt via CYP3A4 til inaktive metabolitter og udskilles via nyrene.

Virker efter:

4-8 timer

T_{1/2}:

3-4 timer

Holdbarhed

Se udløbsdato på hætteglas

✓ Forstået

Ikke forstået