

Ondansetron [3.19.0 - 05/09-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

Ondansetron

Link til VIP-instruksen

Anvendelse

Indikation

Behandlingskrævende kvalme og/eller opkastning.

Dosis

Voksne:

4 mg

- Kan gentages én gang, til samlet maksimal dosis på 8 mg.

Børn > 2 år:

0,1 mg/kg

- Må ikke gentages uden forudgående konference med AMK-læge.

Indgiftsmåde

Langsomt IV over 2 minutter.

Indgiftsform

Injektionsvæske. 2 mg/ml ondansetron i sterilt vand.

Ampulstørrelse: 2 ml

Vigtigt

Kontraindikationer

Børn under 2 år, kendt allergi overfor ondansetron.

Bivirkninger

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

- Hovedpine
- Arytmi
- Hypotension
- Bradykardi
- Brystsmerter
- Muskelkramper
- Ekstrapyramidale gener (f.eks. dystoni)
- Allergiske reaktion/ anafylaksi

Interaktioner

Mulig krydsallergi med andre lignende 5-HT3-antihistaminer.

Særligt

Særlige forhold

Risiko for arytm, hypotension og dystoni øges ved hurtig indgift IV.

Medikament

Farmakologi

Antiemetika. Serotoninantagonist af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning.

Farmakokinetik

Metaboliseres i leveren. Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

T½:

Ca. 3 timer

Holdbarhed

Se udløbsdato på ampul

✓ Forstået

Ikke forstået