


Thiamin [2.18.0 - 17/10-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

 Vis sidehoved

Thiamin

[Link til VIP-instruksen](#)

Anvendelse

Indikation

Ved indgift af Glukose IV/PO eller Glukagon IM og samtidig mistanke om thiaminmangel.

Dosis

200 mg

Indgiftsmåde

IM

Indgiftsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg thiaminhydrochlorid i sterilt vand

Vigtigt

Kontraindikationer

Ingen ved korrekt indikation

Bivirkninger

I sjældne tilfælde ses anafylaktiske reaktioner

Interaktioner

Ingen kendte

Særligt

Særlige forhold

Skal ALTID indgives intramuskulært, da intravenøs administration kan medføre blodtryksfald.

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Glukoseindgift til patient med thiaminmangel kan medføre Wernickes encephalopati, præget af bl.a. bevidsthedsforstyrrelser, konfusion, sløvhed, og nedsat hukommelse, især korttidshukommelse, styringsbesvær af ekstremiteter mv.

Medikament

Farmakologi

Thiamin indgår og virker som co-enzym i kulhydratmetabolismen, hvilket bl.a. har betydning for nervesystemets funktion. Thiamin er et vandopløseligt vitamin og overskydende molekyler udskilles med urinen

Virkningsvarighed: Varierer da thiamin metaboliseres i leveren og kun en lille del optages (ca. 5 %).

Ved indgivelse af større doser ses både uomdannet og omdannet thiamin udskilt via urinen.

Farmakokinetik

Virker hurtigt efter IM administration og 1 dosis er nok.

T_{1/2}:

Individuelt

Holdbarhed

Se udløbsdato på ampul.

✓ Forstået

Ikke forstået