


Solu-cortef [1.17.0 - 04/07-2025]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

 Vis sidehoved

Solu-cortef

[Link til VIP-instruksen](#)

Anvendelse

Indikation

Mistanke om akut binyrebarkinsufficiens, fx ved Addison-krise

Dosis

> 6 år:

100 mg IV

Barn 1-6 år:

50 mg IV umiddelbart over ca. 30 sek

Barn < 1 år:

25 mg IV umiddelbart over ca. 30 sek

Indgiftsmåde

IV

Indgiftsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i to-delt hætteglas. (100mg/hætteglas)

Vigtigt

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstof. I øvrigt ingen absolutte.

Bivirkninger

Ingen i den akutte fase

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Særligt

Særlige forhold

Brugsanvisning i to-delt hætteglas:

- Tryk plastikhætten hårdt nedad, så solvensen løber ned i underste del af hætteglasset.
- Ryst hætteglasset indtil pulveret er opløst.
- Fjern den runde plastikbeskytter, der dækker gummimembranen.
- Desinficer gummimembranen.
- Stik kanylen vinkelret ind igennem midten af gummimem indtil spidsen af kanylen er synlig.
- Vend hætteglasset om og træk den ønskede dosis op.

Medikament

Farmakologi

Substituerer kroppens manglende/utilstrækkelige egen glucocortioide produktion ifm. Addison-krise. Hydrocortison er det naturlige glukokortikoid med relativt stærk mineralkortikoid-virkning.

Farmakokinetik

Stoffet har en plasmahalveringstid på ca. 2 timer. Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Holdbarhed

Se udløbsdato på hætteglas.

✓ Forstået

Ikke forstået