

Ibuprofen [1.13.0 - 18/01-2023]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

Vis sidehoved

Ibuprofen

Link til VIP-instruksen

Anvendelse

Indikation

Smertebehandling:

Voksne og børn med svage smerter (smertescore ≤ 4) og/eller kombinationsbehandling med Paracetamol og fentanyl ved moderate og stærke smerter.

Febernedsættende behandling:

Voksne og børn med feber

Dosis

Voksne ≥ 12 år (40 kg):

400 mg PO

Indgiftsmåde

PO

Indgiftsform

Tabletter a 400 mg (delekærv)

Vigtigt

Kontraindikationer

- Børn < 12 år:
- Kendt allergi overfor NSAID
- Aktuel ulcer eller gastro-intestinal blødning
- Stærkt nedsat leverfunktion eller nyresygdom
- Nedsat synkereflex
- Svær hypertension

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Bivirkninger

- Abdominalsmerter
- Diaré
- Gastro-intestinal blødning
- Hæmatemese
- Melæna
- Træthed
- Kvalme / opkast
- Allergiske reaktioner

Interaktioner

Særligt

Særlige forhold

Ibuprofen / NSAID er et godt valg ved smerter udløst af inflammation, nyre- og galdesten, rheumatoid arthritis og postoperative smerter, suppleret med paracetamol opnår bedre effekt.

Vær forsigtig hos ældre og patienter i AK-behandling eller der er i høj risiko for hjerte-kar sygdom eller ulcer

Man kan i udvalgte tilfælde, hvis patienten afsluttes på stedet, udlevere ibuprofen svarende til 2 doser, såfremt patienten ikke selv har ibuprofen

Medikament

Farmakologi

NSAID virker antiinflammatorisk, anagetisk og trombocyttaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX).

Farmakokinetik

Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og metaboliseres i leveren og udskilles gennem nyrene

T_{1/2}:

1½-2 timer

Holdbarhed

Se pakning

✓ Forstået

Ikke forstået