



Labetalol [2.2.0 - 16/09-2025]

Tilføjelser

Slettede dele

DX



Vis sidehoved

Labetalol

Link til VIP-instruksen

Anvendelse (kun paramedciner)

Indikation

Interhospital transport af patient med akut hypertensiv tilstand ifm. apoplexia cerebri.

Dosis

Ordination følger altid afgivende afdeling, evt. i samråd med AMK-læge.

Standarddosering (til reference):

Fastsættes af afsendende læge, men vil typisk ligge på 1-2 mg/min eller 0,2-0,4 ml/min.

Indgiftsmåde

IV via sprøjtepumpe i 50/60 ml sprøjte.

Indgiftsform

Intravenøs infusionsvæske hvor labetalol er opblandet med isoton glukose 5% eller isotonisk natriumklorid 0,9%.

Må ikke gives med andre farmaka i samme PVK.

Vigtigt

Kontraindikationer

Interhospital transport af patienter med andre tilstande end apoplexia cerebri.

Bivirkninger

Hypotension, bradykardi, postural synkope (ortostatisk hypotension), bronkospasme, træthed, kvalme, hypoglykæmi ved faste tilstande.

Interaktioner

Afsendede afdeling har taget stilling til eventuelle interaktioner.

Dokumentation

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Særlige forhold

Vær særlig opmærksom på:

Blodtryk puls monitoreres omhyggeligt, og ved NIBP skal det måles hvert 5. minut.

Ved tvivl eller komplikationer under transport kontaktes AMK-L.

Referencer

Den nationale neurologiske behandlingsvejledning: nnbv.dk

Medikament

Farmakologi

Labetalol er en kombineret non-selektiv beta-blokker og selektiv alfa₁-blokker. Det sænker blodtrykket ved at reducere den perifere karmodstand (via alfa-blokade) og dæmpe hjertefrekvens og kontraktilitet (via beta-blokade). I modsætning til rene alfa-blokkere medfører det sjældent reflektorisk takykardi.

Farmakokinetik

T_{1/2}: 5-8 timer

Virkningsvarighed: ca. 4 timer

Efter IV indgift indtræder virkningen øjeblikkeligt