



Hypo-Fit [2.22.0 - 17/10-2021] Tilføjelser Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

Hypo-Fit

Link til VIP-instruksen

Anvendelse

Indikation

Vågen patient med mistanke om hypoglykæmi, som kan samarbejde om peroral indtagelse.

Det er den kliniske tilstand, der sammen med et lavt BS afgør behandlingsform.

Dosis

Tube indeholdende 18 g glukose gel

- Kan evt. gentages.

Indgiftsmåde

PO

Indgiftsform

Gel suppleret med kildevand

Vigtigt

Kontraindikationer

- Bevidstløshed
- Patienter med risiko for fejlsynkning

Bivirkninger

- Kvalme
- Opkastning
- Hyperglukæmi

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Særligt

Særlige forhold

- Opmærksomhed ved stærkt nedsat bevidsthed.
- Ved risiko for fejlsynkning skal Glukose 50% IV eller glukagon anvendes i stedet.
- Gelen skal synkes, da det ikke optages fuldstændigt i mundhulen.
- Følg særskilt instruks for "Afsluttet på stedet", såfremt patienten ikke transporteres til hospital.

Medikament

Farmakologi

Efter absorption fra slimhinden i mundhulen og mave-tarm kanalen bliver glukosen fordelt i vævet og øger blodsukkerkoncentrationen.

Farmakokinetik

Virker efter:

Hurtigt efter oral administration, men det er individuelt hvornår virkning indtræder.

T_{1/2}:

Individuelt

Holdbarhed

Se udløbsdato på beholder

✓ Forstået

Ikke forstået