


Clemastin [2.24.0 - 26/09-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

 Vis sidehoved

# Clemastin

Link til VIP-instruksen

Anvendelse (kun paramedciner)

Indikation

Anafylaksi, allergiske reaktioner, herunder urticaria og angioødem.

Dosis

2 mg IV/IM

- Må ikke gentages

Indgiftsmåde

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 1 mg clemastin.

Ampulstørrelse: 2 ml

Indgiftsform

IV, alternativt IM.

Vigtigt

Kontraindikationer

Børn under 10 år eller 30 kg.

Bivirkninger

- Døsighed
- Svimmelhed
- Mundtørhed
- Fordøjelsesbesvær
- Hovedpine

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Interaktioner

Andre antihistaminer, MAO-hæmmere, hypnotika (f.eks. diazepam, midazolam), antipsykotika og alkohol kan forstærke hinandens virkning – herunder den sederende effekt.

Særligt

Særlige forhold

Forsigtig anvendelse ved Glaukom (grøn stær), Prostatahyperplasi (forstørret prostata) med vandladningsbesvær, Myasthenia gravis

Patienter skal orienteres om forsigtighed ved kørsel de efterfølgende 24 timer efter indgift af clemastin.

Ved lettere allergiske reaktioner (f.eks. urticaria og kløe, men uden hævelse i luftveje) er 1 mg normalt tilstrækkelig til at afhjælpe symptomerne.

Medikament

Farmakologi

Hindrer histamins binding på receptorerne, hvorved den allergiske reaktion mindskes.

Virker overvejende ved H1-receptorblokerende virkning.

Farmakokinetik

Virker efter:

Hurtigt efter indgift (dog lidt forsinket ved IM).

Virkningsvarighed:

8-12 timer

T½:

21 timer

Holdbarhed

Se udløbsdato på ampul.

✓ Forstået

Ikke forstået