

Midazolam [2.19.0 - 17/10-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

Vis sidehoved

Midazolam

[Link til VIP-instruksen](#)

Anvendelse

Indikation

Partielle eller generaliserede kramper (børn og voksne).

Dosis

Voksne og børn > 10 år:

10 mg

Børn mellem 1-10 år:

5 mg

Børn mellem 3 mdr. og 1 år:

2,5 mg

- Må gentages én gang efter 5 minutter

Indgiftsmåde

Oralt. Opløsningen indsættes langsomt i hulrummet mellem gummer og kind.

Ved større doser fordeles dosis i begge sider af munden.

Sprøjten skal anvendes uden kanyle.

Indgiftsform

Mundhulevæske, opløsning. 1 oral sprøjte indeholder:

5 mg/ml

Vigtigt

Kontraindikationer

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Bivirkninger

- Respirationsdepression
- Blodtryksfald

Interaktioner

Følgende forstærker effekten af midazolam og kan føre til yderligere respirationsdepression og blodtryksfald:

- Alkohol
- Hypnotika
- Morfika
- Anæstesipræparater
- Antihistamin

Særligt

Særlige forhold

Konference med AMK hvis ingen effekt efter gentagelse af dosis.

Buccolam findes i to størrelser: 10mg og 5mg

Hvis et barn under 1 år skal have Buccolam® skal der gives ½ dosis af 5 mg orale sprøjte. Dette gøres ved at trække ½ ml Buccolam® (2,5 mg) ud af sprøjtespidsen, ved brug af en alm. 1 ml sprøjte og kanyle. Kanylen afmonteres sprøjten FØR medicinen administreres til patienten.

Der anlægges IV adgang så snart det er muligt i forhold til kramperne.

I alle tilfælde hvor der gives midazolam, skal ambulancemandskabet være særligt opmærksom på patientens respiratoriske status, herunder iltbehandling, evt. behov for nasal airway eller oropharyngeal tungeholder og evt. ventilation.

Den gennemsigtige ”tip-hætte” på BUCCOLAM påfyldte injektionssprøjter kan sommetider blive siddende fast på sprøjtespidsen, når den røde hætte trækkes af, hvilket medfører en risiko for, at den ender i patientens mund. Dette medfører risiko for, at den indåndes eller indtages efter administration. Hvis den gennemsigtige ”tip-hætte” bliver siddende fast på sprøjten, skal den fjernes manuelt, inden lægemidlet administreres.

Antidot (akutlægebil):

Antidoten er flumazenil (Lanexat®). Anbefalede doser er i forhold til alderssvarende vægt

Medikament

Farmakologi

Binder sig til GABA-A-receptorerne i hjernen og forstærker virkningen af neurotransmitteren GABA. Derved hæmmes en række nerveimpulser - og på denne måde virker midazolam muskelafslappende, beroligende og angstdæmpende.

Farmakokinetik

Absorberes hurtigt via mundslimhinde og blod-hjerne barriere til henholdsvis blod og cerebrospinalvæske.

Protein-binding: 95 %. Metaboliseres i leveren.

Virker efter:

Virkningen indtræder efter få minutter og maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter.

T½:

2 – 4 timer, forøget hos ældre patienter.

Holdbarhed

Se udløb på beholder.

✓ Forstået

Ikke forstået