

Salbutamol [2.19.0 - 07/11-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

Vis sidehoved

Salbutamol

Link til VIP-instruksen

Anvendelse

Indikation

Bronkospasme (Forlænget expiration)

Dosis

Børn 1 – 12 år:

2,5 mg salbutamol (2,5 ml)

- Kan gentages maksimalt tre gange.
- Ved behov for yderligere behandling, kontakt da AMK-lægen.

Indgiftsmåde

Inhalation via nebulisator med ilttilskud (6-8 l/min).

Indgiftsform

Inhalationsvæske i ampuller 1 mg/ml. Ampulstørrelse 2,5 ml.

Vigtigt

Kontraindikationer

Betydelig takykardi

Bivirkninger

- Tremor
- Takykardi
- Hovedpine
- Arytmi

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Særligt

Særlige forhold

Vær opmærksom på patienter med kendt iskæmisk hjertesygdom, takyarytmi og/eller hjertesvigt.

Patienten skal EKG monitoreres (4 afledninger) og have målt EKG12.

En høj puls har indvirkning på fyldning af hjertet. Derfor skal behandling afbrydes såfremt patientens tilstand bliver cirkulatorisk forværret af Salbutamol-behandlingen (fx hvis patienten udvikler pludselig hypotension, brystmerter, kold/koldsvedende hud eller bliver bevidsthedssvækket).

Medikament

Farmakologi

Sympatomimetikum. Binder sig til β2-receptorene i bronkier og bronkioler og giver en afslappende effekt i de nedre luftveje.

Farmakokinetik

10-20% af væsken når nedre luftveje ved inhalation. Optages hurtigt gennem luftvejenes slimhinder. Virker i ca. 30 minutter. Nedbrydes i leveren til aktive metabolitter og udskilles senere gennem urinen.

Virkningsvarighed:

Ca. 30 minutter

T½:

4 – 6 timer

Holdbarhed

Producentens anvisning for holdbarhed følges. Salbutamol kan kun anvendes i 3 måneder efter at foliepakningen med enkeltdosisbeholderne er åbnet. Skriv derfor altid åbningsdato på foliepakningen. Udløbsdatoen er 3 måneder frem fra åbningsdatoen af foliepakningen.

✓ Forstået

Ikke forstået