

Glukagon [2.20.0 - 17/10-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

Vis sidehoved

Glukagon

Link til VIP-instruksen

Anvendelse

Indikation

Kliniske tegn på hypoglykæmi og BS <3,9 mmol/l i situationer, hvor pt. ikke kan samarbejde til peroral indgift af kulhydrater

Det er den kliniske tilstand, der sammen med et lavt BS afgør behandlingsform.

Dosis

Voksne og børn over 6 år:

- 1 mg
- Kan gentages én gang efter 10 minutter

Børn 1½ - 6 år:

- 0,5 mg
- Kan gentages én gang efter 10 minutter

Indgiftsmåde

IM

Indgiftsform

Injektionsvæske 1 ml og pulver 1 mg, blandes i sprøjte.

Vigtigt

Kontraindikationer

Kendt allergi overfor indholdsstofferne

Bivirkninger

- Kvalme

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

- Hjertebanken
- Allergiske reaktioner.

Interaktioner

Ikke aktuelt ved relevant indikation.

Særligt

Særlige forhold

Bør kun gentages ved ingen effekt af første behandling og anden glukosebehandling (fx Glukose IV) ikke er muligt.

Vågner patienten op og har intakte synke/svælgreflekser, gives hurtigt absorberbare kulhydrater peroralt, i form af dextrosetabletter eller gel, samt langsomt absorberbare kulhydrater som fx groft brød.

Patientens egne glukosedepoter reduceres betydeligt efter indgift af glukagon, hvorfor efterfølgende indtag/indgift af langsomt absorberbare kulhydrater er vigtigt.

Vær særlig opmærksom på hypotermi, samt at overdosis med betablokkere kan forårsage hypoglykæmi.

Børn med mistanke om hypoglykæmi skal altid konfereres med AMK-læge efter indledt behandling.

Medikament

Farmakologi

Forhøjer blodsukkerniveauet, ved at frigive glykogen fra depoter i leveren. Glukagon er et naturligt forekommende hormon, der dannes i bugspytkirtlen.

Farmakokinetik

Optages i blodkarrene i musklen. Nedbrydes i leveren og udskilles i urinen.

Virker efter:

5-10 minutter

T½:

10 minutter

Holdbarhed

18 måneder uden for køleskab. Brugsfærdig blanding skal anvendes umiddelbart.

✓ Forstået

Ikke forstået