

Berodual [1.13.0 - 23/05-2024]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

Berodual

[Link til VIP-instruksen](#)

Anvendelse

Indikation

Bronkospasme (Forlænget expiration)

Dosis

Voksne og børn >12 år:

0,5 mg ipratropiumbromid og 1,25 mg Fenoterol (4 ml)

- Kan gentages maksimal tre gange.
- Ved behov for yderligere behandling, kontakt da AMK-lægen.

Indgiftsmåde

Inhalation via nebulisator med ilttilskud (6-8 l/min).

Indgiftsform

Inhalationsvæske i ampuller. Ampulstørrelse 4 ml.

Vigtigt

Kontraindikationer

Ubehandlet takyarytmi.

Bivirkninger

- Hoste
- Tremor
- Takykardi
- Hovedpine

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Samtidig brug af β -blokkere kan hæmme effekten af berodual.

Særligt

Særlige forhold

Vær opmærksom på patienter med kendt iskæmisk hjertesygdom, takyarytmi og/eller hjertesvigt.

Patienten skal EKG monitoreres (4 afledninger) og have målt EKG12.

En høj puls har indvirkning på fyldning af hjertet. Derfor skal behandling afbrydes såfremt patientens tilstand bliver cirkulatorisk forværret af berodual behandlingen (fx hvis patienten udvikler pludselig hypotension, brystmerter, kold/klamsvedende hud eller bliver bevidsthedssvækket).

Medikament

Farmakologi

Fenoterol:

Korttidsvirkende β 2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β 2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Ipratropium:

Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Den terapeutiske effekt af berodual opnås maksimalt inden for 30 minutter, og virkningsvarigheden er ca. 6 timer.

Holdbarhed

Se udløbsdato på ampul.

✓ Forstået

Ikke forstået