



Oxytocin [1.4.0 - 10/07-2024] Tilføjelser Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

Oxytocin

Link til VIP-instruksen

Anvendelse

Indikation

Blødningsprofylakse hos den fødende kvinde efter barnets fødsel.

Dosis

10 IE. Må ikke gentages.

Indgiftsmåde

IM

Indgiftsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 10 IE oxytocin (syntetisk) Ampulstørrelse: 1 ml

Vigtigt

Kontraindikationer

Kendt allergi overfor oxytocin, svær svangerskabsforgiftning, kendt QT-syndrom

Bivirkninger

Takykardi, bradykardi, kvalme, opkastning, hovedpine

Interaktioner

Prostaglandiner øger følsomheden for oxytocin. Den øgede effekt er ønskelig ved svær post partum blødning

Særligt

Særlige forhold

Oxytocin har til formål at fremme uteruskontraktioner og forebygge eller behandle postpartum blødning, ikke til at fremkalde eller forstærke veer.

Oxytocin er anbefalet til alle fødende efter barnets fødsel.

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Aktiverer oxytocinreceptorer i livmodermuskulaturen, og frigiver calcium, som fører til sammentrækninger i uterus.

Farmakokinetik

Metaboliseres i leveren. Ca. 30% udskilles uomdannet i nyrerne.

Virkningsvarighed: 30-60 min.

T_{1/2}: ca. 3-5 min. ved IM-indgift

Holdbarhed

Holdbarhed efter udtagelse fra køleskab på hospitalet er 3 måneder. Justeret dato for udløb efter udtag fra køleskab står på pakken, og skal via label (ligger i medicin skab) overføres til ampullen.

✓ Forstået

Ikke forstået