

Natrium-klorid (NaCl iso) [2.20.0 - 05/09-2021] Tilføjelse Slettede dele

DX

Vis sidehoved

Natrium-klorid

[Link til VIP-instruksen](#)

Anvendelse

Indikation

Præ-shock, shock, hypotension, hypovolæmi, rehydrering, dykkersyge, gennemskyldning af IV-adgang og skyl af brandsår.

Dosis

Voksne: op til 2000 ml (uanset årsag), så længe der er indikation for væsketerapi:

- Hjertestop: Opsæt 1000 ml med kontinuerligt indløb for at øge preload, og fremme medicinindgift.
- Hypovolæmi (blodtab): Kun indtil perifer puls eller systolisk BT > 90 mmHg.
- Sepsis: 1000 – 2000 ml til hurtigt indløb.
- Rehydrering gives normalt 500-1000 ml.
- Hyperglykæmi 1000 - 2000 ml.
- Dykkersyge: 2000 ml opsættes med indløb over 60 min.

Børn under 10 år eller 30 kg:

- Hjertestop: 10 ml/kg bolus, evt. gentaget.
- Hypovolæmi (blodtab): Indtil perifer puls og cirkulation (kapillærrespons <2 sek.), samt nærmormalisering af vitalparametre (P, BT, RF, SpO₂) max. 20 ml/kg.
- Sepsis: 10 ml/kg til hurtigt indløb, evt. gentaget 4-6 gange så længe der ses bedring i vitalparametre.

Særligt for paramediciner:

Kardiogent shock / kardielt udløst hypotension / takykardi med mistanke om hypovolæmi:

Obs! EKG-monitorering og hyppig revurdering af vitalparametre.

- Giv bolus på 100-200 ml ad gangen. Bolus gentages indtil 1000 ml, såfremt patienten bedres på behandlingen (puls, BT og RF). Lungestetoskopi revurderes hyppigt.
- Infusion stoppes for alle patienter ved tegn på lungeødem.

[Tilbage](#)[Vis \[Seneste version\]](#) ▾

IV

Indgiftsform

Vigtigt

Kontraindikationer

Ingen ved korrekt indikation.

Bivirkninger

Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase/-ødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.

Interaktioner

Ingen

Særligt

Særlige forhold

Forsigtighed skal udvises ved kardiogent shock.

Medikament

Farmakologi

Erstatter akutte ekstracellulære væsketab. Øger volumen i karbanen.

Farmakokinetik

Øger midlertidigt volumen i karbanen.

T_{1/2}:

Ikke relevant.

Holdbarhed

Hvis opbevaring foregår i varmeskab nedsættes holdbarhed til 3 måneder.

Forstået

Ikke forstået