

Naloxon [2.22.0 - 05/09-2021]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

# Naloxon

Link til VIP-instruksen

## Anvendelse

### Akut overdosering

#### Indikation

Bevidstheds- og respirationspåvirkning med mistanke om overdosis af opiat-lignende stoffer, f.eks.:

- Morfin (Contalgin,Doltard)
- Kodein
- Dextropropoxyphen
- Fentanyl (Durogesic)
- Ketogan
- Methadon
- Nicomorfin (Vilan)
- Oxycodon
- Pethidin
- Tramadol (Dolol, Mandolgin,Nobligan, Tadol, Tradolan, Tramadol)
- Buprenorfin
- Dextropropoxyfen (Abalgin)
- Ketobemidon (Ketodur)
- Heroin
- Opium

#### Dosis

Voksne og børn:  
0,8 mg IM efterfulgt af 0,4 mg IV

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

#### Indikation

Overdosering hos kronisk smertepatient, samt ved smertebehandling med fentanyl.

#### Dosis

0,04 mg langsomt med 2-3 minutters mellemrum indtil effekt (sufficient respiration) dog maksimalt 0,8 mg IV

- I praksis fortyndes 1 ml naloxon i 9 ml saltvand, i en 10 ml sprøjte og der gives 1 ml ad gangen, således: 0,04 mg/ml pr. gang.

#### Indgiftsmåde

IV / IM

#### Indgiftsform

Injektionsvæske 0,4 mg/ml, 1 ml pr. ampul.

## Vigtigt

#### Kontraindikationer

Ingen ved korrekt indikation

#### Bivirkninger

Ved for hurtig og for stor indgift kan der ses tremor, ildebefindende, kvalme og opkastninger.  
Kroniske brugere og misbrugere kan få svære abstinenssymptomer eller blive svært smerteplaget efter indgift af antidot.  
Ligeledes kan sjældent ses hypertension, hjertearytmier, lungeødem og hjertestop.

#### Interaktioner

Naloxon ophæver alle virkninger og bivirkninger af opiatlignende stoffer, men effekten af naloxon kan vare kortere end effekten af det opiatlignende stof.

## Særligt

#### Særlige forhold

IM: Vær tålmodig mht. effekt. Vent 5 – 10 min før behandling gentages.  
IV: Hvis der alene gives IV-naloxon, skal risikoen for tilbagefald overvejes grundigt.

Ved hjertestop i forbindelse med forgiftningstilstande, skal naloxon gives i ALS-algoritmen under korrektion af reversible årsager til hjertestop.

Vær opmærksom på evt. differentialdiagnoser, herunder blandingsmisbrug.

## Medikament

#### Farmakologi

Specifikt virkende antidot til opioider.

#### Farmakokinetik

Virker efter:

1 – 5 minutter

Virkningsvarighed:

1-4 timer afhængig af dosis og indgiftsform

T½:

60-90 minutter

#### Holdbarhed

Se udløbsdato på ampul.

✓ Forstået

Ikke forstået