

DX

 Vis sidehoved

Amiodaron

[Link til VIP-instruksen](#)

Anvendelse (kun paramediciner)

Hjertestop

Indikation

Hjertestop, hvor der findes ventrikulære arytmier (VT/VF).

Dosis

Voksne og børn fra pubertet:

300 mg IV/IO efter 3. stød

Evt. 150 mg IV/IO efter 5. stød

Børn indtil pubertet:

5 mg/kg IV/IO efter 3. stød

Evt. samme dosis efter 5. stød hvis fortsat indiceret

Ventrikulær takykardi (VT)

Indikation

Ventrikulær takykardi med hæmodynamisk påvirkning.

Dosis

Voksne:

Op til 150 mg IV langsomt over 10 min.

- Kan evt. gentages 1 gang efter telemedicinsk konsultation og ordination af AMK-læge.
- Indgiften stoppes hvis rytmen konverteres eller ved klinisk bedring.
- Indgiften skal ske under overvågning med stødpatch og hyppige blodtryksmålinger.

Supraventrikulær takykardi (SVT)

(Kun efter konference med AMK-læge)

Indikation

Supraventrikulær takykardi (SVT) med hæmodynamisk påvirkning.

Dosis

Voksne:

Op til 150 mg IV langsomt over 10 min.

- Kan evt. gentages 1 gang efter telemedicinsk konsultation og ordination af AMK-læge.

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Indgiftsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 50 mg amiodaron.

Ampulstørrelse: 3 ml

Vigtigt

Kontraindikationer

Ved hjertestop:

Ingen ved hjertestop med stødbare rytmer

Ved takyarytmier:

Puls <120

- Sinusbradykardi
- Sinoatrialt blok (SA-blok)
- Kendt syg sinus syndrom
- 2. grads eller 3. grads AV-blok medmindre patienten har pacemaker (risiko for sinusarrest).

Bivirkninger

- Reaktioner på indgivelsesstedet
- Blodtryksfald
- Moderat bradykardi

Interaktioner

Ingen væsentlige interaktioner ved korrekt indikation.

Særligt

Særlige forhold

Må IKKE fortyndes med isotonisk NaCl.

ALB tilkaldes altid til assistance til ovenstående tilstande jf. instruks for tilkald og afmelding af ALB.

Medikament

Farmakologi

Antiarytmikum klasse III. Amiodaron har antiarytmisk effekt over for både supraventrikulære og ventrikulære arytmier. Under behandling forlænges aktionspotentialet og refraktærtiden for såvel atrier som ventrikler (QT- forlængelse).

Farmakokinetik

Nedbrydes i leveren og udskilles gennem galde.

Virker efter:

1-2 min. (maksimal virkning efter 15 min)

Virkningsvarighed:

Ukendt

T½:

3-80 timer (op mod 100 dage)

Holdbarhed

Se holdbarhedsdato på ampul.

✓ Forstået

Ikke forstået