

Ketorolac [1.14.0 - 18/01-2023]

Tilføjelser

Slettede dele

DX

Vis sidehoved

Ketorolac

[Link til VIP-instruksen](#)

Anvendelse (kun paramedciner)

Indikation

Smertebehandling: Voksne med moderate til svære smerter (smertescore \geq 4) og/eller kombinationsbehandling med fentanyl ved moderate og stærke smerter

Dosis

Voksne (> 16 år): 15 mg IV/IM

- Må ikke gentages

Indgiftsmåde

IV

Indgiftsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 30 mg ketorolactrometamol

Vigtigt

Kontraindikationer

- Kendt allergi overfor NSAID
- Børn under 16 år
- Aktuel ulcer eller gastro-intestinal blødning
- Stærkt nedsat leverfunktion eller nyresygdom
- Svær hjerteinsufficiens
- Indtag af NSAID indenfor 6. timer
- Gravide

Bivirkninger

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

- Træthed
- Øget svedtendens
- Perifere ødemer
- Allergiske reaktioner

Interaktioner

Hæmmer virkningen af loop-diuretika.

Særligt

Særlige forhold

Ketorolac/NSAID er et godt valg ved smerter udløst af inflammation, nyre- og galdesten, rheumatoid arthritis og postoperative smerter, kan suppleres med paracetamol og fentanyl ved moderate og svære smerter.

Vær forsigtig hos ældre og patienter i AK-behandling eller der er i høj risiko for hjerte-kar-sygdom eller ulcer.

Husk at spørge patienten om allergi før indtagelse.

Medikament

Farmakologi

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX).

Farmakokinetik

Ved indgift IV indtræder virkningen inden for ½ time og indenfor 1-2 timer opnår man maximal effekt. Metaboliseres i leveren og udskilles gennem nyrene.

T½:

4-6 timer

Holdbarhed

Se pakning

✓ Forstået

Ikke forstået