

Atropin [3.5.0 - 15/08-2021] Tilføjelser Slettede dele

DX

↗ Vis sidehoved

Atropin

Link til VIP-instruksen

Anvendelse (kun paramedciner)

Indikation

Bradykardi med kredsløbspåvirkning hos voksne.

Dosis

Voksne >12 år:

0,5-1 mg IV.

- Gentages hvert 3. minut ved manglende effekt, op til maksimalt 3 mg.

Indgiftsmåde

IV

Indgiftsform

Injektionsvæske 1 mg/ml atropin.

Ampulstørrelse: 3 ml = 3 mg.

Vigtigt

Kontraindikationer

Ingen kontraindikationer i livstruende situationer.

Bivirkninger

- Takykardi
- Pupildilation
- Mundtørhed

Tilbage



Vis [Seneste version] ▲

Synsforstyrrelser

- Kvalme
- Svimmelhed

Interaktioner

Hæmmer virkningen af parasymptomimetika, fx pilocarpin. MAO-hæmmere øger den antikolinerge effekt.

Særligt

Særlige forhold

ALB tilkaldes til ovenstående jf. "instruks for tilkald og afmelding af ALB".

Ved udeblivende effekt, overvej behov for pacing jf. "vejledning for Non-invasiv transcutan pacing, klargøring til- og behandling med".

Atropin har begrænset virkning på hjertetransplanterede, da den parasympatiske innervation af hjertet ikke er tilstede.

Medikament

Farmakologi

Parasympatolytikum, dvs. et middel som blokerer parasymptikus. Ophæver således vagusbetinget bradykardi, hvorved hjerterefrekvensen øges.

Farmakokinetik

Virker efter:

Øjeblikkeligt efter indgift.

Virkningsvarighed:

2 - 4 timer

T_{1/2}:

4 timer

Holdbarhed

Se udløbsdato på ampul.

✓ Forstået

Ikke forstået