## ИЗПИТ

по Математически анализ и диференциална геометрия февруари 2004г., група Г

Име:..... Фак.номер:..... Адм.група:....

- 1. Пресметнете:
- (a)  $f(t) = \cos \|\alpha(t)\|$ , където  $\alpha(t)$  е гладка векторна функция на скаларния аргумент t, която не се анулира.

(b)  $g(\alpha) = \int_1^{\ln \alpha} e^{x^2 \alpha^2} dx$ 

2. Дайте дефиниция на множество, измеримо по Пеано-Жордан. Докажете, че тялото, определено с неравенствата

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1, x \le 0\}$$

е измеримо.

- 3. Дали функцията, дефинирана с f(x,y)=1, ако x е рационално и  $1 \le |x|+|y| \le 4$  и с f(x,y)=0 в противен случай е интегруема по Риман? Обосновете отговора си.
- 4. Напишете формулата на Грийн в стандартен вид и с помощта на дивергенция. Пресметнете интеграла

$$\int_{\Gamma} \frac{\langle x - x_0, n \rangle}{\parallel x - x_0 \parallel^2} ds$$

където  $\Gamma$  е регулярна затворена крива в равнината без самопресичания, n е единичната външна нормала към нея и  $x_0$  е точка, непринадлежаща на крайната област, оградена от кривата.

5. Разгледайте изображението

$$\varphi(u,v) = (u\cos v, u\sin v, 5u)$$

- (а) В кои точки на равнината това изображение има пълен ранг?
- (б) Намерете коефициентите на първата квадратична форма на повърхнината S, зададена с  $\varphi$  (параметрите u и v се менят в областта, която сте определили в (а)).
- (в) Докажете, че координатните линии върху S са перпендикулярни.
- (г) Намерете силата на притегляне, която хомогенна повърхнина, зададена с φ, упражнява върху материална точка, разположена в началото на координатната система, ако

$$(u,v) \in \Omega = \{(\bar{u},\bar{v}) : \frac{1}{2} < \bar{u} < 1, 0 < \bar{v} < 2\pi\}$$

6. Нека F е гладко векторно поле в  $\mathbb{R}^3$ . Да означим с  $S_{\varepsilon}$  сферата с център x и радиус  $\varepsilon$ . Докажете, че

$$div F(x) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\int \int_{S_{\varepsilon}} \langle F, n \rangle ds}{\frac{4}{2}\pi\varepsilon^3}$$