

$$V = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad \dot{q}_k = \frac{p_k}{m}, \quad \dot{p}_k = - \left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_{q_k} = -m\omega^2 q_k$$

$$g_k = N \exp \left(\frac{1}{\hbar} \left(-\frac{1}{2}m\omega(x - q_k)^2 + ip_k(x - q_k) \right) \right) = \exp \left(\frac{1}{\hbar} \left(-\frac{1}{2}m\omega x^2 + \xi_k x + \eta_k \right) \right)$$

$$\xi_k = m\omega q_k + ip_k, \quad \eta_k = \ln N - \frac{1}{2}m\omega q_k^2 - iq_k p_k$$

$$\dot{\xi}_k = m\omega \dot{q}_k + i\dot{p}_k = \omega p_k - im\omega^2 q_k = -i\omega(m\omega q_k + ip_k) = -i\omega \xi_k$$

$$\dot{\eta}_k = -m\omega q_k \dot{q}_k - i(\dot{q}_k p_k + q_k \dot{p}_k) = -\dot{q}_k(m\omega q_k + ip_k) - iq_k \dot{p}_k = -\frac{p_k \xi_k}{m} + im\omega^2 q_k^2$$

$$\tau_{mk} = \langle g_m | \dot{g}_k \rangle = \frac{1}{\hbar} \mathbb{S}_{mk} \left(\dot{\eta}_k + \dot{\xi}_k \frac{\xi_k + \xi_m^*}{2m\omega} \right) = \frac{1}{\hbar} \mathbb{S}_{mk} \left(im\omega^2 q_k^2 - \frac{p_k \xi_k}{m} - i \frac{\xi_k^2 + \xi_k \xi_m^*}{2m} \right) =$$

$$= \frac{1}{\hbar} \mathbb{S}_{mk} \left(im\omega^2 q_k^2 - \frac{i\xi_k \xi_m^*}{2m} - \frac{i\xi_k(\xi_k - 2ip_k)}{2m} \right) = \frac{1}{\hbar} \mathbb{S}_{mk} \left(im\omega^2 q_k^2 - \frac{i\xi_k \xi_m^*}{2m} - \frac{i|\xi_k|^2}{2m} \right) =$$

$$= \frac{1}{\hbar} \mathbb{S}_{mk} \left(im\omega^2 q_k^2 - \frac{i\xi_k \xi_m^*}{2m} - \frac{i(m^2\omega^2 q_k^2 + p_k^2)}{2m} \right) = \frac{1}{\hbar} \mathbb{S}_{mk} \left(\frac{i}{2}m\omega^2 q_k^2 - \frac{ip_k^2}{2m} - \frac{i\xi_k \xi_m^*}{2m} \right)$$

$$\mathbb{H}_{mk} = \left\langle g_m \left| \hat{T} \right| g_k \right\rangle + \frac{1}{2}m\omega^2 \langle g_m | x^2 | g_k \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \left\langle g_m \left| \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right| g_k \right\rangle + \frac{1}{2}m\omega^2 \langle g_k | x^2 | g_m \rangle =$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \left\langle g_m \left| \frac{1}{\hbar} \frac{\partial}{\partial x} (-m\omega x + \xi_k) \right| g_k \right\rangle + \frac{1}{2}m\omega^2 \langle g_k | x^2 | g_m \rangle =$$

$$= \frac{\hbar\omega}{2} \langle g_m | g_k \rangle - \frac{1}{2m} \langle g_m | (-m\omega x + \xi_k)^2 | g_k \rangle + \frac{1}{2}m\omega^2 \langle g_k | x^2 | g_m \rangle =$$

$$= \left(\frac{\hbar\omega}{2} - \frac{\xi_k^2}{2m} \right) \langle g_m | g_k \rangle + \omega \xi_k \langle g_m | x | g_k \rangle - \frac{1}{2}m\omega^2 \langle g_m | x^2 | g_k \rangle + \frac{1}{2}m\omega^2 \langle g_k | x^2 | g_m \rangle =$$

$$= \left(\left(\frac{\hbar\omega}{2} - \frac{\xi_k^2}{2m} \right) + \omega \xi_k \frac{(\xi_m^* + \xi_k)}{2m\omega} \right) \langle g_m | g_k \rangle = \left(\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\xi_m^* \xi_k}{2m} \right) \langle g_m | g_k \rangle$$

$$\mathbb{H}_{mk} - i\hbar \boldsymbol{\tau}_{mk} = \left(\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\xi_m^* \xi_k}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q_k^2 - \frac{p_k^2}{2m} - \frac{\xi_m^* \xi_k}{2m} \right) \langle g_m | g_k \rangle =$$

$$= \left(\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{1}{2}m\omega^2 q_k^2 - \frac{p_k^2}{2m} \right) \mathbb{S}_{mk}$$

$$(-i\mathbb{S}^{-1}(\mathbb{H} - i\hbar \boldsymbol{\tau}))_{nk} = -i \sum_m \mathbb{S}_{nm}^{-1} (\mathbb{H}_{mk} - i\hbar \boldsymbol{\tau}_{mk}) =$$

$$= \left(\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{1}{2}m\omega^2 q_k^2 - \frac{p_k^2}{2m} \right) \sum_m \mathbb{S}_{nm}^{-1} \mathbb{S}_{mk} = \left(\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{1}{2}m\omega^2 q_k^2 - \frac{p_k^2}{2m} \right) \delta_{nk}$$