PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA MULHER, DO ADULTO E DA PESSOA IDOSA

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 7 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

7.1 Saúde da criança

A **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC)**, instituída pela **Portaria GM/MS nº 1.130/2015**, abrange crianças de 0 a 9 anos e é organizada em **7 eixos estratégicos**: atenção humanizada à gestação, parto, nascimento e RN; aleitamento materno e alimentação complementar saudável; promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral; atenção a agravos prevalentes e doenças crônicas; atenção à criança em situação de violência e promoção da cultura de paz; atenção à criança com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno.

Caderneta da Criança: instrumento de acompanhamento com gráficos de crescimento (peso, estatura, IMC e perímetro cefálico por idade), marcos do desenvolvimento e registro vacinal.

Calendário mínimo de consultas de puericultura (MS): 1ª semana, 1º mês, 2º, 4º, 6º, 9º, 12º, 18º e 24º meses; depois, anualmente.

Crescimento: o RN pode perder até **10% do peso** nos primeiros dias, recuperando-o até o **10º a 15º dia**. A criança dobra o peso de nascimento por volta dos **4 a 5 meses** e o triplica com **1 ano**.

AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância): estratégia para avaliar sinais de perigo (não consegue beber ou mamar, vomita tudo, convulsões, letargia/inconsciência). A desidratação por diarreia é tratada com **Terapia de Reidratação Oral** – Plano A (sem desidratação, tratamento em casa), Plano B (com desidratação, SRO na unidade) e Plano C (desidratação grave, hidratação venosa).

7.2 Saúde do adolescente

Pelo **ECA (Lei nº 8.069/1990)**, adolescente é a pessoa entre **12 e 18 anos** incompletos; para a OMS e o Ministério da Saúde, a adolescência vai dos **10 aos 19 anos**. Temas prioritários: crescimento e desenvolvimento puberal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de gravidez e IST, uso de álcool e drogas, violência e saúde mental. **Caderneta de Saúde do Adolescente** (versões masculina e feminina). O adolescente tem direito a ser atendido **sem a presença dos pais**, com sigilo, salvo situações de risco à vida ou a terceiros. Programa **Saúde na Escola (PSE)** – Decreto nº 6.286/2007.

7.3 Saúde da mulher

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM, 2004): ações em saúde sexual e reprodutiva, planejamento familiar (Lei nº 9.263/1996), atenção obstétrica, climatério, violência, câncer de colo do útero e de mama.

Rastreamento do câncer do colo do útero: exame citopatológico (Papanicolau) em mulheres de **25 a 64 anos** que já iniciaram atividade sexual; os dois primeiros exames com intervalo **anual** e, se ambos normais, a cada **3 anos**. Desde 2024 o MS incorporou o **teste de DNA-HPV** como método de rastreamento, com intervalo de **5 anos** se negativo, em implantação gradual. Orientações para coleta: não ter relação sexual nem usar duchas ou cremes vaginais nas 48 h anteriores e não estar menstruada.

Rastreamento do câncer de mama: mamografia bienal para mulheres de **50 a 69 anos** (Diretriz do INCA; desde 2025 o MS ampliou o acesso à mamografia para mulheres de 40 a 49 anos mediante decisão compartilhada, e para 70 a 74 anos). O exame clínico das mamas faz parte da consulta; o autoexame é estimulado como parte do autoconhecimento, não como método de rastreamento.

Métodos contraceptivos: comportamentais (tabelinha, muco cervical), de barreira (preservativo masculino e feminino – únicos que protegem contra IST, diafragma), hormonais (pílula combinada, minipílula, injetável mensal e trimestral, implante), DIU (de cobre e hormonal) e definitivos (laqueadura e vasectomia – Lei 14.443/2022: idade mínima de **21 anos** ou ao menos 2 filhos vivos, **sem necessidade de consentimento do cônjuge**, prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o procedimento).

Climatério: transição do período reprodutivo para o não reprodutivo (em geral 40 a 65 anos); **menopausa** é a última menstruação, reconhecida após 12 meses de amenorreia.

■ 7.4 Saúde do adulto e do homem

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH, Portaria nº 1.944/2009), voltada a homens de **20 a 59 anos**, com cinco eixos: acesso e acolhimento, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado (pré-natal do parceiro), doenças prevalentes na população masculina, prevenção de violências e acidentes. Na saúde do adulto, destacam-se as **doenças crônicas não transmissíveis** (hipertensão, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas), o tabagismo, o etilismo, a obesidade e o sedentarismo (ver Assunto 9).

■ 7.5 Saúde da pessoa idosa

O **Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003)** considera idosa a pessoa com **60 anos ou mais**. Garante prioridade no atendimento (prioridade especial aos maiores de **80 anos**), direito a **acompanhante** em internação ou observação, atendimento domiciliar e fornecimento gratuito de medicamentos de uso continuado. A **Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528/2006)** tem como foco a manutenção da **capacidade funcional** e da autonomia.

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e principais síndromes geriátricas ("gigantes da geriatria"): **instabilidade postural e quedas, incontinência urinária, imobilidade, insuficiência cognitiva (demências) e iatrogenia** (inclusive a polifarmácia). Avaliação funcional: atividades básicas de vida diária (escala de **Katz** – banho, vestir, higiene, transferência, continência, alimentação) e instrumentais (escala de **Lawton** – telefone, compras, finanças, medicação).

Prevenção de quedas: iluminação adequada, retirada de tapetes soltos, barras de apoio no banheiro, calçados fechados e antiderrapantes, revisão de medicamentos (sedativos, anti-hipertensivos), atividade física.

Violência contra a pessoa idosa é de notificação compulsória e deve ser comunicada também à autoridade policial, ao Ministério Público ou aos Conselhos da Pessoa Idosa.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- PNAISC (0 a 9 anos, 7 eixos) e Caderneta da Criança.
- Perda fisiológica de peso do RN (até 10%) e recuperação até o 10º–15º dia.
- Planos A, B e C de reidratação.
- Faixas etárias: adolescente 12–18 (ECA) × 10–19 (OMS/MS); idoso ≥ 60 anos; homem 20–59 anos.
- Papanicolau 25–64 anos, dois anuais e depois trienal; DNA-HPV a cada 5 anos.
- Mamografia bienal de 50 a 69 anos.
- Laqueadura/vasectomia: 21 anos ou 2 filhos, sem consentimento do cônjuge.
- Estatuto da Pessoa Idosa: acompanhante, prioridade especial aos 80+.
- Gigantes da geriatria; escalas de Katz e Lawton.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"25–64, 1-1-3"**: Papanicolau dos 25 aos 64, dois exames anuais e depois a cada 3 anos.
- **"50–69 de 2 em 2"**: mamografia de rastreamento.
- **"ECA 12, OMS 10"**: início da adolescência.
- **"Os 5 Is da geriatria"**: Instabilidade, Incontinência, Imobilidade, Insuficiência cognitiva, Iatrogenia.
- **"Katz é básico, Lawton é instrumental"**.
- **"Dobra aos 5, triplica com 1 ano"**: peso da criança.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, o exame citopatológico do colo do útero deve ser oferecido a mulheres:

(A) de 18 a 50 anos, anualmente, independentemente dos resultados.
(B) de 25 a 64 anos que já iniciaram atividade sexual, com os dois primeiros exames anuais e, se normais, a cada três anos.
(C) a partir da menarca, a cada seis meses.
(D) somente após a menopausa.
(E) de 40 a 69 anos, a cada dois anos.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a faixa etária e a periodicidade estão erradas.

B) Correta – é a recomendação clássica do MS/INCA para o Papanicolau.

C) Incorreta – não se rastreia antes dos 25 anos, nem com intervalo semestral.

D) Incorreta – o rastreamento ocorre principalmente na idade reprodutiva.

E) Incorreta – essa faixa e periodicidade lembram a mamografia, não o citopatológico.

QUESTÃO 02

Para o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), é considerada pessoa idosa aquela com idade igual ou superior a:

(A) 55 anos.
(B) 60 anos.
(C) 65 anos.
(D) 70 anos.
(E) 80 anos.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – 55 anos não é marco legal.

B) Correta – o Estatuto considera idosa a pessoa com 60 anos ou mais.

C) Incorreta – 65 anos é referência usada em alguns benefícios e em países desenvolvidos.

D) Incorreta – não corresponde ao marco legal.

E) Incorreta – 80 anos é o marco para a prioridade especial.

QUESTÃO 03

Criança de 2 anos com diarreia apresenta-se irritada, com olhos fundos, sede intensa e sinal da prega desaparecendo lentamente, sem sinais de gravidade. Segundo o manejo da desidratação, deve-se aplicar o:

(A) Plano A, com tratamento exclusivamente domiciliar.
(B) Plano B, com terapia de reidratação oral na unidade de saúde.
(C) Plano C, com hidratação venosa imediata.
(D) jejum absoluto até cessar a diarreia.
(E) uso de antidiarreicos.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o Plano A é para crianças sem desidratação.

B) Correta – há sinais de desidratação (irritação, olhos fundos, sede, prega lenta), indicando Plano B na unidade.

C) Incorreta – o Plano C é para desidratação grave (letargia, incapacidade de beber, prega muito lenta).

D) Incorreta – a alimentação deve ser mantida.

E) Incorreta – antidiarreicos não são recomendados em crianças.

QUESTÃO 04

As grandes síndromes geriátricas ("gigantes da geriatria") incluem:

(A) hipertensão, diabetes e obesidade.
(B) instabilidade postural, incontinência, imobilidade, insuficiência cognitiva e iatrogenia.
(C) catarata, glaucoma e surdez.
(D) osteoporose, artrose e gota.
(E) pneumonia, tuberculose e gripe.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – são doenças crônicas, não as síndromes geriátricas clássicas.

B) Correta – são os "5 Is" da geriatria.

C) Incorreta – são alterações sensoriais, sem constituir o grupo clássico.

D) Incorreta – são doenças osteoarticulares.

E) Incorreta – são doenças infecciosas.

QUESTÃO 05

Sobre a esterilização voluntária (laqueadura e vasectomia), conforme a Lei nº 9.263/1996, alterada pela Lei nº 14.443/2022, é correto afirmar:

(A) exige o consentimento expresso do cônjuge.
(B) é permitida a partir dos 25 anos, sem outra condição.
(C) é permitida a pessoas com capacidade civil plena maiores de 21 anos ou com pelo menos dois filhos vivos, sem necessidade de consentimento do cônjuge.
(D) é proibida durante o parto.
(E) pode ser feita no mesmo dia da manifestação da vontade.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a Lei 14.443/2022 retirou a exigência de consentimento do cônjuge.

B) Incorreta – a idade mínima passou a ser 21 anos (ou 2 filhos vivos).

C) Correta – são os requisitos atuais.

D) Incorreta – a lei passou a permitir a laqueadura durante o parto, observados o prazo e as condições médicas.

E) Incorreta – exige-se prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação e o procedimento.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: PNAISC e puericultura; AIDPI e TRO; adolescente (ECA e MS, PSE); PNAISM, rastreamentos e contracepção; PNAISH; Estatuto e Política da Pessoa Idosa; síndromes geriátricas; prevenção de quedas.

Quadro-resumo: criança 0–9 anos (PNAISC); adolescente 10–19 (MS); homem 20–59; idoso ≥ 60; Papanicolau 25–64; mamografia 50–69 bienal; esterilização ≥ 21 anos ou 2 filhos.

Pegadinhas: exigir consentimento do cônjuge para laqueadura; confundir faixa do ECA com a do MS; usar autoexame como método de rastreamento.

Erros comuns: suspender a alimentação na diarreia; tratar a perda de 10% do peso do RN como doença.