




HANDBUCH GEMÜSESCHÄDLINGE

*Wer sich über dein Gemüse hermacht und
was du dagegen tun kannst*

Inhalt

3	Vielfraße im Anmarsch	25	Kohlweißling
4	Ameisen	26	Lauchmotte
5	Ampferblattkäfer	28	Maiszünsler
6	Blattläuse	29	Maulwurfsgrille
7	Dickmaulrüssler	30	Minierfliege
9	Drahtwürmer	31	Möhrenblattfloh
10	Engerlinge	32	Möhrenminierfliege
11	Erbsenkäfer	33	Nematoden
13	Erbsenwickler	34	Ohrwurm oder Ohrenkneifer
14	Erdföhe	35	Schnecken
15	Gemüseeeule	36	Spinnmilben
16	Katzen	37	Thripse
17	Kartoffelkäfer	38	Trauermücken
18	(Mehlige) Kohlblattlaus	39	Wanzen
19	Kohldrehherzmücke	40	Weißer Fliege oder Kohlmotten Schildlaus
20	Kohleule	42	Wolllaus und Wurzellaus
21	Kohlfliege oder Rettichfliege	43	Wühlmäuse
22	Kohlmotte	44	Zwiebelfliege
24	Kohltriebrüssler	46	Schädlingsabwehr in deinem Garten




Vielfrasse im Anmarsch

Deine liebevoll gepöppelten Pflanzen stehen vital und kräftig da, doch dann rückt eine ganze Armee Gemüseschädlinge an und fällt über deine grünen Freunde her? Die kleinen Plagegeister können ordentliche Schäden anrichten!

In diesem Handbuch findest du alle Tipps und Tricks, wie du sie auf natürliche Weise in Schach hältst.

Und bitte nicht vergessen: Jedes Lebewesen hat seinen Platz und seinen Zweck in der Natur, auch wenn das für uns Gärtner manchmal schwierig zu akzeptieren ist.



AMEISEN

lat. Formicidae



Du findest schwarze, rote oder gelbe Ameisen in deinem Garten. Sie schaden deinen Pflanzen in der Regel nicht, weil sie nur tote Insekten und Pflanzenreste fressen. Die kleinen wuseligen Krabbler können ein prima Anzeiger für dich sein, ob du einen Schädlingsbefall an deinem Gemüse hast. Das ist für Ameisen wie ein All-You-Can-Eat Buffet. Da lohnt es sich also einmal genauer hinzuschauen! Praktisch, oder? Indirekt können Ameisen auch deinen Pflanzen schaden, wenn sie es sich direkt an den Wurzeln deiner Pflanzen gemütlich machen und dort ihr Nest bauen.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Die kleinen Krabbler triffst du besonders häufig in der Nähe von Pflanzen an, die regelmäßig unter Blattläusen leiden, wie der Dicken Bohne.

Schadbild

Ameisen halten sich gerne blattsaugende Insekten als eine Art »Melkvieh«. Läuse und bestimmte Flöhe können den Zucker im Pflanzensaft nämlich nicht verwerten und sondern ihn als klebriges Sekret ab. Diesen so genannten Honigtau fressen die Ameisen super gerne und beschützen deshalb »ihre« Läuse vor Fressfeinden wie Marienkäfern.

So sorgen sie dafür, dass sich Läuse und Flöhe weiterhin ungehindert vermehren und deinen Pflanzen schaden können.

Vorbeugende Maßnahmen

Vitale und kräftige Pflanzen haben weniger Probleme mit Schädlingen, so haben auch die Ameisen kaum einen Grund vermehrt bei dir im Garten herumzuwuseln. Sonst gibt es keine vorbeugenden Maßnahmen gegen Ameisen.

Soforthilfe

Wenn du ein Ameisennest im Beet hast, kannst du versuchen, es umzusiedeln. Dafür bestellst du keinen Umzugstrupp, sondern füllst Blumentöpfe mit Holzwolle und stellst sie mit der Öffnung nach unten auf die Ameisenstraße, die sich durch dein Beet zieht. Mit ein wenig Glück fangen die Ameisen nach ein paar Tagen an, ihre Eier in den schützenden Blumentopf zu tragen.

Wenn sie damit fertig sind, hebst du den Blumentopf mit einer Schaufel auf und bringst ihn an einen Ort, der mindestens 30 m vom alten Nest entfernt ist.

Du kannst auch versuchen, Ameisen durch Gerüche zu vertreiben. Gewürznelken, Lavendelblüten oder Zitronenschalen verströmen einen für Ameisen unangenehmen Duft. Diese legst du einfach zwischen deine Pflanzen. Denselben Effekt hat Brennnesseljauche, mit der du deine Beete 1:20 verdünnt gießt.





AMPFERBLATTKÄFER

lat. Gastrophysa viridula

Zwischen April und Oktober kannst du den metallisch grün-blau glänzenden Käfer an deinen Pflanzen entdecken. Ein wirklich prächtiges Farbenspiel, oder? So schön er auch ist, unseren Gemüsepflanzen tut er gar nicht gut, denn er klebt seine gelben stäbchenförmigen Eier an die Unterseite der Blätter. Die schwarzen, länglichen Larven, die aus den Eiern schlüpfen, haben deine Pflanzen zum Fressen gern!

Wissenschaftler des ökologischen Landbaus testen gerade, ob sich der Ampferblattkäfer gezielt zur Ampferbekämpfung einsetzen lässt. Aber in deinen Beeten möchtest du ihn sicher trotzdem nicht zu Gast haben!

Welche Pflanzen sind betroffen?

Sauerampfer, Rhabarber findet der Schönling besonders köstlich.

Schadbild

Die Blätter haben große Löcher oder sind bis auf das Blattgerippe abgefressen.

Vorbeugende Maßnahmen

Es gibt leider keine richtig guten vorbeugenden Maßnahmen gegen den Ampferblattkäfer.

Soforthilfe

Wenn du den schillernden Angeberkäfer auf deinen Pflanzen entdeckst, sammelst du ihn auf und streifst die Eier von der Unterseite der Blätter ab. Sonst hast du bald eine nächste, hungrige Generation auf deinen Pflanzen sitzen.





BLATTLÄUSE

lat. Sternorrhyncha

Die Blattlaus, mehlige Blattlaus, Weiße Fliege, Schildlaus und Wolllaus gehören zur Gruppe der Pflanzensäuger. Sie sind die häufigsten Schädlinge im Gemüsegarten und vermehren sich bei günstigen Bedingungen explosionsartig – diese Kerlchen können eine richtige Plage sein! Blattläuse haben viele Farben: Sie sind grün, weiß, gelblich, rotbraun oder schwarz. Manche haben Flügel und einige tragen auf dem Hinterleib einen mehligen Überzug.

Weiche Pflanzen sind betroffen?

So gut wie alle Pflanzen können unter Blattläusen leiden. Einige, wie die Dicke Bohne oder die Kapuzinerkresse, sind aber besonders anfällig.

Schadbild

Die Läuse stechen mit ihrem Saugrüssel in die Blätter und saugen Pflanzensaft heraus. Den Zucker, den sie nicht verwerten können, scheiden sie als Honigtau wieder aus und überziehen dein Gemüse mit einem klebrigen Belag. Bienen, Ameisen, Schlupfwespen und Florfliegen lieben Honigtau. Bienen machen daraus Waldhonig, den anderen Insekten dient er als Futter. Deshalb sind Ameisen, die du auf deinem Gemüse entdeckst, ein Anzeichen für den Befall mit Blattläusen – sie selber schaden deinem Gemüse in der Regel nicht.

Der Einstich schwächt deine Pflanzen nicht nur, sondern die Blattläuse können dabei auch Viren übertragen. Außerdem siedeln sich in der Folge häufig Rußpilze an, was deine grünen Freunde weiter schwächt.

Die befallenen Pflanzen wirken schlapp, bekommen gelbliche Blätter und wachsen schlecht.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Blattläuse sind Marienkäfer, Schlupfwespen, Schwebfliegen, Gallmücken, Florfliegen, Raubwanzen, Spinnen, Käfer, Ohrenkneifer und Vögel. Diese Armee an Blattlaus-Feinden kannst du in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine, Totholz oder Trockenmauern. Das sind auch tolle Gestaltungselemente für den Garten!

Nistkästen und ein ganzjähriges Futterangebot nehmen Vögel dankend an und wohnen dann gerne dauerhaft in deinem Garten.

Der Geruch von Bohnenkraut, Thymian, Lavendel und Oregano wirkt abschreckend auf Blattläuse. Wenn du sie zwischen dein Gemüse pflanzt oder Zweige davon verteilst, machst du es den Schädlingen ungemütlich.

Du kannst auch Kapuzinerkresse als »Opferpflanze« setzen – die Blattläuse stürzen sich dann darauf und lassen dein Gemüse auf der Seite liegen.

Soforthilfe

Wenn schon eine ganze Läusearmada deine Pflanzen belagert, kannst du sie zunächst mit einem scharfen Wasserstrahl von den Pflanzen herunterspritzen. Dann hast du auch noch verschiedene Möglichkeiten, um eine wirkungsvolle Spritzlösung herzustellen:

Für einen Kaltwasserauszug aus Brennnesseln weichst du in einem Liter Wasser 100 g zerkleinerte frische Brennnesselblätter und Stängel 24 Stunden in Wasser ein. Danach seihst du den Auszug ab und sprühst ihn jede Woche unverdünnt auf deine Pflanzen.

Eine Schmierseifen-Lösung stellst du her, indem du in einem Liter lauwarmem Wasser 25 g Schmierseife auflöst und die Lösung wiederholt auf die Blätter sprühst.

Neemöl ist im ökologischen Landbau zugelassen und super wirksam. Du spritzt das nach Packungsanweisung verdünnte Neemöl direkt auf die Blätter, um gegen die Schädlinge vorzugehen. Wenn du es ins Gießwasser gibst, stärkt es die Pflanze über die Wurzeln von innen heraus.

Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter.



DICKMAULRÜSSLER

lat. Otiorhynchus spp.

Dickmaulrüssler sind dunkel oder dunkelbraun gefärbte Käfer und haben einen geriffelten Rücken mit dunkelbraunen oder gelben Punkten. Dickmaulrüssler sind zwischen drei und vierzehn Millimetern groß und haben einen kräftigen Rüssel.

Der Dickmaulrüssler ist nachtaktiv und flugunfähig. Tagsüber versteckt er sich im Laub oder in den oberen Bodenschichten.

Die Larven sind beinlos und gelblich-weiß mit einem braunen Kopf. Sie liegen baucheinwärts gekrümmt im Boden und *liiiieben* es an leckeren Wurzeln zu knabbern. Sie leben ausschließlich unterirdisch.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Rüben, Beerenobst und alle Pflanzen mit krautigen, festen Blättern.

Schadbild

Die Larven des Dickmaulrüsslers fressen an den Wurzeln, der Stammbasis und dem Wurzelhals deiner Pflanzen. Außerdem höhlen sie die Früchte von Wurzelgemüsen aus.

Der ausgewachsene Käfer frisst die Stängel und Blätter in Bodennähe an. Du siehst das an den buchtenförmigen Fraßstellen. Die Blätter welken und deine Pflanzen wachsen schlecht. *Oh nein!* Das gilt es natürlich unbedingt zu verhindern!


Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Dickmaulrüssler sind Igel und Maulwürfe. Du kannst Igel in deinen Garten locken, indem du in einer Ecke deines Gartens einen Laubhaufen liegen lässt oder ein Igelhaus aufstellst.

Soforthilfe

Die Käfer verstecken sich tagsüber und sind in der Nacht aktiv. Deshalb lohnt es sich gegebenenfalls bei Dunkelheit mit einer Taschenlampe in den Garten gehen und die Übeltäter einsammeln. Oder du baust eine Falle: Dazu füllst du Blumentöpfe mit Holzwolle und legst sie in dein Beet. Die Käfer finden dieses Versteck super und verkriechen sich tagsüber darin. Du kannst sie dann bequem einsammeln.

Nematoden sind Fadenwürmer, die ihren Wirt parasitieren. Wenn du sie ins Gießwasser gibst und deine Beete damit gießt, befallen sie die Larven des Dickmaulrüsslers und machen mit ihnen kurzen Prozess. Du solltest nur im Notfall zu diesem Mittel greifen.





DRAHTWÜRMER

lat. *Elateridae*

Drahtwürmer sind die gefräßigen Larven von Schnellkäfern. Sie sind 2–3 cm lang, haben einen harten gelbrötlichen Chitinpanzer und im vorderen Bereich drei Beine. Nach der Verpuppung schlüpft ein schmaler, brauner Käfer, der im Gegensatz zur Larve kaum noch Fraßschäden verursacht (aber Eier legt, aus denen weitere Larven schlüpfen können).

Welche Pflanzen sind betroffen?

Insbesondere Salat, Kartoffeln, Kohl, Möhre, Tomaten und Zwiebeln.

Schadbild

Drahtwürmer fressen an allen unterirdischen Pflanzenteilen. Die Pflanzen welken und lassen sich ganz leicht aus dem Boden ziehen. Wenn du dir dann so eine Pflanze genau ansiehst, entdeckst du im Wurzelbereich Bohrlöcher

und Fraßgänge. Kartoffeln und Karotten sind von Gängen durchzogen. In der Nähe der Wurzeln findest du bestimmt auch die Drahtwürmer im Boden.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde des Drahtwurms sind Hühner, Igel, Kröten, Maulwürfe und Vögel. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine, Laubhaufen oder Trockenmauern. Nistkästen und ein ganzjähriges Futterangebot locken Vögel in deinen Garten, die dann auch die Schnellkäfer und Drahtwürmer ratzfatz verputzen.

Drahtwürmer mögen verdichtete, feuchte Böden. Darum lockerst du deinen Boden am besten mit einer (Doppel-)Grabegabel, ohne ihn zu wenden und gießt deine Pflanzen nicht übermäßig. Gemüse, die der Drahtwurm besonders liebt, solltest du besser nicht nacheinander am selben Ort anbauen. Dann hat der Drahtwurm nämlich einen ständig reich gedeckten Tisch und vermehrt sich munter weiter. Wenn du also schon an deinem Kohl Drahtwürmer hattest, ist es keine gute Idee, in diesem Beet als nächstes Möhren oder Salat anzubauen.

Soforthilfe

Tagetes und Ringelblumen sind giftig für Drahtwürmer. Du kannst sie als natürliche Bekämpfung zwischen dein Gemüse setzen. Oder du baust eine Drahtwurmfalle: Dazu schneidest du mehrere Kartoffeln in breite Scheiben und steckst sie auf Holzspieße. Dann versenkst du die Kartoffelstücke als Köder fünf bis zehn Zentimeter tief in der Erde zwischen deine Pflanzen. Nach ein paar Tagen ziehst du die Spieße samt Würmern aus der Erde und entsorgst sie in der Biotonne.





ENGERLINGE

lat. Scarabaeoidea

Engerlinge sind nicht alle schädlich für Gemüsepflanzen, deshalb gilt es unbedingt zuerst herauszufinden, um welche Art es sich handelt. Die Larven von Rosenkäfer und Nashornkäfer z. B. tragen zur Bodenverbesserung bei und sind sehr schützenswert und willkommen im Gemüsegarten. Ihr absoluter Wohlfühlort ist der Kompost.

Die Engerlinge vom Nashornkäfer sind mit sieben bis zehn Zentimetern Länge vergleichsweise groß. Rosenkäferengerlinge drehen sich bei Berührung auf den Rücken und kriechen wie eine Raupe.

Engerlinge vom Maikäfer, Junikäfer und Gartenlaubkäfer sind zwischen fünf und sieben Zentimeter lang. Ihr dicker cremefarbener Körper ist gekrümmt und zieht sich zusammen, wenn du ihn aufhebst. An der Brust sitzen drei Beinpaare. Diese Engerlinge kriechen auf dem Bauch vorwärts.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Engerlinge kommen überall vor.

Schadbild

Die »Gemeinen« unter den Engerlingen fressen die Pflanzenwurzeln ab. Dein Gemüse wirkt schlapp und welkt. Du kannst es ohne Widerstand aus dem Boden ziehen.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Engerlinge sind Marienkäfer, Schlupfwespen, Schwebfliegen, Gallmücken, Florfliegen, Raubwanzen, Spinnen, Käfer, Ohrenkneifer und Vögel. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine, Totholz oder Trockenmauern.

Mit Nistkästen und Futterstationen kannst du gefiederte Verstärkung in deinen Garten locken, die sich der Engerlinge annimmt.

Und nebenbei tust du den Vögeln auch was Gutes!

In deinem Garten sollte es nachts außerdem möglichst dunkel sein. Künstliches Licht lockt die Käfer nämlich in deinen Garten.

Wenn du deine Pflanzen im Mai und Juni mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, können die Käfer ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Der Geruch von Knoblauch schreckt Käfer außerdem ab. Du kannst die Zehen einfach als Mischkulturpartner zwischen deine anderen Gemüsepflanzen stecken.

Soforthilfe

Während eines kräftigen Regengusses oder wenn du deine Beete intensiv gießt, kommen die Engerlinge nach oben und du kannst sie leichter absammeln.

Nematoden sind Fadenwürmer, die ihren Wirt parasitieren. Wenn du sie ins Gießwasser gibst und deine Beete damit gießt, töten sie die Larven. Denke aber bitte daran, dass die Nematoden nicht zwischen den gemeinen und den lieben Engerlingen unterscheiden.

Maikäfer sind heutzutage sehr selten, darum solltest du dir diese Maßnahme wirklich für den absoluten Notfall aufheben...



ERBSENKÄFER

lat. Bruchus pisorum

Besonders der Nachwuchs des Erbsenkäfers hat es auf dein schmackhaftes Gemüse abgesehen. Die weißen Larven nisten sich mit Wonne in deine Erbsen ein und beanspruchen sie als ihr neues Zuhause – bis sie als ausgewachsener Erbsenkäfer die weite Welt oder zumindest deinen Garten erobern! Sobald deine Erbsen blühen, ist der Erbsenkäfer meist nicht mehr weit weg. Er findet Erbsen mit seinem super sensiblen Geruchssinn nämlich noch aus sehr großer Entfernung.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Leckere Erbsen.

Schadbild

Das Erbsenkäferweibchen fliegt im Frühjahr in die blühenden Erbsen hinein und frisst bis zur Eiablage Erbsenpollen und Nektar. Dann legt es bis zu 400 Eier auf den jungen Schoten ab.

Die Larven bohren sich durch die Schote in jeweils eine Erbse hinein und verpuppen sich darin. Im Herbst schlüpfen dann die fertigen Erbsenkäfer. Wenn es in deiner Region besonders kalt wird, überwintert der Käfer auch gern mal in seiner Erbse. Befallene Erbsen kannst du nicht mehr essen.

Auch als Saatgut sind sie nicht geeignet, weil sie nicht mehr zuverlässig keimen würden. Der kleine Missetäter hinterlässt in Erbsen und Schoten runde Löcher – daran erkennst du auch, dass du es mit ihm zu tun hast. Allerdings frisst er als ausgewachsenes Tier keine Erbsen mehr und lässt deine übrige Ernte in Ruhe.

Vorbeugende Maßnahmen

Damit der Erbsenkäfer seine Eier erst gar nicht an deinen Erbsen ablegen kann, deckst du sie schon vor der Blüte mit einem Gemüseschutznetz ab.


Wenn du früh blühende Sorten anbaust, die du dann auch früh erntest, kannst du dem Erbsenkäfer ein Zeit-Schnippchen schlagen und deine Ernte einfahren, bevor der Käfer so richtig loslegt.

Nach der Ernte entfernst du sorgfältig alle Erbsenreste vom Beet, damit du Käfern, die dort überwintern wollen, keine kuschelige Unterkunft bietest. Die natürlichen Feinde der Erbsenkäfer sind einige Wespenarten, die du mit einer attraktiven Wohnmöglichkeit wie einem Insektenhotel in deinen Garten locken kannst.

Durch das Einhalten einer Anbaupause von fünf bis sechs Jahren servierst du dem Erbsenkäfer nicht ständig sein Lieblingsessen am gleichen Ort.

Soforthilfe

Es gibt leider keine Soforthilfemaßnahmen gegen den Erbsenkäfer.



ERBSENWICKLER

lat. Cydia nigricana



Der Erbsenwickler ist ein Kleinschmetterling mit einer Größe von ungefähr acht Millimetern. Er ist gelbbraun gefärbt und hat an den äußeren Flügelrändern schwarz-weiße Streifen. Er legt seine Eier an Blütenblättern und Blattunterseiten ab. Aus ihnen schlüpfen die Larven, die beträchtliche Schäden verursachen können. Sie überwintern in einem Kokon 3–5 cm tief in der Erde.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Erbsen und Ackerbohnen.

Schadbild

Die Larven bohren sich in die Erbsenschoten und fressen dort an den Körnern. Wenn die Erbsen reifen, fressen sich die Larven aus den Schoten wieder heraus und graben sich in den Boden. Die angebohrten Hülsen und die Körner haben deshalb kleine vernarbte Löcher, in die

Fäulniserreger eindringen können. Befallene Früchte solltest du nicht mehr essen.

Vorbeugende Maßnahmen

Wenn du Probleme mit Erbsenwicklern hast, hilft es, deine Erbsen und Ackerbohnen im Mai und Juni mit einem Gemüseschutznetz abdeckst. Dann kann der Erbsenwickler seine Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben. Das Einhalten einer weiten Fruchtfolge sorgt dafür, dass der Erbsenwickler im nächsten Jahr keinen reich gedeckten Tisch mehr vorfindet.

Soforthilfe

Es gibt leider keine bewährten Maßnahmen.





ERDFLÖHE

lat. *Psylliodes spp.*

Erdflöhe sind sehr kleine Blattkäfer mit einer Größe von ungefähr 2–4 mm. Mit ihren kräftigen Hinterbeinen können sie flohartig springen – daher haben sie ihren Namen. Erdflöhe sind entweder blaumetallisch oder rötlich bis bräunlich gefärbt. Im Frühjahr legen die Weibchen ihre Eier in den Boden oder an Wurzeln und Blättern ab. Die neuen Käfer schlüpfen von Juni bis August. Sie überwintern im Erdboden und unter Pflanzenresten.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Nachtschattengewächse, Kreuzblütler und Korbblütler.

Schadbild

Erdflöhe fressen kleine runde Löcher von weniger als vier Millimetern in die Blätter. Ältere Pflanzen können die Plagegeister aber nicht mehr nachhaltig schädigen, weil sie schon kräftig genug sind. Der Befall ist dann ein rein optisches Problem. Bei zarten Jungpflanzen sieht es leider anders aus: Einem Erdfloh-Ansturm können sie noch nicht standhalten und gehen ein.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Erdflöhe sind Igel. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie aufgetürmte Laubhaufen, Igelhäuser und Totholz.

Wenn du deine Pflanzen mit einem engmaschigen Gemüseschutznetz abdeckst, kann der Erdfloh seine Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Soforthilfe

Wenn du deine Pflanzen mit Gesteinsmehl oder Algenkalk bepuderst, mögen das die Erdflöhe so gar nicht. Das hilft meiner Erfahrung nach am besten.

Auch ein bisschen Radau in deinen Beeten finden die Erdflöhe ausgesprochen ungemütlich und suchen sich eine andere Umgebung. Das heißt nicht, dass du eine wilde Party schmeißen sollst, sondern einfach den typischen Gartenarbeiten nachgehst, wie gießen und Erde zwischen den Pflanzen auflockern. Das genügt dem Erdfloh-Tunichtgut schon. Die kleinen Plagegeister bevorzugen nämlich einen trockenen Boden und ihre Ruhe.

Als Erste-Hilfe-Maßnahme kannst du außerdem Knoblauch oder Zwiebeln aufschneiden und zwischen die Pflanzen legen – diesen Geruch mögen die kleinen Übeltäter gar nicht. Ein Tee aus Rainfarn oder Wermut, den du abgekühlt auf deine Beete gießt, hat den selben Effekt.





GEMÜSEEULE

lat. Lacanobia oleracea

Die Gemüseeeule ist ein braun-grauer Schmetterling mit gefräßigen Nachkommen. Die Raupen sind ca. 45 mm lang, können grün, braun, grau und rosa gefärbt sein und haben eine breite, blassgelbe bis weiße Linie in der Mitte des Körpers. Der Kopf ist gelblich-braun oder grünlich-braun. Wenn du die Raupen berührst, krümmen sie sich zusammen. Die Puppe der Gemüseeeule ist rot-braun. Sie hat auf einer Seite eine Spitze mit zwei Widerhaken.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Insbesondere Tomaten, Paprika, Salat, Gurken, Kohl, Erbsen, Johannisbeeren und Erdbeeren.

Schadbild

Die Raupen fressen große Löcher in die Blätter der Pflanzen. Auf den Blättern findest du auch die Kotkrümel der Raupen. Ganz schön frech, oder?

Vorbeugende Maßnahmen

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Gemüseeeule ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Soforthilfe

Du kannst die Raupen absammeln und an einen anderen Ort bringen, zum Beispiel zu Brennnesseln. Dort können sie weiterleben und sich zu Schmetterlingen weiterentwickeln.

Neemöl lässt sich aus den Samen des Neembaums gewinnen und ist im ökologischen Landbau zugelassen. Du spritzt das nach Packungsanweisung verdünnte Neemöl direkt auf die Blätter, um gegen die Schädlinge vorzugehen. Wenn du es ins Gießwasser tust, stärkt es die Pflanze über die Wurzeln von innen heraus.

Obacht: Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!





KATZEN

lat. Felis catus

So nett und liebenswert Katzen auch sind: Sie können richtige Beetverwüster sein. Sie benutzen die Beete als Katzenklo oder wühlen die Erde so durch, dass deine Pflanzen ernsthaften Schaden nehmen.

Vorbeugende Maßnahmen

Du kannst deine Beete vor den kleinen vierbeinigen Missetätern schützen, indem du sie mit Vlies, Maschendraht oder einem groben Holzgitter abdeckst. Wenn du dick mulchst, halten Katzen deine Beete nicht mehr für ihr persönliches Katzenklo.

Den Geruch von Knoblauch, Zitronenmelisse oder Lavendel können die Samtpfoten nicht leiden und bleiben weg. Auch Pfeffer- oder Chilipulver auf deinen Beeten wirkt abschreckend auf Katzen.

Du kannst den Katzen an einer entlegenen Stelle im Garten auch ein Katzenklo einrichten. Ein frei zugänglicher Sandhaufen lenkt die Vierbeiner von deinen Beeten ab.



KARTOFFELKÄFER

lat. Leptinotarsa decemlineata

Der Kartoffelkäfer kann in kurzer Zeit ganze Kartoffelfelder vernichten. Eine einzige Larve frisst bis zu 40 Quadratzentimeter Blattfläche!

Der Kartoffelkäfer ist gelb-schwarz gestreift und sieben bis fünfzehn Millimeter lang. Sein Halsschild hat schwarze Flecken. Die Eier sind länglich und leuchtend gelb-orange. Er legt sie auf der Unterseite der Blätter in Gruppen zu je 20-80 Stück ab.

Die Larven des Kartoffelkäfers sind rötlich und haben an den Seiten und am Kopf schwarze Punkte. Sie verpuppen sich in der Erde und schlüpfen zwei Wochen später. Kartoffelkäfer überwintern im Boden.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Kartoffeln und alle anderen Nachtschattengewächse

Schadbild

Larven und Käfer fressen deine Pflanzen in atemberaubender Geschwindigkeit komplett kahl. Dadurch fällt deine Ernte entweder sehr gering aus oder du kannst gar nichts mehr ernten. Also Augen auf!

Vorbeugende Maßnahmen

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann der Kartoffelkäfer seine Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben und sich dort ausbreiten.

Soforthilfe

Solange der Befall nicht zu stark ist, kannst du noch etwas tun, um deine Ernte zu retten. Wenn du Kartoffelkäfer oder deren Larven entdeckst, sammelst du sie am besten sofort ab. Kontrolliere auch die Blattunterseiten, dort sitzen sie nämlich gern!

Gesteinsmehl, das du auf deine Pflanzen stäubst, bildet eine Schicht auf den Blättern, die den Käfern und ihren Larven den Appetit verdirbt. Außerdem trocknen die Käfer beim Kontakt damit aus. Am besten stäubst du die Blätter früh morgens ein – dann verbindet sich das Gesteinsmehl mit dem Tau und kann am besten wirken. Das musst du allerdings nach jedem Regenschauer wiederholen.



Aus 20 g frisch gehacktem Meerrettich und einem Liter Wasser kannst du einen Meerrettichsud herstellen. Dazu vermischst du beides und lässt es ein paar Tage in der Sonne stehen. Dann füllst du den abgeseihten Sud in eine Sprühflasche um und besprühst damit die Blattober- und -unterseiten.

Im Fachhandel gibt es das Bakterium *Bacillus thuringiensis* (BT-Präparat) zu kaufen, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist. Damit sprühst du deine Pflanzen gründlich ein. Käfern und Larven machen diese Bakterien den Garaus, während sie für Menschen und Haustiere unschädlich sind. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt sonst die feuchten Blätter!



(MEHLIGE) KOHlblATTlaus

lat. *Brevicoryne brassicae*

Die Kohlblattlaus legt im Herbst glänzende schwarze Eier an Winterkohllarten und Kohlstrünken ab. Im März und April schlüpfen daraus grau-grüne, zwei bis drei Millimeter große Blattläuse, die mehlig bepudert sind.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Alle Kreuzblütler.

Schadbild

Die Kohlblattlaus saugt Pflanzensaft aus den Blättern. Dabei kann sie auch Viren und andere Krankheiten auf die Pflanze übertragen. Besonders an jungen Blättern entstehen blasenartige Verformungen und weißliche Verfärbungen.

Und das Schlimmste: Dein befallener Kohl bildet keinen Kopf aus. *Oh nein!*

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Kohlblattlaus sind Schlupfwespen. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft wie Insektenhotels oder aufgetürmtes Totholz anbietest. Du kannst auch Löcher in die Stirnseite einer dicken Baumscheibe bohren.

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Kohlblattlaus ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

An den Herzblättern sitzt die Kohlblattlaus besonders gern – darum schau da genau hin!

Nach der Ernte dürfen keine Kohlstrünke im Beet zurückbleiben. Sie dienen der Kohlblattlaus nämlich als perfektes Überwinterungslager für ihre Eier.



Soforthilfe

Im Fachhandel gibt es Schlupfwespen zu kaufen. Sie parasitieren die Blattläuse. Diese Methode ist vor allem im Gewächshaus wirkungsvoll, du kannst die Schlupfwespen aber auch in deinen Beeten aussetzen.

Neemöl lässt sich aus den Samen des Neembaums gewinnen und ist im ökologischen Landbau zugelassen. Du spritzt das nach Packungsanweisung verdünnte Neemöl direkt auf die Blätter, um gegen die Schädlinge vorzugehen. Wenn du es ins Gießwasser tust, stärkt es die Pflanze über die Wurzeln von innen heraus. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Kräftige Sonnenstrahlen verbrennt dir sonst die Blätter!



KOHLDREHHERZMÜCKE

lat. Contarinia naturtii

Die Kohldrehherzmücke tritt ab Mitte Mai auf, ist hellbraun und ein bis zwei Millimeter lang. Ihre Eier sind sehr klein und haben eine wurstartig gekrümmte Form. Die erwachsenen Tiere legen ihren Nachwuchs in Gruppen von 15–25 Eiern ab. Die Maden der Kohldrehherzmücke sind beige, haben keine Füße, einen weißen Kopf und bewegen sich springend fort.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Alle Kreuzblütler.

Schadbild

Der Speichel der Larven zerstört die oberen Zellschichten des Blatts. Dadurch tritt Pflanzensaft aus, den die Larve frisst. Die geschädigten Blätter wachsen spiralförmig verdreht, es entstehen Verkorkungen und Missbildungen.

Wenn die Larven das Herz der Pflanze anfressen, entwickelt der Kohl keinen Kopf mehr. Er bildet stattdessen verstärkt Seitentriebe aus.


Die Larven können auch Bakterien übertragen, die den Kohl faulen lassen. Es ist wirklich unerfreulich, wenn statt einem knackigen Kohlkopf nur ein stinkender, matschiger Blätterhaufen auf einen im Garten wartet.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Kohldrehherzmücke sind Schlupfwespen, Raupenfliegen, Laufkäfer, Raubkäfer, Spinnen und Vögel. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine und Totholz. Nistkästen und ein ganzjähriges Futterangebot nehmen Vögeln dankbar an und wohnen dann gerne dauerhaft in deinem Garten.

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Kohldrehherzmücke ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Die Mischkultur mit Tomate und Sellerie sorgt dafür, dass die Kohldrehherzmücke deine Kohlpflanzen nicht über den Geruch finden kann. Wenn du eine weite Fruchtfolge einhältst, sorgst du dafür, dass der Tisch nicht jedes Jahr wieder reichlich gedeckt ist für die Kohldrehherzmücke und sie keine optimalen Vermehrungsbedingungen mehr vorfindet.



In windigeren Lagen fühlt sich die Kohldrehherzmücke nicht wohl und befällt deine Kohlpflanzen nicht so gerne. Erntereste solltest du nicht auf deinen Beeten liegen lassen, sondern auf den Kompost geben, wenn sie frei von Krankheiten und Schädlingen sind.

Soforthilfe

Da die Kohldrehherzmücke nur ganz kurz auf den Pflanzen bleibt, ist eine Bekämpfung schwierig. Du kannst aber eine Schmierseifenlösung auf die inneren Blätter spritzen. Dazu löst du 25 g Seife in einem Liter lauwarmem Wasser auf und füllst diese Lösung in eine Sprühflasche. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag, die Sonne verbrennt sonst die Blätter!



KOHLEULE

lat. Mamestra brassicae

Die Kohleule gehört zu den Eulenfaltern und ist ein Schmetterling. Sie hat eine Flügelspannweite von vier bis fünf Zentimetern und ihre Flügel sind grau-braun und haben ein Wellenmuster. Die begatteten Weibchen legen ungefähr 20–100 weiße halbkugelförmige Eier in Gruppen auf die Blattunterseiten. Die Raupe der Kohleule ist bis zu fünf Zentimeter lang, weist eine grün-braune Farbe auf und hat an der Seite einen hellen Streifen. Ihre Puppen sind rotbraun und kegelförmig. Die Kohleule überwintert als Puppe im Boden. Ab dem Frühjahr schlüpfen die Falter.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Kreuzblütler, Tomaten und Paprika, Salat, Rote Bete, Spinat, Erdbeeren, Zwiebeln und Rhabarber

Schadbild

Die Raupen fressen die Blätter bis auf das Blattgerippe ab und bohren sich von außen bis ganz nach innen in die Köpfe der verschiedenen Kohlarten. Dabei hinterlassen sie unregelmäßig geformte Fraßgänge und grün-schwarze Kotspuren. Auf dem Kot siedeln sich in der Folge gern Fäulniserreger an, was die Pflanze zusätzlich schwächt.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Kohleule sind Schlupfwespen, Kohlmeisen und Fledermäuse. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine, Totholz oder Trockenmauern. Das sind auch tolle Gestaltungselemente für den Garten!

Nistkästen und ein ganzjähriges Futterangebot nehmen Vögeln dankbar an und sie wohnen dann gerne dauerhaft in deinem Garten.

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Kohleule ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Soforthilfe

Wenn du Raupen der Kohleule entdeckst, sammelst du sie am besten sofort ab. Kontrolliere auch die Blattunterseiten, dort sitzen sie nämlich besonders gern!



Im Fachhandel gibt es das Bakterium *Bacillus thuringiensis* (BT-Präparat) zu kaufen, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist. Damit sprühst du deine Pflanzen gründlich ein. Die Bakterien töten die Raupen, während sie für Menschen und Haustiere unschädlich sind. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!

Aus jeder gefräßigen Raupe entwickelt sich ein schöner Schmetterling. Daher solltest du wirklich nur im Notfall zu solchen Mitteln greifen.





KOHLFLIEGE ODER RETTICHFLIEGE

lat. Delia radicum

Kohlfliegen ähneln kleinen grauen Stubenfliegen, sie gehören jedoch zur Familie der Blumenfliegen. Die Kleine Kohlfliege bringt es während der Saison auf bis zu vier Generationen. Die Große Kohlfliege bringt nur eine Generation hervor und verursacht keine gravierenden Schäden. Die Lebensweisen der beide Kohlfliegenarten sind identisch. Die Kohlfliege überwintert im Boden und schlüpft im April und Mai. Kohlfliegen legen ihre kleinen, länglichen weißen Eier oft am Wurzelhals der Jungpflanze oder in deren Nähe in der Erde ab. Nach einiger Zeit schlüpfen die gelblich-weißen Larven und beginnen sich an der Wirtspflanze zu laben.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Mal wieder die Kreuzblütler ...

Schadbild

Die Larven fressen an den Wurzeln der Pflanzen, dein Gemüse wirkt schlapp und welk. Die Blätter verfärben sich grau-braun und sterben ab. Befallene Pflanzen lassen sich ganz leicht aus dem Boden ziehen und haben zerfressene Wurzeln und einen beschädigten Wurzelhals.

Vorbeugende Maßnahmen

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Kohlfliege ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Du kannst deine Jungpflanzen auch mit einem Kohlkragen schützen. Das ist ein Kreis aus Filz oder fester Pappe mit einem Schnitt bis zum Mittelpunkt. Du legst ihn um deine Jungpflanze herum auf den Boden. Die Kohlfliege legt ihre Eier jetzt auf den Kohlkragen, wo sie vertrocknen und keinen Schaden mehr anrichten können.

Kohlkragen gibt es zu kaufen, du kannst sie aber auch ganz einfach selber machen. Dafür nimmst du Pappe, dicken Filz oder eine alte Wolldecke und malst mit Hilfe eines passenden Blumentopfs einen Kreis von 12 cm bis 15 cm Durchmesser. Den schneidest du aus, faltest ihn zur Hälfte und schneidest an dem Knick bis zur Mitte. Wenn du deinen Kohl in Mischkultur mit Sellerie und Tomate anbaust, verwirrt der Geruch die Kohlflye und sie findet deine Kohlpflanzen nicht mehr so leicht.

Soforthilfe

Wenn der Befall noch nicht so schlimm ist, kannst du deine Pflanzen vorsichtig ausgraben und den gesamten Wurzelbereich gründlich mit Wasser abspülen. Dadurch spülst du auch Maden und Eier von den Pflanzen, die du danach wieder vorsichtig in die Erde zurücksetzt. Du kannst mit Brennesseljauche 1:20 verdünnt gießen. Kohlfiegen finden den Geruch von Brennesseljauche nämlich genauso wenig attraktiv wie wir.

Mit einer besonders frühen oder besonders späten Aussaat »verpassen« deine Jungpflanzen die gefährliche Zeit der Eiablage und sind deshalb nicht von der Kohlflye betroffen.



KOHLMOTTE

lat. Plutella xylostella

Die Flügel der Kohlmotte haben eine Spannweite von 2 cm und sind dunkelbraun mit gelblichen Wellenstreifen auf der Oberseite. In Ruhestellung haben die Falter dadurch eine farbige Linie auf dem Rücken. Die Raupen sind etwa acht Millimeter lang und weisen eine grüne Farbe auf. Der Kopf ist erst schwarz und dann braun. Sie können sich an ihrem Gespinstfaden auf- und abseilen. Die Kohlmotte schlüpft Ende April und Anfang Mai und legt ihre Eier gruppenweise an den Blattunterseiten ab.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Kreuzblütler.

Schadbild

Die Raupen fressen an den Blättern, wobei sie erst kleinere Flächen an der Blattunterseite abschaben. Dann fressen die Raupen die Blätter bis auf das Blattgerippe ab.

Sie sitzen vor allem an den Herzblättern, wo du sie nur schwer entdecken kannst. Wenn die Raupen den Vegetationspunkt der Pflanze anfressen, entwickelt dein Kohl einen missgebildeten oder gar keinen Kopf mehr.

Die Kotkrümel, die sie hinterlassen, verschmutzen nicht nur dein Gemüse, sondern ziehen auch Fäulniserreger an. Das kann deine Pflanze noch weiter schwächen.

Vorbeugende Maßnahmen

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Kohlmotte ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben. Erntereste sollten nicht auf den Beeten liegen bleiben, wenn du Probleme mit der Kohlmotte hast. Es ist besser, wenn du sie oberflächlich in den Boden einarbeitest, sonst dienen sie der Kohlmotte als ein gemütliches Überwinterungslager.

Soforthilfe

Die natürlichen Feinde der Kohlmotte sind Schlupfwespen. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine oder Totholz.

Für dein Gewächshaus kannst du auch Schlupfwespen im Fachhandel kaufen und dort freilassen. Die machen sich dann unverzüglich an die Arbeit!

Neemöl lässt sich aus den Samen des Neembaums gewinnen und ist im ökologischen Landbau zugelassen. Du spritzt das nach Packungsanweisung verdünnte Neemöl direkt auf die Blätter, um gegen die Schädlinge vorzugehen. Vergiss die Blattunterseiten dabei nicht! Da sitzen die kleinen Übeltäter nämlich besonders gern. Wenn du mit Neemöl gießt, stärkt das die Pflanze über die Wurzeln von innen heraus.

Im Fachhandel gibt es das Bakterium *Bacillus thuringiensis* (BT-Präparat) zu kaufen, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist. Du sprühst deine Pflanzen gründlich damit ein. Die Bakterien töten die Raupen, während sie für Menschen und Haustiere unschädlich sind.

Aus jeder gefräßigen Raupe entwickelt sich ein schöner Falter. Daher solltest du wirklich nur im Notfall zu solchen Mitteln greifen.

Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!





KOHLTRIEBRÜSSLER

lat. Ceutorhynchus pallidactylus

Der Kohltriebrüssler gehört zur Familie der Rüsselkäfer. Er ist zwei bis drei Millimeter groß und grau-braun, schwarz oder dunkelgrün gefärbt. Seine Flügeldecken sind in Längsrichtung leicht gefurcht und haben feine Schuppen. Er hat einen dünnen, abwärtsgebogenen Rüssel und rötlich-braune Beine.

Die vier bis fünf Millimeter großen Larven sind bauchwärts leicht gekrümmt. Es sind kleine und fußlose Maden mit braunem Kopf, die Engerlingen ähneln.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Na, wer errät es? Die Kreuzblütler! :D

Schadbild

Kohltriebrüssler fressen buchtenartige Löcher in die Blätter. Die Larven fressen Wurzeln ab und höhlen Blütenknospen aus. Deine Pflanzen wirken welk und schlapp.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Kohltriebrüssler sind Igel, Laufkäfer, Spinnen und Tausendfüßler. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie aufgetürmte Steine, Totholz oder Trockenmauern. Igel freuen sich über unaufgeräumte Gartenecken, Laubhaufen und Igelhäuser.

Kohltriebrüssler legen ihre Eier sehr gerne in trockener Erde ab. Wenn du deinen Boden feucht hältst und dick mulchst, schreckt das den Kohltriebrüssler ab. Auch ein Kulturschutznetz mit feinen Maschen schützt deine Pflanzen.

Soforthilfe

Wenn der Kohltriebrüssler bei dir zuschlägt, ist die erste Maßnahme das Absammeln. Sehr mühselig, aber effektiv!

Außerdem kannst du dein Gießwasser mit etwas Neemöl versetzen, das hemmt die Entwicklung der Eier und Larven.

Nematoden sind Fadenwürmer, die ihren Wirt parasitieren. Wenn du sie ins Gießwasser gibst und deine Beete damit gießt, töten sie die Larven. Nur wenn der Kohltriebrüssler wirklich massive Schäden verursacht, solltest du zu dieser Maßnahme greifen.



KOHLWEISSLING

lat. Pieris brassicae, Pieris rapa



Der große Kohlweißling ist ein hübscher weißer Schmetterling mit einer Flügelspannweite von vier bis sechs Zentimetern. Die Vorderflügel haben schwarze Spitzen, die Flügel der Weibchen sind zusätzlich mit je zwei schwarzen Punkten versehen.

Die Raupen des großen Kohlweißlings sind bis zu vier Zentimeter lang und sind gelb und schwarz gefleckt.

Der kleine Kohlweißling ist im Vergleich zum Großen Kohlweißling gelblicher und seine Zeichnung blasser. Er hat nur vier Zentimeter Spannweite. Seine Raupen sind grünlich und etwa zwei Zentimeter lang.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Kreuzblütler und Fuchsschwanzgewächse.

Schadbild

Die Raupen des Kohlweißlings fressen die Blätter bis auf das Gerippe ab. Teilweise fressen sie sich auch in die Köpfe vom Kohl hinein. Dadurch können die Pflanzen absterben.

Während sie sich durch deinen Kohl fressen, hinterlassen die Raupen grünliche Kotpuren, auf denen sich gern Fäulniserreger ansiedeln. Das schwächt deine Pflanzen zusätzlich.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde des Kohlweißlings sind Schlupfwespen und Vögel. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels und Totholz. Nistkästen und ein ganzjähriges Futterangebot nehmen Vögeln dankbar an und sie wohnen dann gerne dauerhaft in deinem Garten.

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann der Kohlweißling seine Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Der Geruch von Tomaten, Thymian, Pfefferminze oder Salbei verwirrt den Kohlweißling und er kann deine Kohlpflanzen im Garten nur noch schlecht ausmachen. Denselben Effekt erreichst du, wenn du deine Beete mit den Geiztrieben deiner Tomaten mulchst.

Gesteinsmehl, das du auf deine Pflanzen stäubst, sorgt dafür, dass die Raupen keinen Appetit mehr auf die Blätter haben. Am besten stäubst du die Blätter früh morgens ein – dann verbindet sich das Gesteinsmehl mit dem Tau und kann am besten wirken. Das musst du allerdings nach jedem Regenschauer wiederholen.

Soforthilfe

Wenn du Raupen vom Kohlweißling entdeckst, sammelst du sie am besten sofort ab. Kontrolliere auch die Blattunterseiten, dort sitzen sie nämlich besonders gern!

Die gefräßigen Raupen kannst du dann zu anderen Kreuzblütlern wie Senf oder auch zu Kapuzinerkresse bringen, die du eher entbehren kannst. Dort können sie weiterleben und sich zu wunderschönen Schmetterlingen entwickeln.

Für dein Gewächshaus kannst du auch Schlupfwespen im Fachhandel kaufen und dort freilassen. Die machen sich dann unverzüglich an die Arbeit!

Im Fachhandel gibt es das Bakterium *Bacillus thuringiensis* (BT-Präparat) zu kaufen, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist. Sprühe damit deine Pflanzen gründlich ein. Die Bakterien töten die Raupen, während sie für Menschen und Haustiere unschädlich sind.

Aus jeder gefräßigen Raupe entwickelt sich ein schöner Schmetterling. Daher solltest du wirklich nur im Notfall zu solchen Mitteln greifen.



LAUCHMOTTE

lat. Acrolepiopsis assectella

Die Lauchmotte gehört zur Familie der Schmetterlinge. Die nachtaktiven Falter haben eine Flügelspannweite von 14 mm. Auf ihren hellgrauen, graubraunen oder schwarzen Flügeln ist ein weißer Fleck in der Mitte.

Die Raupen sind sieben bis acht Millimeter lang, sie weisen eine hellgrüne oder hellgelbe Farbe auf und haben eine braune Kopfkapsel.

Der Schmetterling legt zweimal im Jahr seine Eier an die Lauchpflanzen. An den Blättern kleben dann eiförmige Kokons, die mit einem Netz umhüllt sind. Die ausgewachsene Lauchmotte verursacht keine Schäden.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Zwiebelgewächse.

Schadbild

Die Raupen schaben erst an den Blattspitzen die Blattoberseite ab und fressen dann Miniergänge in die Blätter. An den Blättern entstehen dadurch hellbraune Flecken und Löcher.

Wenn sich die Raupen tief in das Herz der Pflanze hineinfressen, können Pilze und Fäulnisbakterien in die Fraßgänge eindringen. Im schlimmsten Fall stirbt die Pflanze dadurch ab. Vielleicht entdeckst du netzumhüllte Kokons, die von den Blättern herabhängen.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Lauchmotte sind Fledermäuse, Raupenfliegen, Schlupfwespen und Vögel. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine, Totholz und Nisthilfen.

Nistkästen und ein ganzjähriges Futterangebot nehmen Vögeln dankbar an und sie wohnen dann gerne dauerhaft in deinem Garten.

Beim Auspflanzen des besonders begehrten Lauchs kannst du die inneren Blätter mit Gesteinsmehl bestäuben. Das schreckt die Lauchmotte ab.

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Lauchmotte ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Der Geruch von Möhren, Petersilie und Sellerie verwirrt die Lauchmotte und sie kann deinen Lauch nicht mehr so leicht im Garten ausmachen.

Wenn du deine Zwiebelgewächse in windoffenen Lagen anbaust, schreckt das die Lauchmotte ab. Sie mag es nämlich viel lieber geschützt und windstill.

Soforthilfe


Am besten kontrollierst du deine Pflanzen regelmäßig auf Raupen und Eier und sammelst die Raupen ab. Wenn der Befall noch nicht so groß ist, kannst du die Larven in den Miniergängen zerdrücken. Stark befallene Blätter schneidest du ab und entsorgst sie in der Biotonne.

Du kannst deine Pflanzen mit einer Schmierseifen-Lösung bespritzen. Dazu löst du in einem Liter lauwarmem Wasser 25 g Schmierseife auf und sprühst die Lösung wiederholt auf die Blätter.

Oder du stellst eine Ackerschachtelhalmbrühe her: Dazu weichst du 150 g frischen oder 20 g getrockneten Ackerschachtelhalm in einem Liter Wasser für 24 Stunden ein und kochst dann alles eine Stunde lang. Wenn die Brühe komplett abgekühlt ist, seihst du sie ab und füllst sie in eine Sprühflasche um.

Alle Spritzmittel solltest du an einem bewölkten Tag ausbringen. Die Sonne kann sonst die Blätter verbrennen!





MAISZÜNSLER

lat. Ostrinia nubilalis

Der Maiszünsler ist ein nachtaktiver gelb-brauner Schmetterling mit drei Zentimetern Flügelspannweite. Er legt sehr helle, abgeflachte Eier in Gruppen von bis zu 50 Eiern. Die Raupen sind die eigentlichen Missetäter. Du erkennst sie an ihrer dunklen Kopfkapsel und der cremefarbenen bis ziegelroten Färbung. Sie überwintern im unteren Teil des Maisstängels oder im Wurzelbereich.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Mais.

Schadbild

Die Raupen fressen sich durch den Stängel der Maispflanzen und zerstören das Stängelmark und die Leitungsbahnen. Das stört den Transport von Wasser und Nährstoffe durch die Leitungsbahnen der Pflanze, wodurch die Versorgung und die Stabilität der Maispflanze leidet. Sie knickt dann bei Sturm leicht ab.

Die Maiskolben haben Bohrlöcher und Fraßgänge.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde des Maiszünslers sind Schlupfwespen. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels oder Totholzhaufen.


Nach der Ernte solltest du die Maispflanzen komplett aus dem Beet entfernen. Damit beseitigst du die überwinterten Raupen gleich mit.

Soforthilfe

Im Fachhandel gibt es das Bakterium *Bacillus thuringiensis* (BT-Präparat) zu kaufen, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist. Sprühe damit deine Pflanzen gründlich ein. Die Bakterien töten die Raupen, während sie für Menschen und Haustiere unschädlich sind.

Aus jeder gefräßigen Raupe entwickelt sich ein schöner Schmetterling. Daher solltest du nur im Notfall zu solchen Mitteln greifen.





MAULWURFSGRILLE

lat. Gryllotalpidae

Maulwurfsgriillen gehören zur Familie der Heuschrecken. Sie sind drei bis sechs Zentimeter groß und haben schaufelähnliche Vorderfüße. Der Körper ähnelt einem Flusskrebs. Maulwurfsgriillen sind nachtaktiv und ernähren sich in der Regel von Maden, Schneckeneiern und anderen Bodenlebewesen. In der Roten Liste sind sie als »stark gefährdet« geführt.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Maulwurfsgriillen sind nicht gerade wählerisch. Sie mögen alle Pflanzen zum Fressen gerne...

Schadbild

Maulwurfsgriillen legen jede Nacht dicht unter der Oberfläche neue Gänge an. Dadurch schädigen sie Saaten und Jungpflanzen.

Vorbeugende Maßnahmen

Solange der Bestand im Garten nicht überhandnimmt und wirklich große Schäden verursacht, solltest du nichts gegen die Maulwurfsgriillen unternehmen. Die natürlichen Feinde der Maulwurfsgriillen sind Igel, Amseln, Hühner und Katzen. Du kannst Igel und Amseln in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, Laubhäufen und Igelhäuser. Ein ganzjähriges Futterangebot nehmen Amseln dankbar an. Sie bleiben dann gerne das ganze Jahr über in deinem Garten.

Soforthilfe

Du kannst eine Falle bauen und die Maulwurfsgriillen dann in einen anderen Teil deines Gartens bringen. Dazu grabst du im Beet zwei Behälter mit glatten Wänden wie Einmachgläser oder große Konservendosen ebenerdig ein und stellst ein dünnes Holzbrett hochkant auf die Mitte der Behälteröffnungen. Maulwurfsgriillen bewegen sich gern entlang eines langgestreckten Hindernisses fort und fallen in die Behälter hinein. Die Gefangenen sammelst du gleich morgens ein und lässt sie in ausreichender Entfernung zum Garten auf der grünen Wiese wieder frei. Nematoden sind Fadenwürmer, die ihren Wirt parasitieren. Wenn du sie ins Gießwasser gibst und deine Beete damit gießt, töten sie die Larven.

Maulwurfsgriillen sind sehr selten geworden, darum solltest du dir diese Maßnahmen für den absoluten Notfall aufheben.



MINIERFLIEGE

lat. Agromyzinae

Die Minierfliege gehört zur Familie der Zweiflügler. Sie ist zwei bis drei Millimeter lang, dunkel gefärbt und dazu häufig gelb gezeichnet. Die Weibchen legen ihre Eier in die Blätter hinein. Daraus schlüpfen weißlich-gelbe Larven ohne Kopfkapsel und Beine.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Im Beet ist keine Pflanze vor der Minierfliege sicher.

Schadbild

Erste Anzeichen für einen Befall sind Löcher in den Blättern. Die Larven sind sogenannte Blattminierer. Sie fressen Minen bzw. Gänge in die Blätter, ohne dabei die äußere Blatthaut zu verletzen. Durch den Fraß trocknen Minen und Blätter aus. Die Blätter fallen ab. Minierfliegen übertragen auch Pilze, Viren und Bakterien.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Minierfliege sind Schlupfwespen. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft wie Insektenhotels oder Tatholzhaufen anbietest.

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Minierfliege ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Soforthilfe

Wenn der Befall noch nicht so groß ist, kannst du die Larven in den Gängen zerdrücken. Bei stärkerem Befall schneidest du die Blätter ab und gibst sie in die Biotonne.

Du kannst deine Pflanzen mit Brennnesseljauche 1:20 verdünnt gießen und spritzen. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!

Nematoden sind Fadenwürmer, die ihren Wirt parasitieren. Wenn du sie ins Gießwasser gibst und deine Beete damit gießt, töten sie die Larven.



MÖHRENBLATTFLOH

lat. Trioza apicalis



Der Möhrenblattfloh heißt Floh wegen seiner springenden Fortbewegungsweise – eigentlich gehört er aber zur Gruppe der Pflanzenläuse. Möhrenblattflöhe sind zwischen zwei und drei Millimetern groß und haben durchsichtige Flügel. Die ausgewachsenen Insekten sind hellgrün mit gelben Zeichnungen auf Rücken und Hinterleib.

Überwinterte Möhrenblattflöhe sehen etwas anders aus: Sie sind orange bis braun, haben halbkugelige Facettenaugen und drei rote Punktaugen.

Die Jungtiere sind ein bis zwei Millimeter groß und gelb-orange gefärbt.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Doldenblütler und Pimpinelle.

Schadbild

Der Möhrenblattfloh saugt Pflanzensaft aus den Möhrenblättern, wodurch sie verkräuseln.

Zunächst sind nur Wachstum und Ertrag beeinträchtigt, während sie Pflanzen bei starkem Befall sogar absterben können.

Vorbeugende Maßnahmen

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann der Möhrenblattfloh erst gar nicht an deine Pflanzen heran. Trotzdem solltest du unbedingt

wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben. Wenn deine Pflanzen das Fünf-Blatt-Stadium erreicht haben, kann der Möhrenblattfloh keine großen Schäden mehr anrichten.

Den Saatzeitpunkt von frühen Saaten wählst du am besten so, dass deine Möhren ihr Fünf-Blatt-Stadium schon erreicht haben, bevor die Hauptflugzeit des Möhrenblattflohs im Mai und Juni beginnt.

Soforthilfe

Du kannst als Spritzmittel Eichenjauche herstellen: Dazu gibst du 100 g Laub und junge Rinde in einen Liter kaltes Wasser, deckst das Gefäß luftdurchlässig ab und lässt es in der Sonne stehen. Gegen den Geruch kannst du Gesteinsmehl dazu geben.

Zweimal täglich gründlich umrühren. Wenn es nicht mehr schäumt, ist die Jauche fertig. Das ist in der Regel nach ungefähr 10-14 Tagen der Fall. Dann seihst du alles ab, füllst die Jauche 1:5 verdünnt in eine Sprühflasche um und besprüht damit deine Pflanzen. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!



MÖHRENMINIERFLIEGE

lat. Napomyza carotae



Die Fliegen sind etwa zwei Millimeter groß, dunkelgrau und stark behaart. Ab Mai schlüpfen die Fliegen der ersten Generation und stechen von unten in die Möhrenblätter. Dann legt das Weibchen seine Eier durch die Einstiche hindurch in das Blattinnere. Nach einer Woche schlüpfen die hungrigen Maden und fressen sich in Richtung Möhre, wo sie sich verpuppen. Im August schlüpfen die geflügelten Maden der zweiten Generation.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Doldenblütler.

Schadbild

Die Maden der ersten Generation fressen sich in die Möhre hinein. Die Fraßgänge befinden sich knapp unter der Erdoberfläche im oberen Wurzelkopfbereich. Dort siedeln sich später gerne Fäulniserreger an.

Die Maden der zweiten Generation verursachen Minierfraß an Blättern und Blattstängeln. Auf den Blattunterseiten und am Blattstängel siehst du dann graue Stellen mit Einstichen.

Vorbeugende Maßnahmen

Die Mischkultur mit Zwiebeln und anderen Zwiebelgewächsen ist super wirkungsvoll. Die natürlichen Feinde der Möhrenminierfliege sind Schlupfwespen. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft wie Insektenhotels oder Totholzhaufen anbietest.

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Möhrenminierfliege ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Soforthilfe

Das befallene Laub schneidest du ab und entsorgst es in der Biotonne. Deine Pflanzen kannst du mit Brennnesseljauche 1:20 spritzen und auch gießen. Das stärkt deine Pflanzen von innen heraus und hilft gegen die Möhrenminierfliege. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt sonst die Blätter!



NEMATODEN

lat. Nematoda

Nematoden sind wirbellose Fadenwürmer und gleichzeitig Schädlinge und Nützlinge. Sie sind unter einem Millimeter groß und können sich im Wasser schlängelnd fortbewegen.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Apfel, Erdbeere, Kartoffel, Gurke und Tomate.

Schadbild

Nematoden stechen mit ihrem Mundstachel in das Pflanzengewebe ein und geben dabei ein für die Pflanze schädliches Speichelsekret ab. Dabei können sie auch fiese Viren und Bakterien übertragen. Die Blätter krümmen und kräuseln sich, verfärben sich, welken und fallen ab. Die Pflanzen wachsen schlecht und setzen nur wenige Blüten an.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Nematoden sind Raubmilben und Raubnematoden. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie aufgetürmte Steine und Totholz oder Trockenmauern. Das sind auch tolle Gestaltungselemente für den Garten!


Eine Gründüngung mit Kamille und Borretsch vor der Pflanzung sorgt für einen gesunden Boden und starke Pflanzen. Tagetes, Zinnie, Ringelblume oder Senf sind giftig für Nematoden. Wenn du sie zwischen deine Pflanzen setzt, hast du eine super Abwehr geschaffen. Bei starkem Befall kannst du diese Pflanzen auch als Gründünger auf deinen Beeten anbauen.

Soforthilfe

Befallene Pflanzen solltest du unbedingt samt Wurzeln und Knollen in der Biotonne entsorgen, damit sich die Nematoden nicht weiter ausbreiten können.

Das Einhalten von Anbaupausen und Fruchtfolgen sorgt dafür, dass die Nematoden nicht ständig einen reich gedeckten Tisch vorfinden.





OHRWURM ODER OHRENKNEIFER

lat. Dermaptera

Ohrwürmer verdanken ihren etwas unglücklichen Namen gleich zwei Irrtümern: Zum einen sollen sie angeblich gegen Ohrenleiden und Schwerhörigkeit helfen und waren darum ein beliebtes Heilmittel. Zum anderen hält sich bis heute das hartnäckige Gerücht, dass Ohrwürmer ins Ohr kriechen und dort mit ihren Zangen zukneifen oder Eier ablegen. Nichts davon ist wahr!

Im Garten zählen Ohrwürmer eher zu den Nützlingen als zu den Schädlingen. Höchste Zeit also für eine Ehrenrettung dieser Tierchen! Ohrwürmer sind zwischen 12 und 20 Millimeter groß und rötlich-gelblich braun bis schwarz gefärbt. Am Hinterleib haben sie zwei spitze Zangen, die sie zur Verteidigung, für die Jagd nach Insekten und bei der Paarung einsetzen. Als nachtaktive Tiere lieben sie feuchte dunkle Verstecke, in denen sie den Tag verschlafen. Ihr Lieblingssessen ist unter anderem der Mehltaurasen auf Blättern. Wenn du also mehltaugeplagtes Gemüse im Beet hast, kannst du versuchen, dort Ohrwürmer anzusiedeln!

Blattläuse, Milben, Schmetterlingsraupen und Gelege von Apfelwicklern stehen ebenfalls auf dem Speiseplan von Ohrwürmern. Nur in sehr trockenen oder besonders insektenarmen Jahren machen sie sich auch gern mal über Blätter, Knospen und weiche Früchte her.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Jungpflanzen, Blüten und Obst.

Schadbild

Wenn es zu wenig Feuchtigkeit oder Nahrung in Form von Insekten oder Larven gibt, nagen Ohrwürmer gern an Pflanzenteilen, Blüten und Obst und hinterlassen dort ausgefrans-te Löcher. Für Jungpflanzen kann das fatal sein, gestandenes Gemüse lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Vorbeugende Maßnahmen

Vögel, Raubinsekten und Spinnen sind die natürlichen Feinde der Ohrwürmer. In einem naturnahen Garten siedeln sich diese Tiere automatisch an.

Soforthilfe

Wenn die Ohrwürmer überhandnehmen und sie deinem Gemüse mehr schaden als nutzen, kannst du eine Falle bauen. Dazu nimmst du einen Blumentopf und füllst ihn mit Stroh, Holzwole oder Heu und stellst ihn mit der Öffnung nach unten an die Stelle im Beet, wo dein Gemüse besonders unter dem Fraßangriff zu leiden hat. Auf der Suche nach einem Tagversteck finden die Ohrwürmer diesen idealen Unterschlupf und kriechen in den Topf. Den kannst du dann einfach nehmen und an einen anderen Ort bringen, zum Beispiel zu Pflanzen, die mit Mehltau zu kämpfen haben.





SCHNECKEN

lat. Gastropoda

Es gibt viele verschiedene Schneckenarten. Die graubraune, ungefähr einen Zentimeter lange Ackerschnecke, die sieben bis vierzehn Zentimeter lange Rote Wegschnecke und die Spanische Wegschnecke richten erhebliche Schäden im Gemüsebeet an. Schnecken mit Häuschen kannst du dagegen getrost ihrer Wege ziehen lassen. Schnecken lieben es feucht und sind vor allem nachts aktiv.

Welche Pflanzen sind betroffen?

So gut wie alle.

Schadbild

Nacktschnecken fressen alle Pflanzenteile ab. Die Pflanzen gehen ein oder sind über Nacht einfach „verschwunden“.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Schnecken sind Tigerschnegel. Das ist eine Nacktschneckenart mit einer gräulichen Farbe und einem tollen Tigermuster. Außerdem sind Weinbergschnecken und Hühner Fressfeinde der unersättlichen Tiere.

Du kannst deine Jungpflanzen vor ihnen mit einem Schneckenkragen schützen. Entweder kaufst du die im Fachhandel oder du stülpst Marmeladengläser über deine Pflanzen. Die Gläser musst du allerdings bei Sonnenschein abnehmen, sonst können die Pflänzchen verbrennen.

Wenn du den Rasen kurz hältst, finden die Schnecken nicht so viele Rückzugsmöglichkeiten. Eine dicke Mulchschicht aus spitzen Holzhackschnitzeln sorgt dafür, dass die Schnecken nur ungern darüber kriechen und deine Pflanzen weniger heimsuchen.

Soforthilfe

Wenn du abends ein Brett zwischen deine Gemüsereihen legst, verkriechen sich die Schnecken bis zum nächsten Morgen darunter und du kannst sie bequem absammeln.

Oder du gehst spät abends mit der Taschenlampe auf Schneckenjagd und sammelst die Plagegeister ab. Aber schön weit wegbringen. ;)



SPINNMILBEN

lat. Tetranychidae

Spinnmilben sind eine Familie innerhalb der Spinnentiere und eine Unterklasse der Milben. Sie erreichen eine Körperlänge von einem viertel bis dreiviertel Millimeter und sind hellgrün, gelb-grün, orange oder rot-braun gefärbt. Spinnmilben lieben ein trocken-warmes Klima und einen geschützten Standort. Sie sitzen vor allem auf den Blattunterseiten. Spinnmilben sind sehr klein, sodass du sie nur schwer sehen kannst.

Die Weibchen legen bis zu hundert Eier auf die Unterseiten der Blätter. Spinnmilben spinnen feine Netze und ernähren sich von Pflanzensaft.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Die Spinnmilben mögen alle deine Pflanzen.

Schadbild


Spinnmilben stechen in die Blätter und saugen Pflanzensaft heraus. Dadurch bekommen die Blätter helle Sprenkel auf der Blattoberseite, verfärben sich, rollen sich ein und vertrocknen. Auf den Blättern und Trieben befinden sich feine Spinnfäden oder dichte Gespinste. Du kannst sie gut sehen, wenn du deine Pflanzen mit Wasser ansprühst. Die Biester können Jungpflanzen so stark schädigen, dass sie eingehen.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Spinnmilben sind Raubwanzen, Laufkäfer, Marienkäfer und Florfliegen. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine, Totholzhaufen oder Trockenmauern.

Spinnmilben lieben die Trockenheit. Wenn du deine Pflanzen an heißen Tagen ausreichend gießt und vor allem im Gewächshaus für Luftfeuchtigkeit sorgst, finden sie keine angenehmen Lebensbedingungen vor.

Wenn du es mit der Stickstoffdüngung zu gut meinst, weicht das Gewebe auf und deine Pflanzen sind anfälliger für einen Befall. Darum dünge am besten maßvoll, dann sind deine grünen Freunde besser gegen Spinnmilben und andere Schädlinge gewappnet.



Soforthilfe

Wenn du einen Befall mit Spinnmilben feststellst, spritzt du die betroffenen Pflanzen am besten als erstes mit einem scharfen Wasserstrahl ab.

Neemöl lässt sich aus den Samen des Neembaums gewinnen und ist im ökologischen Landbau zugelassen. Du spritzt das nach Packungsanweisung verdünnte Neemöl direkt auf die Blätter, um gegen die Schädlinge vorzugehen. Vergiss die Blattunterseiten dabei nicht. Da sitzen die kleinen Übeltäter nämlich besonders gern! Wenn du mit Neemöl gießt, stärkt das auch die Pflanze über die Wurzeln von innen heraus. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!



THRIPSE

lat. Thysanoptera

Thripse, die auch die lustigen Namen Fransenflügler oder Blasenfüßler tragen, bilden eine Ordnung innerhalb der Klasse der Insekten. Sie sind dunkelbraun und ein bis drei Millimeter lang. Wenn du deine Pflanzen berührst, fliegen sie auf und du kannst sie besser sehen.

Die Larven der Thripse sind hellgrün gefärbt und sitzen vor allem auf der Blattunterseite. Thripse können die lappenartigen Endglieder ihrer Füße aufblasen, um einen besseren Halt auf der glatten Blattoberfläche zu haben. Sie fühlen sich vor allem bei warmer, trockener Luft wohl.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Nachtschattengewächse, Lauch, Gurken und Kräuter.

Schadbild

Thripse saugen Pflanzensaft an der Oberseite der Blätter aus und hinterlassen dabei fein gesprenkelte, silbrige Flecken auf den Blättern und winzige Kotpünktchen. Die Flecken breiten sich aus und die Blätter sterben ab. Die Pflanzentriebe wachsen verkrüppelt und Blütenstände entwickeln sich nicht weiter und blühen deshalb nicht.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Thripse sind Spinnen, Ameisen, Marienkäfer und die Larven der Florfliege. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmtes Totholz oder Trockenmauern. Thripse lieben die Trockenheit. Wenn du deine Pflanzen ausreichend gießt und den Boden mit einer dicken Multschicht feucht hältst, lassen sie dein Gemüse links liegen.

Kamille und Bohnenkraut verströmen einen Geruch, den Thripse nicht mögen. Du kannst sie als „Schutzpflanzen“ zwischen dein Gemüse setzen.

Soforthilfe

Wenn du deine Pflanzen immer wieder mit kalkfreiem Regenwasser besprühest, störst du die Schädlinge und sie vermehren sich nicht mehr so stark. Bei einem leichten Befall wäschst du die Blätter deiner Pflanzen vorsichtig mit Spülwasser ab.

Du kannst deine Pflanzen auch mit einem Knoblauch-Brennnessel-Sud besprühen: Dazu vermischst du 500 g Brennnesseln und 150 g frisch gepressten Knoblauch mit zwei Litern warmem Wasser. Das lässt du über Nacht bei Zimmertemperatur stehen. Dann seihst du es ab und besprühest damit deine Pflanzen im Abstand von einigen Tagen. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!





TRAUERMÜCKEN

lat. Sciaridae

Trauermücken sind kleine schwarze Fliegen mit einer Körpergröße von einem bis sieben Millimeter. Ihr Körper ist schmal und dunkel. Die Larven haben eine schlanke Form, sind weiß bis grau gefärbt mit einem schwarzen Kopf.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Leider alle.

Schadbild

Trauermückenlarven fressen an den Wurzeln der Pflanze und schädigen sie dadurch. Für Keimlinge und Jungpflanzen kann das so massiv sein, dass sie absterben, weil sie nicht mehr ausreichend Nährstoffe und Wasser aufnehmen können. Aber die Trauermücken stören auch ältere Pflanzen in ihrem Wachstum.

Bakterien dringen über die verletzten Wurzeln leichter in die Pflanzen ein und schwächen sie weiter.

Vorbeugende Maßnahmen

Die kleinen Fliegen lieben feuchte Erde. Am besten sorgst du dafür, dass deine Pflanzen nicht zu nass stehen.

Soforthilfe

Du kannst trockenen Kaffeesatz oder eine dicke Sandschicht auf die Erde geben und deine Jungpflanzen nur noch von unten gießen. Dadurch können die Trauermücken ihre Eier nicht mehr in die feuchte Erde legen.

Eine andere Möglichkeit ist es, Backpulver auf die Erdestäuben und anzusprihen. Trauermücken, die das Backpulver aufnehmen, werden davon abgetötet. So stoppst du die Vermehrung.

Außerdem kannst du mit sogenannten Gelbtafeln arbeiten. Die Missetäter werden davon angelockt und bleiben dann auf der Klebefläche hängen.

Nematoden sind Fadenwürmer, die ihren Wirt parasitieren. Wenn du sie ins Gießwasser gibst und deine Beete/Jungpflanzen damit gießt, töten sie die Larven.



WANZEN

lat. Heteroptera



Von fast tausend Wanzenarten sind nur wenige auf Pflanzen spezialisiert. Sie lassen sich unter dem Oberbegriff Blattwanzen zusammenfassen. Stinkwanzen sind grün und haben ein dreieckiges Rückenschild, Feuerwanzen sind rot-schwarz und haben ein ovales Rückenschild. Wanzen vermehren sich besonders stark, wenn es längere Zeit heiß und trocken ist.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Kohl, Kartoffeln, Bohnen, Beerenobst, Apfel- und Birnenbäume.

Schadbild

Wanzen stechen mit ihrem Mundstachel in die Blätter ein, geben Speichel ab und saugen Pflanzensaft heraus. Dabei können sie auch Viren übertragen. Die Einstichstelle verfärbt sich gelblich-bräunlich und die Blätter haben

rundliche, unterschiedliche große Löcher. Blüten, Früchte und Triebspitzen verkümmern.

Stinkwanzen können zur Verteidigung eine stinkende Flüssigkeit absondern. Früchte, die damit in Kontakt kommen, sind ungenießbar.

Vorbeugende Maßnahmen

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kommen die Wanzen erst gar nicht an deine Pflanzen heran. Trotzdem solltest du wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Die natürlichen Feinde von Wanzen sind Frösche, Kröten, Igel und verschiedene Vogelarten. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie aufgetürmtes Totholz oder Laubhaufen.

Nistkästen und ein ganzjähriges Futterangebot nehmen Vögel dankbar an und sie bleiben dann gerne in deinem Garten. Wanzen lieben Trockenheit. Wenn du deinen Boden mit einer dicken Mulchschicht feucht hältst, finden sie dein Gemüse nicht mehr besonders attraktiv. Während einer Hitzeperiode kontrollierst du deine Pflanzen am besten regelmäßig auf einen Befall mit Wanzen.

Soforthilfe

Du kannst die Wanzen mit einem kräftigen Wasserstrahl abspritzen oder einfach nur abschütteln. Anschließend sammelst du sie mit Handschuhen auf. So schützt du deine Hände vor dem übelriechenden Sekret der Stinkwanze.

Es gibt auch verschiedene Spritzmittel gegen Wanzen. Für eine Seifenlauge löst du 25 g Schmierseife in einem Liter Wasser auf und besprühst deine Pflanzen damit. Einen Knoblauchsud stellst du aus 70 g klein geschnittenen Knoblauchzehen her, die du mit einem Liter kochendem Wasser übergießt. Gut abkühlen lassen, abseihen und in eine Sprühflasche füllen. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!



WEISSE FLIEGE ODER KOHLMOTTEN SCHILDLAUS

lat. Trialeurodes vaporariorum

Die Weiße Fliege gehört zu den Mottenschildläusen und damit zu den Pflanzenläusen. Die nur zwei bis drei Millimeter große Weiße Fliege hat weiße, mit Wachst Staub bedeckte Flügel. Die Spannweite der Flügel beträgt ungefähr fünf Millimeter.

Die Weibchen legen ihre ovalen Eier kreisförmig oder halbkreisförmig an der Blattunterseite ab. Die Eier sind sehr klein und erst gelb-grün und später dunkelgrau.

Mit ihren kräftigen Hinterbeinen stößt sich die Weiße Fliege bei der kleinsten Erschütterung ab. Auffliegende weiße Punkte im Gemüsebeet sind daher ein deutliches Zeichen für einen Befall mit der Weiße Fliege.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Alle, aber besonders Kohl, Bohnen, Gurken und Tomaten.

Schadbild

Die Larven der Weißen Fliege saugen Pflanzensaft aus den Blättern, wobei sie auch Viren übertragen können. Die Blätter haben weiße Punkte oder eine Wachsschicht an der Blattunterseite und gelbe Sprenkel auf der Blattoberseite.

Durch das Saugen vergilben die Blätter zum Teil und fallen ab. Die Larven scheiden den im Pflanzensaft enthaltenen Zucker wieder aus. Dadurch entsteht eine klebrige Schicht auf Blättern und Stielen. In der Folge können sich Rußtaupilze ansiedeln. Die Pflanze wächst oft langsamer und Früchte haben Missbildungen.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Weißen Fliege sind Marienkäfer, Schlupfwespen und Spinnen. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine, Totholz oder Trockenmauern.

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Weiße Fliege ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Der intensive Geruch von Thymian, Pfefferminz, Dill, Rosmarin, Knoblauch, Lavendel oder Kümmel hält die Weiße Fliege von deinem Gemüse fern. Denselben Zweck erfüllen ausgeizte Triebe von Tomaten, die du zwischen die Pflanzen legst.

Die Weiße Fliege liebt windstille heiße Orte. Darum sorgst du im Gewächshaus am besten regelmäßig für Durchzug und vermeidest sehr heiße Temperaturen durch Beschattung und Lüften.

Soforthilfe

Pflanzen mit festen Blättern kannst du mit einem harten Wasserstrahl abspritzen. Weiche Blätter wischst du mit einem feuchten Tuch ab. Stark befallene Pflanzenteile schneidest du am besten ab und entsorgst sie in der Biotonne.

Du kannst auch verschiedene Spritzlösungen herstellen. Dazu hackst du zwei Zehen Knoblauch fein und übergießt sie mit heißem Wasser, lässt das Ganze abkühlen und seihst alles ab. Oder du machst aus einem Liter warmem Wasser und 25 g Schmierseife eine Seifenlauge. Sie muss vollständig abgekühlt sein, bevor du sie verwendest.

Neemöl hilft ebenfalls gegen die Weiße Fliege. Du verdünnst es wie auf der Packung angegeben und sprühst es auf deine Pflanzen.

Bei allen Spritzungen solltest du unbedingt auch die Blattunterseiten gründlich ansprühen. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt sonst die Blätter! Im Gewächshaus kannst du Schlupfwespen aus dem Fachhandel einsetzen.





WOLLLÄUSE UND WURZELLAUSE

lat. Pseudococcidae

Wollläuse, auch Schmierläuse oder Wurzelläuse genannt, sind zwischen einem und zwölf Millimeter groß und haben einen rosa, weiß oder hellbraun gefärbten Körper. Sie sind von einer schmierenden wattig-weißen Schicht umhüllt, die sie vor chemischen oder physikalischen Einflüssen schützt. Die Gelege der Wollläuse findest du an Blättern, in Blattachseln und auch in der Erde.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Korbblütler und Hülsenfrüchte.

Schadbild

Wollläuse saugen Pflanzensaft aus Blättern, Stängeln und Wurzeln und geben dabei ein Gift an die Pflanze ab. Den im Pflanzensaft enthaltenen Zucker scheiden sie wieder aus. Dadurch bildet sich ein klebriger Belag auf den Blättern und Stielen. Rußtaupilze siedeln sich gerne auf diesem Belag an und schwächen die Pflanze weiter. Die Blätter der befallenen Pflanzen färben sich gelb, rollen sich ein und fallen schließlich ab.

Wollläuse, die vor allem an den Wurzeln der betroffenen Pflanzen sitzen, heißen auch Wurzelläuse. Sie leben ausschließlich unter der Erde und saugen an den Pflanzenwurzeln.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Wollläuse sind Florfliegen, Marienkäfer und Schlupfwespen. Die natürlichen Feinde der Wurzelläuse sind Kurzflügelkäfer, Laufkäfer und Hundertfüßler. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, aufgetürmte Steine, Totholzhaufen oder Trockenmauern. Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, können die Wollläuse oder Wurzelläuse ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben. Die Mischkultur mit Zwiebeln, Tomaten und Lauch vertreibt die Schädlinge durch den Geruch, den die Pflanzen verströmen.

Soforthilfe

Stark befallene Blüten und Blätter schneidest du ab und entsorgst sie in der Biotonne. Du kannst auch mit Brennnesselbrühe gießen. Dazu kochst du 1 kg frische oder 200 g getrocknete Brennnesseln in 2 Litern Wasser auf, lässt es abkühlen und seihst alles ab. Damit gießt du 1:10 verdünnt deine Pflanzen. Bei einem Befall mit Wurzelläusen gräbst du die Pflanze aus, spritzt die Wurzeln mit einem möglichst scharfen Wasserstrahl ab und gräbst die Pflanze wieder ein.





WÜHLMÄUSE

lat. *Arvicolinae*

Wühlmäuse sind eine Unterfamilie der Wühler. Sie haben einen gedrungenen Körperbau mit stumpfer Schnauze, kleinen Augen und Ohren. Am bekanntesten sind die »*Ostscherm Maus*« und die »*Feldmaus*«. Die Fellfarbe reicht von gelbbraun bis fast schwarz. Die Bauchseite ist in der Regel heller. Die aufgeworfenen länglich-flachen Erdhaufen sind häufig mit Wurzel- und Grasresten durchsetzt und unterscheiden sich dadurch von Maulwurfshaufen.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Alle.

Schadbild

Die Wühlmaus frisst an allen unterirdischen und oberirdischen Pflanzenteilen. Dadurch welkt dein Gemüse. Teilweise »*verschwindet*« es einfach über Nacht von deinen Beeten.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Wühlmaus sind Katzen, Hunde, Füchse, Marder und Greifvögel. Du kannst um den Wurzelballen von Obstbäumen oder Obstgehölzen lockere Drahtkörbe mit einer Maschenweite von 13 mm bis 16 mm legen und mit einpflanzen, sodass der Korb zehn Zentimeter aus dem Boden herausragt. Dann können ihn die Wühlmäuse nicht überklettern.


Soforthilfe

Wühlmäuse vertreibst du am besten, indem du mehrere Methoden gleichzeitig anwendest. Leider sind hier wirklich Ausdauer und Durchhaltevermögen gefragt, bis du diese Tierchen los geworden bist.

Wenn du alle drei Tage einen Esslöffel Rizinusöl in jedes Loch gibst, das du findest, verjagt das die Wühlmäuse, weil sie davon Durchfall bekommen. Du kannst auch »Topcat-Fallen« oder Lebendfallen aufstellen. Wenn du Lebendfallen aufstellst, musst du sie aber mindestens einmal am Tag kontrollieren, damit deine Gefangenen nicht elendig verdursten. Sellerie oder Möhren als Köder haben sich in der Lebendfalle bewährt. Wenn du Hühner hast, kannst du sie mit Hilfe von Elektronetz-Zäunen bis knapp an die Beetränder laufen lassen. Die Wühlmäuse fühlen sich durch das ständige Scharren von oben nachhaltig gestört und suchen das Weite. Bei uns hat das super funktioniert!

Wenn du Hochbeete baust, bringst du am Boden am besten ein stabiles Drahtgitter mit einer Maschenweite von 13 mm bis 16 mm an, um die gefräßigen Nager aus deinen Beeten auszusperren.





ZWIEBELFLIEGE

lat. Delia antiqua

Die Zwiebelfliege ähnelt im Aussehen der Stubenfliege. Zwiebelfliegen sind grau-schwarz und ungefähr sieben Millimeter lang. Anfang Mai legt die Zwiebelfliege ihre Eier direkt neben den Zwiebelgewächsen ab. Aus den Eiern schlüpfen weißliche acht bis zehn Millimeter lange Maden.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Zwiebelgewächse

Schadbild

Die Maden fressen sich in die jungen Zwiebelpflanzen hinein und höhlen sie von innen aus. Dadurch verkrümmen die Blätter bogenförmig und verfärben sich gelblich-grau, bis sie verwelkt sind.

Die befallenen Pflanzen lassen sich ganz leicht aus der Erde ziehen. Wenn du sie aufschneidest, siehst du, dass sie von innen zerfressen sind. Häufig findest du auch die Übeltäter selber.

Vorbeugende Maßnahmen

Die natürlichen Feinde der Zwiebelfliege sind Schlupfwespen, Laufkäfer und Spinnen. Du kannst sie in deinen Garten locken, indem du ihnen eine attraktive Unterkunft anbietest wie Insektenhotels, Totholzhaufen oder Trockenmauern. Das sind auch tolle Gestaltungselemente für den Garten!

Wenn du deine Pflanzen mit einem Gemüseschutznetz abdeckst, kann die Zwiebelfliege ihre Eier erst gar nicht an deine Pflanzen legen. Trotzdem solltest du unbedingt wöchentlich kontrollieren, ob es nicht doch ein paar Exemplare unter das Netz geschafft haben.

Der Geruch von Möhren, Kohl, Bohnen, Ringelblumen, Pfefferminze oder Kamille verwirrt die Zwiebelfliege und sie können deine Zwiebeln nicht mehr so leicht im Garten ausmachen.

Das Einhalten der Fruchtfolge sorgt dafür, dass die Zwiebelfliege nicht jedes Jahr wieder einen reich gedeckten Tisch vorfindet und sich immer weiter ausbreitet. Befallene oder verfaulte Zwiebeln ziehst du möglichst bald heraus und entsorgst sie in der Biotonne. So minderst du den Befallsdruck.

Soforthilfe

Wenn der Befall noch nicht so stark ist, hilft es, mit Brennnesselbrühe oder Rainfarntee zu spritzen. Dazu gießt du auf 100 g frische Brennnesseln einen Liter Wasser und lässt diesen Aufguss zwei bis drei Tage stehen, bis sich die ersten Blasen bilden. Dann alles abseihen. Zweimal in der Woche gießt du damit deine Zwiebelpflanzen.

Für den Rainfarntee kochst du 30 g getrocknete Rainfarnblüten mit einem Liter Wasser für 30 Minuten auf, lässt alles abkühlen und seihst ab. 1:3 verdünnt spritzt du damit deine Pflanzen. Am besten spritzt du deine Pflanzen an einem bewölkten Tag. Die Sonne verbrennt dir sonst die Blätter!




Schädlingsabwehr in deinem Garten

Gemüseschädlinge werden dein Gemüse hier und da heimsuchen. Das ist eine Tatsache, aber kein Grund zur Verzweiflung!

Mit ein bisschen Geduld und Pflege kannst du deinem Gemüse helfen, gut damit fertig zu werden. Und ganz viel schafft die Natur auch im Alleingang!

Wenn du deinen Garten nämlich so gestaltest, dass die Fressfeinde der Gemüseschädlinge (wir nennen sie Nützlinge) gerne bei dir wohnen, wirst du von ihnen kräftige Unterstützung erhalten.

*Ich wünsche dir eine
dicke fette Ernte!*



Bildquellen

S. 4: Sadek's_Photography/Shutterstock.com
S. 5: Andre Mueller/Shutterstock.com
S. 8: Ch.Photos/Shutterstock.com
S. 9: Henrik Larsson/Shutterstock.com
S. 10: Martina Unbehauen/Shutterstock.com
S. 12: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 13: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 14: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 17: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 18: Holger Kirk/Shutterstock.com
S. 20: Muddy knees/Shutterstock.com
S. 21: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 23: Ihor Hvozdetyskyi/Shutterstock.com
S. 24: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com

S. 27: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 28: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 29: ZhdanHenn/Shutterstock.com
S. 30: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 31: Protasov_AN/Shutterstock.com
S. 33: Al_Ali/Shutterstock.com
S. 34: Henri Koskinen/Shutterstock.com
S. 37: Rupinder singh 0071/Shutterstock.com
S. 39: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 41: Young Swee Ming/Shutterstock.com
S. 42: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com
S. 43: Chrispo/Shutterstock.com
S. 44: Rizvanov Ruslan/Shutterstock.com

Copyright

*© Wurzelwerk 2026. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nur von Teilnehmer*innen des Kurses Gemüsegarten starten verwendet werden. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf es weder weitergegeben noch veröffentlicht werden.*