左侧保留原文图示

将右侧表格整体复制到现有 PPT 中；
左侧提示文字可删除。

功能领域	主要神经环路	关键机制或 生物标志物	潜在治疗方法
高阶社会认知 与模型更新	心理化网络： mPFC 、 TPJ 、 pSTS	心理状态归因 与模型更新	结构化观点采择课程； 基于反馈的社会接触 （更新社会模型）
社会线索知觉、动作 表征及社会预测／时 序加工	pSTS ； 小脑环路	线索加工与 预测编码	注视位置联动的注意 训练；交互模仿训练； 小脑神经调控
社会记忆与 社会—情感价值	海马– NAc ； 海马–杏仁核	海马– NAc 功能连接； 调节因素：催产素、 加压素	药物治疗与社会学习 任务相结合
社会奖赏 与社会兴趣	中脑边缘通路 （ VTA–NAc ）； mPFC	多巴胺能信号传导； E:I 平衡；调节因素： 催产素、加压素、阿 片类物质	靶向鼻内加压素治疗； 恢复 mPFC E:I 平衡

潜在治疗策略：不应直接视为已有充分临床证据支持的常规治疗方案。

社会神经环路与潜在治疗策略

功能领域	主要神经环路	关键机制或 生物标志物	潜在治疗方法
高阶社会认知 与模型更新	心理化网络： mPFC 、 TPJ 、 pSTS	心理状态归因 与模型更新	结构化观点采择课程； 基于反馈的社会接触 （更新社会模型）
社会线索知觉、动作表征及 社会预测／时序加工	pSTS ； 小脑环路	线索加工与 预测编码	注视位置联动的注意训练； 交互模仿训练； 小脑神经调控
社会记忆与 社会—情感价值	海马– NAc ； 海马–杏仁核	海马– NAc 功能连接； 调节因素：催产素、 加压素	药物治疗与社会学习任务相 结合
社会奖赏 与社会兴趣	中脑边缘通路 （ VTA–NAc ）； mPFC	多巴胺能信号传导； E:I 平衡；调节因素： 催产素、加压素、阿片类物 质	靶向鼻内加压素治疗； 恢复 mPFC E:I 平衡

潜在治疗策略：不应直接视为已有充分临床证据支持的常规治疗方案。