

# Obliczenia Naukowe – Sprawozdanie Laboratoria 2.

Jakub Kogut

10 listopada 2025

## 1 Zadanie 1

### 1.1 Opis problemu

W zadaniu należało powtórzyć eksperyment z zadania 5. z listy 1., jednakże ze zmienionymi danymi wejściowymi i zaobserwować ich wpływ.

### 1.2 Rozwiązanie

Wykorzystałem kod z poprzedniego zadania, zmieniając jedynie dane wejściowe, zgodnie z poleceniem: usunąłem ostatnią 9 z  $x_4$  oraz ostatnią 7 z  $x_5$ .

### 1.3 Wyniki

Tabela przedstawia wyniki eksperymentu oraz porównanie z wynikami na starych danych.

Algorytm	Float32 Stare	Float64 Stare	Float32 Nowe	Float64 Nowe
“w przód”	$-4.9994430 \cdot 10^{-1}$	$1.025188136829 \cdot 10^{-10}$	$-4.9994430 \cdot 10^{-1}$	$-4.296342739891 \cdot 10^{-3}$
“w tył”	$-4.5434570 \cdot 10^{-1}$	$-1.564330887049 \cdot 10^{-10}$	$-4.5434570 \cdot 10^{-1}$	$-4.296342998713 \cdot 10^{-3}$
rosnąco <sup>1</sup>	$-5.0000000 \cdot 10^{-1}$	$0.000000000000 \cdot 10^0$	$-5.0000000 \cdot 10^{-1}$	$-4.296342842280 \cdot 10^{-3}$
malejąco	$-5.0000000 \cdot 10^{-1}$	$0.000000000000 \cdot 10^0$	$-5.0000000 \cdot 10^{-1}$	$-4.296342842280 \cdot 10^{-3}$



### 1.4 Wnioski

Można zauważyć że wyniki dla Float32 nie uległy zmianie, natomiast dla Float64 zmieniły się znacząco. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku Float32 precyzja jest na tyle niska, że usunięcie tych elementów nie miało wpływu na wynik końcowy. W przypadku Float64 precyzja jest dużo większa, więc niewielka zmiana w danych wejściowych miała wpływ na wynik końcowy, po czym można wnioskować, że zadanie policzenia iloczynu skalarnego jest źle uwarunkowane.

## 2 Zadanie 2

### 2.1 Opis problemu

W zadaniu należy narysować wykres funkcji  $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$  przy użyciu dwóch programów do wizualizacji. Następnie należy policzyć granicę tej funkcji przy  $x \rightarrow \infty$  oraz porównać ją z wykresem.

Rysunek 1: Wykres funkcji  $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$  w programie DesmosRysunek 2: Wykres funkcji  $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$  w programie Wolfram Alpha

## 2.2 Rozwiązanie

Do wizualizacji użyłem programu *Desmos* oraz *Wolfram Alpha*. Obliczenie granicy:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{e^{-x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(1 + e^{-x}))}{\frac{d}{dx}(e^{-x})} && \text{(Reguła de l'Hospitala)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}}}{-e^{-x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + e^{-x}} = 1
 \end{aligned}$$

## 2.3 Wnioski

Na obydwu wykresach widać, że w okolicy  $x \in [30, 36]$  funkcja zaczyna zachowywać się niestabilnie, a następnie dla większych wartości  $x$  przyjmuje wartość 0, co jest sprzeczne z teorią, gdyż granica funkcji przy  $x \rightarrow \infty$  wynosi 1. Dzieje się tak, ponieważ dla dużych wartości  $x$  wyrażenie  $e^x$  staje się bardzo duże, natomiast  $\ln(1 + e^{-x})$  bardzo małe, przez co ich iloczyn, w zastosowanej przez programy arytmetyce, jest obciążony dużym błędem. Dla jeszcze większych wartości  $x > 36$  wartość  $\ln(1 + e^{-x}) \approx 0$  zatem cała funkcja przyjmuje wartość 0.

### 3 Zadanie 3

#### 3.1 Opis problemu

W zadaniu należy porównać dwie metody rozwiązywania układów równań liniowych: metodę eliminacji Gaussa oraz poprzez wzięcie macierzy odwrotnej. Eksperyment należy przeprowadzić dla różnych rozmiarów macierzy Hilberta oraz losowej o rosnącym wskaźniku uwarunkowania.

#### 3.2 Rozwiązanie

Do rozwiązania zadania użyłem podanych funkcji w `hilb.jt` oraz `matcond.jt` do generowania macierzy Hilberta oraz losowej o zadanym wskaźniku uwarunkowania. Następnie dla każdej z macierzy generowałem wektor  $b = A \cdot x$ , gdzie  $x$  to wektor jednostkowy. Następnie rozwiązywałem układ równań  $Ax = b$  za pomocą obu metod i liczyłem błąd bezwzględny pomiędzy otrzymanym rozwiązaniem a wektorem  $x$ .

#### 3.3 Wyniki

Poniżej w tabelach znajdują się wyniki eksperymentów dla macierzy Hilberta oraz losowych.

Rozmiar	Wskaźnik uwarunkowania	Rząd	Błąd metody Gaussa	Błąd metody odwrotnej
1	1.0	1	0.0	0.0
2	19.28	2	$5.66 \cdot 10^{-16}$	$1.40 \cdot 10^{-15}$
3	524.06	3	$8.02 \cdot 10^{-15}$	0.0
4	$1.55 \cdot 10^4$	4	$4.14 \cdot 10^{-14}$	0.0
5	$4.77 \cdot 10^5$	5	$1.68 \cdot 10^{-12}$	$3.35 \cdot 10^{-12}$
6	$1.50 \cdot 10^7$	6	$2.62 \cdot 10^{-10}$	$2.01 \cdot 10^{-10}$
7	$4.75 \cdot 10^8$	7	$1.26 \cdot 10^{-8}$	$4.71 \cdot 10^{-9}$
8	$1.53 \cdot 10^{10}$	8	$6.12 \cdot 10^{-8}$	$3.07 \cdot 10^{-7}$
9	$4.93 \cdot 10^{11}$	9	$3.87 \cdot 10^{-6}$	$4.54 \cdot 10^{-6}$
10	$1.60 \cdot 10^{13}$	10	$8.67 \cdot 10^{-5}$	$2.50 \cdot 10^{-4}$
11	$5.22 \cdot 10^{14}$	10	$1.58 \cdot 10^{-4}$	$7.61 \cdot 10^{-3}$
12	$1.75 \cdot 10^{16}$	11	$1.34 \cdot 10^{-1}$	$2.59 \cdot 10^{-1}$
13	$3.34 \cdot 10^{18}$	11	$1.10 \cdot 10^{-1}$	5.33
14	$6.20 \cdot 10^{17}$	11	1.46	8.71
15	$3.67 \cdot 10^{17}$	12	4.70	7.34
16	$7.87 \cdot 10^{17}$	12	$5.42 \cdot 10^1$	$2.98 \cdot 10^1$
17	$1.26 \cdot 10^{18}$	12	$1.37 \cdot 10^1$	$1.05 \cdot 10^1$
18	$2.24 \cdot 10^{18}$	12	$1.03 \cdot 10^1$	$2.48 \cdot 10^1$

Tabela 1: Wyniki eksperymentu dla macierzy Hilberta

#### 3.4 Wnioski

Dla wysokiego wskaźnika uwarunkowania, nie zależnie od rozmiaru macierzy, obie metody dają duże błędy, jednak metoda eliminacji Gaussa radzi sobie lepiej niż metoda z macierzą odwrotną. Natomiast próbując rozwiązać układ równań dla macierzy Hilberta zwiększając jej rozmiar, błąd rośnie bardzo szybko, co pokazuje, że macierze Hilberta są źle uwarunkowane. W przypadku macierzy losowych błąd również rośnie ze wzrostem wskaźnika uwarunkowania, jednakże nie jest to tak drastyczne jak w przypadku

Rozmiar	Wskaźnik uwarunkowania	Rząd	Błąd metody Gaussa	Błąd metody odwrotnej
5	1.0	5	$2.48 \cdot 10^{-16}$	$1.11 \cdot 10^{-16}$
5	10.0	5	$3.29 \cdot 10^{-16}$	$3.58 \cdot 10^{-16}$
5	$1.00 \cdot 10^3$	5	$5.74 \cdot 10^{-15}$	$4.56 \cdot 10^{-15}$
5	$1.00 \cdot 10^7$	5	$2.51 \cdot 10^{-10}$	$2.31 \cdot 10^{-10}$
5	$1.00 \cdot 10^{12}$	5	$6.32 \cdot 10^{-6}$	$2.92 \cdot 10^{-6}$
5	$1.59 \cdot 10^{16}$	4	$5.42 \cdot 10^{-1}$	$2.76 \cdot 10^{-1}$
10	1.0	10	$2.36 \cdot 10^{-16}$	$1.57 \cdot 10^{-16}$
10	10.0	10	$2.87 \cdot 10^{-16}$	$2.16 \cdot 10^{-16}$
10	$1.00 \cdot 10^3$	10	$1.55 \cdot 10^{-15}$	$2.73 \cdot 10^{-15}$
10	$1.00 \cdot 10^7$	10	$5.40 \cdot 10^{-10}$	$5.70 \cdot 10^{-10}$
10	$1.00 \cdot 10^{12}$	10	$1.32 \cdot 10^{-5}$	$4.48 \cdot 10^{-6}$
10	$2.43 \cdot 10^{16}$	9	$2.28 \cdot 10^{-1}$	$2.24 \cdot 10^{-1}$
20	1.0	20	$5.43 \cdot 10^{-16}$	$6.32 \cdot 10^{-16}$
20	10.0	20	$5.42 \cdot 10^{-16}$	$6.07 \cdot 10^{-16}$
20	$1.00 \cdot 10^3$	20	$2.15 \cdot 10^{-14}$	$1.99 \cdot 10^{-14}$
20	$1.00 \cdot 10^7$	20	$5.62 \cdot 10^{-10}$	$5.39 \cdot 10^{-10}$
20	$1.00 \cdot 10^{12}$	20	$5.07 \cdot 10^{-5}$	$5.19 \cdot 10^{-5}$
20	$3.24 \cdot 10^{16}$	19	$1.72 \cdot 10^{-1}$	$1.44 \cdot 10^{-1}$

Tabela 2: Wyniki eksperymentu dla macierzy losowych