Table des matières

1 Principe de Déviations Modérées pour l'équation différentielle stochastique de type Mckean-Vlasov **2**

1.1 Principe de déviation modère 2

1.2 Principe de déviation modérée pour les EDS de type McKean–Vlasov . . . 3

1.2.1 Construction de l'équation contrôlée associée 4

1.2.2 Principe de grandes déviations pour $\overline{Y}^{\varepsilon}$ 5

1.2.3 Équivalence exponentielle entre $\overline{X}^{\varepsilon}$ et $\overline{Y}^{\varepsilon}$ 14

Chapitre 1

Principe de Déviations Modérées pour l'équation différentielle stochastique de type Mckean-Vlasov

1.1 Principe de déviation modère

***Théorème* 1.1.1** (Déviations modérées)**.** Soit $X_1, \ldots, X_n$ une suite de vecteurs aléatoires i.i.d. à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ telle que $\Lambda_X(\lambda) := \log E[e^{i\lambda(X_i)}] < \infty$ dans une boule autour de l'origine, $E(X_i) = 0$, et $\mathbf{C}$, la matrice de covariance de X_1, soit inversible. On fixe une suite $a_n \to 0$ telle que $na_n \to \infty$ quand $n \to \infty$, et on pose $Z_n := \sqrt{\frac{a_n}{n}} \sum_{i=1}^n X_i = \sqrt{na_n}\hat{S}_n$. Alors, pour tout ensemble mesurable Γ,

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \inf_{x \in \Gamma^o} \langle x, \mathbf{C}^{-1}x \rangle &\leq \liminf_{n\to\infty} a_n \log P(Z_n \in \Gamma) \\ &\leq \limsup_{n\to\infty} a_n \log P(Z_n \in \Gamma) \\ &\leq -\frac{1}{2} \inf_{x \in \bar{\Gamma}} \langle x, \mathbf{C}^{-1}x \rangle. \end{aligned}$$

Preuve. La preuve complète de ce théorème peut être consultée dans [Livre de démbo]

***Remarque* 1.1.1.** Le théorème (1.1.1) est représentatif de ce qu'on appelle le Principe des Déviations Modérées (MDP), dans lequel, pour une certaine fonction $\gamma(\cdot)$ et pour toute une gamme de suites $a_n \to 0$, les sites $\{\gamma(a_n)Y_n\}$ satisfont un Principe de Grandes Déviations avec la même fonction de taux. Ici, $Y_n = \sqrt{n}\hat{S}_n$ et $\gamma(a) = a^{\frac{1}{2}}$ (comme dans d'autres situations où Y_n obéit au théorème de la limite centrale).

Nous présentons ci-dessous un lemme fondamental de la méthode de convergence faible, qui permet d'établir un principe de grandes déviations pour la famille de processus considérée, la convergence en distribution étant notée $\to^*$ce résultat est présenté dans [17 ' A moderate deviation principle for stochastic Volterra equation.'].

***Lemme* 1.1.2.** Pour tout $\varepsilon > 0$, soit Γ^ε une application mesurable de $C([0,T];\mathbb{R}^d)$ dans $C([0,T];\mathbb{R}^d)$. Supposons que $\{\Gamma^\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ satisfait les hypothèses suivantes : il existe une application mesurable $\Gamma^0 : C([0,T];\mathbb{R}^d) \to C([0,T];\mathbb{R}^d)$ telle que

(a) Pour tout $N < +\infty$ et toute famille $\{h_\varepsilon : \varepsilon > 0\} \subset \mathscr{A}_N$ satisfaisant que h_ε converge en distribution comme variable aléatoire à valeurs S_N, vers h lorsque $\varepsilon \to 0$, alors

$$\Gamma^\varepsilon \left(W + \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \int_0^\cdot \dot{h}_\varepsilon(s)ds \right) \to^* \Gamma^0 \left(\int_0^\cdot \dot{h}(s)ds \right) \quad \text{quand} \quad \varepsilon \to 0.$$

(b) Pour tout $N < +\infty$, l'ensemble $\{\Gamma^0(\int_0^\cdot h(s)ds) : h \in S_N\}$ est un sous-ensemble compact de $C([0,T];\mathbb{R}^d)$.

Alors la famille $\{\Gamma^\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ satisfait un principe de grande déviation dans $C([0,T];\mathbb{R}^d)$ avec la fonction taux I donnée par

$$I(g) := \inf_{h\in H: g=\Gamma^0(\int_0^\cdot \dot{h}(s)ds)} \left\{\frac{1}{2}\int_0^T |\dot{h}(s)|^2 ds\right\}, \quad g \in C([0,T];\mathbb{R}^d)$$

avec $\inf \emptyset = \infty$ par convention.

1.2 Principe de déviation modérée pour les EDS de type McKean–Vlasov

Dans le Chapitre 2, nous avons étudié les déviations de la solution X_t^ε de l'équation (Ref 2.1) par rapport à la solution limite X_t^0 définie par (Ref 2.7), en analysant le comportement asymptotique de la trajectoire normalisée

$$\overline{X}_t^\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\,\lambda(\varepsilon)}\left(X_t^\varepsilon - X_t^0\right), \qquad t \in [0,T]. \tag{1.2.1}$$

Cependant, l'échelle du théorème central limite ne permet de décrire que des fluctuations de faible amplitude autour de la trajectoire déterministe, et ne capture pas des déviations plus importantes. À l'inverse, le principe de grandes déviations, correspondant à une normalisation de l'ordre $1/\varepsilon$, décrit des événements extrêmement rares de probabilité exponentiellement petite.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au comportement asymptotique de la trajectoire normalisée (1.2.1) dans un régime intermédiaire, dit de déviation modérée, où la fonction d'échelle $\lambda(\varepsilon)$ vérifie

$$\lambda(\varepsilon) \longrightarrow +\infty \quad \text{et} \quad \sqrt{\varepsilon}\,\lambda(\varepsilon) \longrightarrow 0, \qquad \text{lorsque } \varepsilon \to 0. \tag{1.2.2}$$

Nous disposons d'un théorème portant sur le principe de déviation modérée pour la famille de processus $(X_t^\varepsilon)_{\varepsilon\in(0,1)}$

***Théorème* 1.2.1.** Sous les hypothèses **(H1)** et **(H2)**, $\overline{X}^\varepsilon$, définie par (2.8), satisfait un principe de grande déviation sur $C([0,T];\mathbb{R}^d)$ avec la fonction de taux I définie par

$$I(g) := \inf_{\{h\in\mathbb{H}; g=\Gamma^0(\int_0^\cdot h(s)ds)\}} \left\{\frac{1}{2}\int_0^T |\dot{h}(s)|^2 ds\right\}, \quad g \in C([0,T];\mathbb{R}^d), \tag{1.2.3}$$

où, par convention, $I(g) = \infty$ si $\{h \in \mathbb{H}; g = \Gamma^0(\int_0^\cdot \dot{h}(s)ds)\} = \emptyset$ et $Y_h := \Gamma^0(\int_0^{0\cdot} h(s)ds)$ satisfait l'équation suivante :

$$dY_t^h = \left\{\nabla_{Y_t^h} b_t(\cdot, \delta_{X_t^0})(X_t^0) + \sigma_t(X_t^0, \delta_{X_t^0})\dot{h}(t)\right\} dt. \tag{1.2.4}$$

À partir de (2.1), (2.7) et (2.8), on peut voir que $\overline{X}^\varepsilon$ satisfait l'équation suivante :

$$\overline{X}_t = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}\int_0^t [b_s(X_s^\varepsilon, \mathcal{L}_{X_s^\varepsilon}) - b_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})]ds + \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\int_0^t \sigma_s(X_s^\varepsilon, \mathcal{L}_{X_s^\varepsilon})dW_s. \tag{1.2.5}$$

Dans la suite, nous cherchons à montrer que la loi de $\overline{X}_t^\varepsilon$ satisfait un principe de grandes déviations. À cette fin, nous rappelons d'abord que le principe de grandes déviations consiste à identifier un chemin déterministe autour duquel la diffusion se concentre avec une probabilité écrasante, de sorte que le mouvement stochastique peut être vu comme une petite perturbation aléatoire de ce chemin déterministe. Cela signifie en particulier que la loi de $\overline{X}_t^\varepsilon$ est proche d'une masse de Dirac si ε est suffisamment petit. Nous procédons donc en deux étapes pour établir que la loi de $\overline{X}_t^\varepsilon$ satisfait un principe de grandes déviation.

Premièrement, notons que $\mathcal{L}_{X_t^\varepsilon}$ converge en loi vers $\delta_{X_t^0}$ lorsque l'échelle de déviation $\lambda(\varepsilon)$ satisfait (1.2.2). Nous remplaçons alors $\mathcal{L}_{X_t^\varepsilon}$ par $\delta_{X_t^0}$ dans (1.2.5) et obtenons une équation différentielle stochastique approchée de (1.2.5) donnée par :

$$\overline{Y}_t^\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)} \int_0^t [b_s(\widetilde{Y}_s^\varepsilon, \delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})]ds + \frac{1}{\lambda(\varepsilon)} \int_0^t \sigma_s(\widetilde{Y}_s^\varepsilon, \delta_{X_s^0})dW_s, \tag{1.2.6}$$

où

$$d\widetilde{Y}_t = b_t(\widetilde{Y}_t^\varepsilon, \delta_{X_t^0})dt + \sqrt{\varepsilon}\sigma_t(\widetilde{Y}_t^\varepsilon, \delta_{X_t^0})dW_t \text{ et } \overline{Y}_t = \frac{\widetilde{Y}_t^\varepsilon - X_t^0}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}$$

Nous établissons ensuite que la loi de $\overline{Y}_t^\varepsilon$ satisfait un principe de grandes déviations.

Deuxièmement, nous affirmons que $\overline{X}_t^\varepsilon et \overline{Y}_t^\varepsilon$ sont exponentiellement équivalents. Par conséquent, la loi de $\overline{X}_t^\varepsilon$ satisfait un principe de grandes déviations avec la bonne fonction de taux $I(g)$ donnée en (1.2.3) du fait que le principe de grandes déviations ne distingue pas les familles exponentiellement équivalentes.

Nous présentons ici l'équation contrôlée associée au système ; elle constitue le pivot de l'analyse asymptotique et de la détermination de la fonction de taux.

1.2.1 Construction de l'équation contrôlée associée

***Théorème* 1.2.2.** Yamada-watanabe

D'après le théorème de Yamada-Watanabe, l'unicité en loi et l'unicité trajectorielle de l'équation satisfaite par $\overline{Y}^\varepsilon$ garantissent l'existence d'une application mesurable

$$\Gamma^\varepsilon : C([0,T];\mathbb{R}^d) \to C([0,T];\mathbb{R}^d)$$

telle que la solution puisse s'écrire comme une fonctionnelle du bruit directeur :

$$\overline{Y}_\cdot^\varepsilon = \Gamma^\varepsilon\left(\frac{1}{\lambda(\varepsilon)}W\right).$$

On considère une famille de contrôles $h_\varepsilon \in \mathscr{A}_N$ tel que :

$$\mathbb{E}_\mathbb{P}\left(\exp\left\{\frac{1}{2}\int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(s)|^2 ds\right\}\right) < \infty.$$

Cette condition de Novikov permet de définir la martingale exponentielle

$$R_T = \exp\left\{-\int_0^T \dot{h}_\varepsilon(s)d\frac{W_s}{\lambda(\varepsilon)} - \frac{1}{2}\int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(s)|^2 ds\right\}$$

. et la nouvelle mesure de probabilité $\mathbb{P}_\varepsilon = R_T\mathbb{P}$. Par le théorème de Girsanov, le processus

$$\frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\widetilde{W}_t := \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}W_t + \int_0^t \dot{h}_\varepsilon(s)ds.$$

est un mouvement brownien sous $\mathbb{P}_\varepsilon$. En remplaçant le bruit $\frac{1}{\lambda(\varepsilon)}W_\cdot$ dans la fonctionnelle Γ^ε par sa version déformée $\frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\widetilde{W}_\cdot$, on définit le processus contrôlé

$$\overline{Y}_\cdot^{\varepsilon,h_\varepsilon} = \Gamma^\varepsilon\left(\frac{1}{\lambda(\varepsilon)}W_\cdot + \int_0^t \dot{h}_\varepsilon(s)ds\right).$$

Ce processus vérifie l'équation différentielle stochastique contrôlée suivante :

$$\begin{aligned} d\overline{Y}_\cdot^{\varepsilon,h_\varepsilon} =& \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}[b_t(Y_t^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_t^0}) - b_t(X_t^0,\delta_{X_t^0})]dt \\ &+ \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\sigma_t(Y_t^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_t^0})dW_t + \sigma_t(Y_t^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_t^0})\dot{h}_\varepsilon(t)dt, \end{aligned} \tag{1.2.7}$$

où $Y_t^{\varepsilon,h_\varepsilon} := X_t^0 + \sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}$.

Pour que le contenu soit autonome, nous donnons dans la sous-section suivante l'esquisse de la preuve de la loi de $\overline{Y}^\varepsilon$ satisfaisant un principe de grandes déviations.

1.2.2 Principe de grandes déviations pour $\overline{Y}^\varepsilon$

***Lemme* 1.2.3.** Sous les hypothèses de théorème (1.2.1) , la famille $(\overline{Y}^\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ satisfait un principe de grandes déviations dans $C([0,T];\mathbb{R}^d)$ muni de la topologie de la norme uniforme, avec la bonne fonction de taux $I(g)$ donnée en (1.2.3)

D'après le Lemme (**??**, pour achever la démonstration du Lemme (1.2.3), il suffit de vérifier les conditions (a) et (b) du Lemme (1.1.2). Les lemmes suivants jouent un rôle clé dans la preuve du Lemme (1.2.3).

***Lemme* 1.2.4.** Sous les hypothèses **(H1)** et (2.5) de **(H2)**, pour tout $h \in \mathbb{H}$, l'équation (2.12) admet une unique solution $Y_\cdot^h$ dans $C([0,T];\mathbb{R}^d)$. De plus, pour tout $N > 0$, il existe une constante $C_{N,T}$ telle que

$$\sup_{h\in S_N}\left\{\sup_{0\le t\le T}|Y_t^h|\right\} \le C_{N,T}. \tag{1.2.8}$$

Preuve. Par l'hypothése **(H1)** et **(H2)** les coefficients de (1.2.4) satisfait la condition lipschitiz donc l'équation (1.2.4) admet une solution unique Y^h dans $C([0,T],\mathbb{R})^d$. Maintenant, nous allons montre que pour tout $N > 0$, il existe une constante $C_{N,T}$ telle que $\sup_{h\in S_N}\left\{\sup_{0\le t\le T}|Y_t^h|\right\} \le C_{N,T}$.

On a :

$$dY_t^h = \left\{\nabla_{Y_t^h} b_t(\cdot,\delta_{X_t^0})(X_t^0) + \sigma_t(X_t^0,\delta_{X_t^0})\dot{h}(t)\right\}dt.$$

alors

$$Y_t^h = \int_0^t \left\{\nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0) + \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\dot{h}(s)\right\}ds.$$

pour tout $t \in [0,T]$:

$$\begin{aligned} \sup_{0\le t\le T}|Y_t^h| &= \sup_{0\le t\le T}\left|\int_0^t \left\{\nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0) + \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\dot{h}(s)\right\}ds\right|. \\ &\le \int_0^T \left|\left\{\nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0) + \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\dot{h}(s)\right\}\right|ds. \end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité triangulaire et la continué de la norme par rapport a l'intégration on obtient :

$$\leq \int_0^T \left\| \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0) \right\| ds + \int_0^T \left\| \sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0}) \dot{h}(s) \right\| ds.$$

Pour le premier terme, d'après l'hypothése (**H2**) on a

$$\left\| \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0) \right\| \leq K(s)(1 + |X_s^0| + W_2(\delta_{X_s^0}, \delta_0))|Y_s^h|$$

et pour le deuxième terme, en utilisant l'inégalité (2.3) d'hypothèse (**H1**)

$$\left\| \sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0}) \dot{h}(s) \right\| \leq K(s)(1 + |X_s^0| + W_2(\delta_{X_s^0}, \delta_0))|\dot{h}(s)| \text{ or } W_s(\delta_{X_s^0}, \delta_0) \leq |X_s^0|.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^h| &\leq \int_0^T K(s)(1 + 2|X_s^0|)|Y_s^h| ds + \int_0^T K(s)(1 + 2|X_s^0|)|\dot{h}(s)| ds. \\ &\leq K(T) \Big(\int_0^T (1 + 2|X_s^0|)|Y_s^h| ds + \int_0^T (1 + 2|X_s^0|)|\dot{h}(s)| ds \Big). \end{aligned}$$

En appliquant l'inégalité de Hölder au second terme du membre de droite, ainsi que le Lemme (2.2.3), et $h \in S_N$ on obtient

$$\begin{aligned} &\leq K(T) C_T \Big(\int_0^T |Y_s^h| ds + T^{\frac{1}{2}} \Big(\int_0^T |\dot{h}(s)|^2 ds \Big)^{\frac{1}{2}} \Big). \\ &\leq K(T) C_T \Big(\int_0^T |Y_s^h| ds + \sqrt{TN} \Big). \end{aligned}$$

En appliquant l'inégalité de Gronwall on a :

$$\begin{aligned} &\sup_{h \in S_N} \sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^h| \leq K(T) C_T \sqrt{TN} \exp\{T K(T) C_T\} \text{ ou bien .} \\ &\sup_{h \in S_N} \sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^h| \leq C_{T,N}. \end{aligned}$$

Premièrement,nous prouvons que la condition(b) du Lemme **??**lem :3.1.2) est satisfaite.

***Lemme* 1.2.5.** Sous les hypothèses (H1) et (2.5) de (H2), pour tout nombre positif $N < \infty$, la famille

$$K_N := \left\{ \Gamma^0 \left(\int_0^{\cdot} \dot{h}(s) ds \right); h \in S_N \right\},$$

est compacte dans $C([0,T]; \mathbb{R}^d)$, où l'application Γ^0 est définie dans le Théorème (1.2.1).

Preuve. Pour tout $N < \infty$, l'ensemble K_N est compact si la compacité de S_N et la continuité de l'application Γ^0 de S_N vers $C([0,T]; \mathbb{R}^d)$ sont vérifiées. Pour cela, il suffit de montrer que Γ^0 est une application continue de S_N vers $C([0,T]; \mathbb{R}^d)$. Soit $h_n \to h$ dans S_N lorsque $n \to \infty$. Alors

$$Y_t^{h_n} - Y_t^h = \int_0^t \nabla_{(Y_s^{h_n} - Y_s^h)} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0) ds + \int_0^t \sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})(\dot{h}_n(s) - \dot{h}(s)) ds$$

Supposons que :

$$I_1^n(t) := \int_0^t \nabla_{(Y_s^{h_n}-Y_s^h)} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0)ds.$$
$$I_2^n(t) := \int_0^t \sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})(\dot{h}_n(s) - \dot{h}(s))ds.$$

Premièrement, on vas étudie le premier terme $I_1^n(t)$, pour tout $t \in [0;T]$ on a :

$$\begin{aligned}|I_1^n(t)| &= \Big| \int_0^t \nabla_{(Y_s^{h_n}-Y_s^h)} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0)ds \Big| \\ &\leq \int_0^t \Big\| \nabla_{(Y_s^{h_n}-Y_s^h)} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0) \Big\| ds.\end{aligned}$$

D'après l'hypothése (**H2**) et (3.3) on a :

$$\Big\| \nabla_{(Y_s^{h_n}-Y_s^h)} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0) \Big\| \leq K(s)(1 + |X_s^0| + W_2(\delta_{X_s^0}, \delta_0))|Y_s^{h_n} - Y_s^h|.$$

or $W_2(\delta_{X_s^0}, \delta_0) \leq |X_s^0|$ alors

$$\leq K(s)(1 + 2|X_s^0|)|Y_s^{h_s} - Y_s^h|.$$

Ainsi,

$$|I_1^n(t)| \leq \int_0^t K(s)(1 + 2|X_s^0|)|Y_s^{h_s} - Y_s^h ds|.$$

Pour tout $t \in [0;T]$ on a :

$$\sup_{0\leq t\leq T} |I_1^n(t)| \leq C_T \int_0^T |Y_s^{h_s} - Y_s^h|ds. \tag{1.2.9}$$

Soit $g^n(t) = \int_0^t \sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\dot{h}_n(s)ds$. D'après (H1), inégalité de Hölder, le Lemme 3.2, et $h_n, h \in S_N$, nous obtenons

$$\begin{aligned}|g^n(t)| &= |\int_0^t \sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\dot{h}_n(t)ds| \\ &\leq \Big(\int_0^t \|\sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\|^2 ds \Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\int_0^t |\dot{h}_n(s)|^2 ds \Big)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \Big(\int_0^t K(s)|1 + |X_s^0| + W_2(\delta_{X_s^0}, \delta_0)|ds \Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\int_0^t |\dot{h}_n(s)|^2 ds \Big)^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

or $W_s(\delta_{X_s^0}, \delta_0) \leq |X_s^0|$ et en utilisant (3.3) nous avons :

$$\leq \Big(\int_0^t K(s)|1 + 2|X_s^0|ds \Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\int_0^t |\dot{h}_n(s)|^2 ds \Big)^{\frac{1}{2}} \leq C_{T,N} \leq \infty.$$

De même, pour tout $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq T$,

$$\begin{aligned}|g^n(t_2) - g^n(t_1)| &\leq \int_{t_1}^{t_2} \|\sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\||\dot{h}_n(s)|ds \\ &\leq \int_{t_1}^{t_2} K(s)(1 + |X_s^0| + W_2(\delta_{X_s^0}, \delta_0))|\dot{h}_n(s)|ds \\ &\leq \int_{t_1}^{t_2} K(s)(1 + 2|X_s^0|)|\dot{h}_n(s)|ds \\ &\leq C(T) \int_{t_1}^{t_2} |\dot{h}_n(s)|ds \\ &\leq C(T)(t_2 - t_1)^{1/2} \Big(\int_{t_1}^{t_2} |\dot{h}_n(s)|^2 ds \Big)^{1/2} \\ &\leq C(T, N)(t_2 - t_1)^{1/2}.\end{aligned}$$

Ainsi, la famille de fonction $\{g^n\}_{n\geq 1}$ est équicontinue dans $C([0,T];\mathbb{R}^d)$. D'après le théorème d'Ascoli-Arzelà, $\{g^n\}_{n\geq 1}$ est relativement compacte dans $C([0,T];\mathbb{R}^d)$. Soit g un point limite de $\{g^n\}_{n\geq 1}$. En remarquant que $h_n \to h$ dans S_N, nous avons

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^t \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\dot{h}_n(s)ds = \int_0^t \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\dot{h}(s)ds, \text{ pour tout } t\in[0,T],$$

c'est-a-dire $\lim_{n\to\infty}\sup_{0\leq t\leq T}|I_2^n(t)| = 0$. Ceci combiné avec (1.2.9) donne

$$\sup_{0\leq t\leq T}|Y_t^{h_n}-Y_t^h| \leq C_T\int_0^T |Y_s^{h_n}-Y_s^h|ds + \sup_{0\leq t\leq T}|I_2^n(t)|$$

et par inégalité de Gronwall, nous obtenons

$$\sup_{0\leq t\leq T}|Y_t^{h_n}-Y_t^h| \leq \sup_{0\leq t\leq T}|I_2^n(t)|\exp\{TC_T\} \to 0, \text{lorsque } n\to\infty.$$

Ainsi, l'application Γ^0 est continue, ce qui complète de preuve.

Avant de vérifier la condition (a), nous donnons une estimation pour le second moment de $\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}$.

***Lemme* 1.2.6.** Supposons que (**H1**) soit vérifiée. Alors, il existe un $\varepsilon_0\in(0,1)$ tel que pour une certaine constante C_T,

$$\mathbb{E}\left(\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\right) \leq C_T, \quad \varepsilon\in(0,\varepsilon_0), \quad h_\varepsilon\in\mathcal{A}_N \tag{1.2.10}$$

où $\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}$ est défini en (1.2.7).

Preuve. Remarquons que $\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}$ peut être décomposé en les trois partie suivantes :

$$\begin{aligned}\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon} &= \int_0^t \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}[b_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})]ds \\ &+ \int_0^t \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})dW_s + \int_0^t \sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})\dot{h}_\varepsilon(s)ds \\ &=: \sum_{i=1}^3 J_i^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t).\end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned}J_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t) &:= \int_0^t \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}[b_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})]ds \\ |J_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2 &= \left|\int_0^t \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}[b_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})]ds\right|^2\end{aligned}$$

d'après l'hypothése **(H1)** et l'inégalité de Hölder nous avons

$$\begin{aligned}\sup_{0\leq t\leq T}|J_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2 &\leq \frac{T}{\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T \left|b_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\right|^2 ds \\ &\leq \frac{T}{\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T K^2(s)|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0|^2ds \\ &\leq \frac{T}{\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T K^2(s)|X_s^0+\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0|^2ds \\ &\leq \frac{T}{\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T K^2(s)\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2ds \\ &\leq C_T\int_0^T |\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2ds.\end{aligned}$$

Maintenant, nous prenons l'espérance, pour tout $t \in [0,T]$ on a :

$$\mathbb{E}\Big(\sup_{0\le t\le T}|J_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2\Big) \le C_T\int_0^T \mathbb{E}|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2 ds$$

$$J_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t) := \int_0^t \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})ds$$

$$|J_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2 := \Big|\int_0^t \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})ds\Big|^2$$

pour tout $t \in [0;T]$ on a

$$\sup_{0\le t\le T}|J_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2 \le \Big|\int_0^T \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})ds\Big|^2.$$

Cette inégalité nous conduit a utiliser l'inégalité de BGD, on obtient

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\le t\le T}|J_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2\Big) &\le \frac{C}{\lambda^2(\varepsilon)}\mathbb{E}\Big(\int_0^T \Big\|\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})\Big\|^2 ds\Big)\\
&\le \frac{C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T \mathbb{E}\Big\|\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})\Big\|^2 ds
\end{aligned}$$

d'après l'hypothése (**H1**)

$$\begin{aligned}
&\le \frac{C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T K^2(s)\mathbb{E}\Big(1+|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|+W_2(\delta_{X_s^0},\delta_0)\Big)^2 ds\\
&\le \frac{C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T 3K^2(s)\mathbb{E}\Big(1+|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2+W_2^2(\delta_{X_s^0},\delta_0)\Big)ds\\
&\le \frac{C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T 3K^2(s)\mathbb{E}\Big(1+|X_s^0+\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2+|X_s^0|^2\Big)ds\\
&\le \frac{C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T 6K^2(s)\mathbb{E}\Big(1+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2+|X_s^0|^2\Big)ds\\
&\le \frac{C_T}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T \Big(1+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\mathbb{E}|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\Big)ds \text{ d'où}\\
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\le t\le T}|J_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2\Big) &\le \frac{C_T}{\lambda^2(\varepsilon)}+C_T\varepsilon\int_0^T \mathbb{E}|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2 ds
\end{aligned}$$

En appliquant l'inégalité de Hölder et en rappelant que $h_\epsilon \in \mathcal{A}_N$, nous obtenons à partir

de (3.3) et (3.4) que

$$
\begin{aligned}
J_3^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t) :&= \int_0^t \sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})\dot{h}_\varepsilon(s)ds \\
\left|J_3^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)\right|^2 &\leq \Big|\int_0^t \sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})\dot{h}_\varepsilon(s)ds\Big|^2 \\
\sup_{0\leq t\leq T}\left|J_3^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)\right|^2 &\leq \int_0^T \|\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})\|^2 ds \int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(t)|^2 ds \\
&\leq \int_0^T K(s)(1+|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|+W_2(\delta_{X_s^0},\delta_0))^2 ds \int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(t)|^2 ds \\
&\leq K^2(T)\int_0^T (1+|X_s^0+\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|+W_2(\delta_{X_s^0},\delta_0))^2 \int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(t)|^2 ds \\
&\leq K^2(T)\int_0^T (1+|X_s^0|+|\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|+W_2(\delta_{X_s^0},\delta_0))^2 \int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(t)|^2 ds
\end{aligned}
$$

or $W_2(\delta_{X_s^0},\delta_0)\leq |X_s^0|$ alors on a

$$
\begin{aligned}
&\leq 3K^2(T)\int_0^T (1+|X_s^0|^2+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2+|X_s^0|^2)ds \int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(t)|^2 ds \\
&\leq 3K^2(T)\int_0^T (1+2|X_s^0|^2+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2)ds \int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(t)|^2 ds \\
&\leq C_T(1+\sup_{0\leq t\leq T}|X_s^0|^2+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2)\int_0^T |\dot{h}_\varepsilon(t)|^2 ds \\
&\leq C_{T,N}(1+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\sup_{0\leq t\leq T}|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2)
\end{aligned}
$$

Prenant l'espérance, nous avons

$$
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}\left|J_3^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)\right|^2\Big) \leq C_{T,N}\Big(1+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\Big)\Big)
$$

Ainsi, nous arrivons à

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\Big) &\leq C_T\int_0^T \mathbb{E}|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2 ds+\frac{C_T}{\lambda^2(\varepsilon)}+C_T\varepsilon\int_0^T \mathbb{E}|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2 ds \\
&+C_{T,N}\Big(1+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\Big)\Big) \\
&\leq C_T\Big(\int_0^T \mathbb{E}|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2 ds+\frac{1}{\lambda^2(\varepsilon)}+\varepsilon\int_0^T \mathbb{E}|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2 ds+1 \\
&+\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\Big)\Big)
\end{aligned}
$$

Prenons $\varepsilon\geq 0$, suffisamment petit tel que $C_T\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\leq\frac{1}{2}$ conduit à

$$
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\Big)\leq C_T\Big(1+\frac{1}{\lambda^2(\varepsilon)}+(1+\varepsilon)\int_0^T \mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}\Big)\Big)
$$

L'assertion désirée découle de l'inégalité de Gronwall,

$$
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\Big)\leq C_T(1+\frac{1}{\lambda^2(\varepsilon)})\exp\{T(1+\varepsilon)\}
$$

Puisque $\frac{1}{\lambda^2(t)}\to 0$ lorsque $\varepsilon\to 0$, on en déduit que :

$$
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|\overline{Y}_t^{\varepsilon,h_\varepsilon}|^2\Big)\leq C_T
$$

Nous sommes maintenant en position de vérifier la condition (a) du Lemme (1.1.2).

***Lemme* 1.2.7.** Sous les hypothèses **(H1)** et **(2.5) de (H2)**, pour tout $N \in \mathbb{N}$, soient h_ϵ et h des éléments de $\mathscr{A}_N$ tels que $h_\epsilon \to h$ lorsque $\epsilon \to 0$. Alors,

$$\Gamma^\epsilon\left(\frac{1}{\lambda(\epsilon)}W + \int_0^{\cdot} \dot{h}_\epsilon(s)\,ds\right) \xrightarrow[\epsilon\to 0]{\text{loi}} \Gamma^0\left(\int_0^{\cdot} \dot{h}(s)\,ds\right) \quad \text{dans } C([0,T];\mathbb{R}^d).$$

Preuve. Le théorème de représentation de Skorokhod [3,Théorème 6.7,p 70] affirme qu'il existe un espace de probabilité $(\widetilde{\Omega}, \widetilde{\mathcal{F}}, (\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}, \widetilde{\mathbb{P}})$, un mouvement brownien W sur cette base, ainsi qu'une famille de processus $\mathcal{F}_t-$prévisible $\{\widetilde{h}_\varepsilon; \varepsilon \geq 0\}$, prenant leurs valeurs dans $\mathscr{A}_N$, $\mathbb{P}-$presque sûrement, tels que la loi jointe de (h^ε, h, W) sous $\mathbb{P}$ coïncide avec celle de $(\widetilde{h}^\varepsilon, \widetilde{h}, \widetilde{W})$ sous $\mathbb{P}$ et

$$\lim_{\lambda\to 0}\langle \widetilde{h}_\epsilon - \widetilde{h}, g\rangle = 0, \qquad \text{pour tout } g \in \mathbb{H}, \quad \mathbb{P}\text{-presque sûrement.}$$

Soient $\widetilde{Y}^{\varepsilon,\widetilde{h}_\varepsilon}$ la solution de (1.2.7) en remplaçant h_ε par $\widetilde{h}_\varepsilon$ et W par $\widetilde{W}$, et soit $\widetilde{Y}^{\widetilde{h}}$ la solution de (1.2.4) en remplaçant h par $\widetilde{h}$. Ainsi, pour conclure, il suffit de vérifié

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\|\widetilde{Y}^{\varepsilon,\widetilde{h}_\varepsilon} - \widetilde{Y}^{\widetilde{h}}\| = 0, \qquad \text{en probabilité.}$$

Dans la suite, nous omettons $\widetilde{\cdot}$ dans la notation pour plus de simplicité. Notons que $\overline{Y}^{\varepsilon,h_\varepsilon} - Y^h$ peut être décomposé en trois parties comme suit :

$$\begin{aligned}
\overline{Y}^{\varepsilon,h_\varepsilon} - Y^h &= \int_0^t \Big[b_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}, \delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\Big]ds + \int_0^t \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}, \delta_{X_s^0})dW_s \\
&+ \int_0^t \sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}, \delta_{X_s^0})\dot{h}(s)ds - \int_0^t \Big(\nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0) + \sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\dot{h}(s)\Big)ds \\
&= \left[\int_0^t \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}\Big[b_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}, \delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\Big]ds - \int_0^t \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0)ds\right] \\
&+ \int_0^t \Big[\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}, \delta_{X_s^0})\dot{h}_\varepsilon(s) - \sigma_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\dot{h}(s)\Big]ds + \frac{1}{\lambda(\varepsilon)}\int_0^t \sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}, \delta_{X_s^0})dW_s \\
&=: \sum_{i=1}^3 I_i^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t).
\end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned}
I_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t) &:= \left[\int_0^t \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}\Big[b_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}, \delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\Big]ds - \int_0^t \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0)ds\right] \\
|I_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)| &:= \left|\int_0^t \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}\Big[b_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}, \delta_{X_s^0}) - b_s(X_s^0, \delta_{X_s^0})\Big]ds - \int_0^t \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0)ds\right|
\end{aligned}$$

.

D'après l'hypothése **H2** on a

$$|I_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)| \leq \int_0^t \left|\int_0^1 \nabla_{\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0 + r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} - X_s^0))ds - \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot, \delta_{X_s^0})(X_s^0)\right|ds$$

.

On ajoute et on retranche par $\nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0+r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0))$ puis on applique l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned}
|I_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)| &\leq \int_0^t \left| \int_0^1 \nabla_{(\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h)} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0+r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0))dr \right| ds \\
&+ \int_0^t \left| \int_0^1 \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0+r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0)) - \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0)dr \right| ds \\
&\leq \int_0^t \int_0^1 \left\| \nabla_{(\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h)} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0+r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0)) \right\| drds \\
&+ \int_0^t \int_0^1 \left\| \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0+r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0)) - \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0) \right\| drds
\end{aligned}$$

d'après l'hypothése (**H1**) et (**H2**) on a

$$\begin{aligned}
&\left\| \nabla_{(\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h)} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0+r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0)) \right\| \leq K(s)|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h| \\
&\left\| \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0+r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0)) - \nabla_{Y_s^h} b_s(\cdot,\delta_{X_s^0})(X_s^0) \right\| \\
&\leq K(s)\Big(\Big| X_s^0 + r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0) - X_s^0 \Big| \Big) |Y_s^h|
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
|I_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)| &\leq \int_0^t \int_0^1 K(s)|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h| drds \\
&+ \int_0^t \int_0^1 K(s)\Big(\Big| r(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0) \Big| \Big) |Y_s^h| drds \\
&\leq \int_0^t \int_0^1 K(s)|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h| drds \\
&+ \int_0^t \int_0^1 K(s)\Big(\Big| r(X_s^0+\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-X_s^0) \Big| \Big) |Y_s^h| drds \\
&\leq \int_0^t \int_0^1 K(s)|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h| drds \\
&+ \int_0^t \int_0^1 K(s)\Big(\Big| r\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} \Big| \Big) |Y_s^h| drds.
\end{aligned}$$

On intègre par rapport a variable r et d'après (1.2.8) ,(1.2.10), nous avons un nouvel inégalité donne :

$$\begin{aligned}
\sup_{0\leq t\leq T} |I_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)| &\leq K(T)\int_0^T \Big|\overline{Y}^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h\Big| ds + K(T)\int_0^T \frac{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)}{2}\Big|\overline{Y}^{\varepsilon,h_\varepsilon}\Big|\Big|Y_s^h\Big| ds \\
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T} |I_1^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2\Big) &\leq C_T\Big(\int_0^T \mathbb{E}\Big|\overline{Y}^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h\Big|^2 ds + \varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\Big)
\end{aligned}$$

Pour l'estimation $I_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)$ on a

$$|I_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)| := \Big| \int_0^t \Big[\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})\dot{h}_\varepsilon(s) - \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\dot{h}(s)\Big] ds \Big|$$

On ajoute et on retranche par $\sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\dot{h}_\varepsilon(s)$ puis on applique l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned}
|I_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)| &\leq \Big| \int_0^t \Big(\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h\varepsilon},\delta_{X_s^0}) - \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\Big)\dot{h}_\varepsilon(s)ds \Big| + \Big| \int_0^t \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})(\dot{h}_\varepsilon(s)-\dot{h}(s))ds \Big| \\
&\leq \int_0^t \Big\|\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h\varepsilon},\delta_{X_s^0}) - \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\Big\| \Big|\dot{h}_\varepsilon(s)\Big| ds + \int_0^t \Big\|\sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\Big\| \Big|\dot{h}_\varepsilon(s)-\dot{h}(s))\Big| ds.
\end{aligned}$$

D'après l'hypothése **(H1)** et l'inégalité (3.4) nous avons une nouvelle inégalité :

$$\begin{aligned}
|I_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)| &\leq \int_0^t K(s)\Big|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} - X_s^0\Big|\Big|\dot{h}(s)\Big|ds + \int_0^t K(s)\Big(1+\Big|X_s^0\Big|\Big)\Big|\dot{h}_\varepsilon(s) - \dot{h}(s)\Big|ds \\
&\leq \int_0^t K(s)\Big|X_s^0 + \sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} - X_s^0\Big|\Big|\dot{h}(s)\Big|ds + \int_0^t K(s)\Big(1+\Big|X_s^0\Big|\Big)\Big|\dot{h}_\varepsilon(s) - \dot{h}(s)\Big|ds \\
&\leq \int_0^t K(s)\sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\Big|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}\Big|\Big|\dot{h}(s)\Big|ds + \int_0^t K(s)\Big(1+\Big|X_s^0\Big|\Big)\Big|\dot{h}_\varepsilon(s) - \dot{h}(s)\Big|ds.
\end{aligned}$$

En élevant à la puissance 2 membre à membre et en utilisant l'inégalité de Hölder et (3.4), nous avons

$$|I_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2 \leq C_T\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\int_0^t \Big|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}\Big|^2 ds \int_0^t \Big|\dot{h}(s)\Big|^2 ds + C_T\int_0^t \Big|\dot{h}_\varepsilon(s) - \dot{h}(s)\Big|^2 ds$$

Ainsi, par (3.3)

$$\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}|I_2^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)|^2\Big) \leq C_T\Big(\varepsilon\lambda^2(\varepsilon) + \int_0^T \mathbb{E}\Big|\dot{h}_\varepsilon(s) - \dot{h}(s)\Big|^2 ds\Big)$$

Pour l'estimation $I_3^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)$, d'apres l'inégalité de BDG

$$\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}\Big|I_3^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)\Big|^2\Big) \leq \frac{C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T \mathbb{E}\Big\|\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0})\Big\|^2 ds$$

On ajoute et on retranche le terme $\sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})$ à l'intérieur de l'espérance, puis on applique l'inégalité $|a+b|^2 \leq 2\Big(|a|^2+|b|^2\Big)$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}\Big|I_3^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)\Big|^2\Big) &\leq \frac{2C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T \mathbb{E}\Big(\Big\|\sigma_s(Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon},\delta_{X_s^0}) - \sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\Big\|^2 + \Big\|\sigma_s(X_s^0,\delta_{X_s^0})\Big\|^2\Big)ds \\
&\leq \frac{2C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T \mathbb{E}\Big(K^2(s)\Big|Y_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} - X_s^0\Big|^2 + K^2(s)(1+|X_s^0|)^2\Big)ds \\
&\leq \frac{2C}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T \mathbb{E}\Big(K^2(s)\Big|X_s^0 + \sqrt{\varepsilon}\lambda(\varepsilon)\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} - X_s^0\Big|^2 + K^2(s)(1+|X_s^0|)^2\Big)ds \\
&\leq \frac{2CK^2(T)}{\lambda^2(\varepsilon)}\int_0^T \mathbb{E}\Big(\varepsilon\lambda^2(\varepsilon)\Big|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}\Big|^2 + (1+|X_s^0|)^2\Big)ds
\end{aligned}$$

D'après (3.3) on obtient :

$$\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}\Big|I_3^{\varepsilon,h_\varepsilon}(t)\Big|^2\Big) \leq C_T\Big(\frac{1}{\lambda^2(\varepsilon)} + \varepsilon\int_0^T \mathbb{E}\Big|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}\Big|^2 ds\Big)$$

En prenant en compte les estimations ci-dessus, il s'ensuit que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}\Big|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} - Y_s^h\Big|^2\Big) \leq C_T\Big(&\int_0^T \mathbb{E}\Big|\overline{Y}^{\varepsilon,h_\varepsilon} - Y_s^h\Big|^2 ds + \varepsilon\lambda^2(\varepsilon) + \varepsilon\lambda^2(\varepsilon) \\
&+ \int_0^T \mathbb{E}\Big|\dot{h}_\varepsilon(s) - \dot{h}(s)\Big|^2 + \frac{1}{\lambda^2(\varepsilon)} + \varepsilon\int_0^T \mathbb{E}\Big|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}\Big|^2 ds\Big).
\end{aligned}$$

Puisque $h_\varepsilon \in \mathscr{A}_N$, d'après le lemme (1.2.6), on obtient :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big(\sup_{0\leq t\leq T}\Big|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} - Y_s^h\Big|^2\Big) \leq C_T\Big(&\frac{1}{\lambda^2(\varepsilon)} + \varepsilon(\lambda^2(\varepsilon)+1) + \int_0^T \mathbb{E}\Big|\dot{h}_\varepsilon(s) - \dot{h}(s)\Big|^2 ds \\
&+ \int_0^T \mathbb{E}\Big|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon} - Y_s^h\Big|^2 ds\Big).
\end{aligned}$$

On peut utiliser l'inégalité de Gronwall, on obtient

$$\mathbb{E}\Big(\sup_{0\le t\le T}\left|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h\right|^2\Big)\le C_T\Big(\frac{1}{\lambda^2(\varepsilon)}+\varepsilon(\lambda^2(\varepsilon)+1)+\int_0^T\mathbb{E}\left|\overline{h}_s(s)-\overline{h}(s)\right|^2ds\Big)e^{TC_T}.$$

En faisant tendre $\varepsilon\to 0$ et en utilisant (1.2.2), nous obtenons

$$\mathbb{E}\Big(\sup_{0\le t\le T}\left|\overline{Y}_s^{\varepsilon,h_\varepsilon}-Y_s^h\right|\Big)\to 0$$

ce qui achève la preuve.

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le Lemme 1.2.3 .

Preuve de lemme 1.2.3

Sous les hypothèses du théorème 1.2.1, nous allons vérifier que la famille de l'application mesurable $(\Gamma^\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ satisfait les condition du lemme 1.1.2.

Soit $N<\infty$ et soit $(h_\varepsilon)_{\varepsilon>0}\in\mathscr{A}_N$ telle que $h_\varepsilon\to h$ lorsque $\varepsilon\to 0$. D'après le lemme 1.2.7 on a

$$\Gamma^\epsilon\left(\frac{1}{\lambda(\epsilon)}W+\int_0^\cdot\dot{h}_\epsilon(s)\,ds\right)\xrightarrow[\epsilon\to 0]{\text{loi}}\Gamma^0\left(\int_0^\cdot\dot{h}(s)\,ds\right)\quad\text{dans } C([0,T];\mathbb{R}^d).$$

Cette convergence correspond exactement à la condition (a) du lemme 1.1.2. Ainsi, la premier hypothèse du lemme 1.1.2 est satisfaite .

Pour $N<\infty$, considérons l'ensemble

$$K_N:=\left\{\Gamma^0\left(\int_0^\cdot\dot{h}(s)ds\right);h\in S_N\right\}.$$

La lemme 1.2.5 affirme que cet ensemble est compact dans $C([0,T],\mathbb{R}^d)$ c'est précisément la condition (b) du lemme 1.1.2.

Ainsi, les conditions (a) et (b) du lemme 1.1.2 étant satisfaits on peut applique ce résultats abstrait. On en déduit que la famille $(\Gamma\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ et donc $(\overline{Y}\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ satisfait un principe de grandes déviations dans $C([0,T],\mathbb{R}^d)$, muni de la topologie de la norme uniforme avec la bonne fonction de taux donnée par

$$I(g)=\inf_{\{h\in\mathbb{H};g=\Gamma^0(\int_0^\cdot h(s)ds)\}}\frac{1}{2}\int_0^T|\dot{h}(s)|ds$$

avec la convention $\inf\emptyset=\infty$.

1.2.3 Équivalence exponentielle entre $\overline{X}^\varepsilon$ et $\overline{Y}^\varepsilon$

Afin de montrer que $\overline{X}^\varepsilon$ et $\overline{Y}^\varepsilon$ sont exponentiellement équivalents, nous commençons par établir le lemme suivant.

***Lemme* 1.2.8.** Pour tout $\delta>0$, on a

$$\limsup_{\epsilon\to 0}\epsilon\log\left(\mathbb{P}\left(\sup_{0\le t\le T}|\overline{X}_t^\epsilon-\overline{Y}_t^\epsilon|\ge\delta\right)\right)=-\infty. \tag{1.2.11}$$

La démonstration du Lemme 4.6 s'appuie sur le lemme suivant, qui correspond au Lemme 5.6.18 de [8].

***Lemme* 1.2.9.** Soient b_t, σ_t des processus progressivement mesurables, $(w_t)_{t\geq 0}$ un mouvement brownien d-dimensionnel, et

$$\mathrm{d}z_t = b_t \mathrm{d}t + \sqrt{\varepsilon}\sigma_t \mathrm{d}w_t, \quad t \geq 0,$$

où z_0 est déterministe. Soit $\tau_1 \in [0,1]$ un temps d'arrêt par rapport à la filtration de $\{w_t,\, t \in [0,1]\}$. Supposons que les coefficients de la matrice de diffusion σ sont uniformément bornés, et que pour certaines constantes M, B, ρ et pour tout $t \in [0, \tau_1]$,

$$|\sigma_t| \leq M(\rho^2 + |\omega|^2)^{1/2}, \quad |b_t| \leq B(\rho^2 + |z_t|^2)^{1/2}.$$

Alors pour tout $\delta > 0$ et tout $\epsilon \leq 1$,

$$\epsilon \log \mathbb{P}\left(\sup_{t\in[0,\tau_1]} |z_t| \geq \delta\right) \leq K + \log\left(\frac{\rho^2 + |z_0|^2}{\rho^2 + \delta^2}\right),$$

où $K = 2B + M^2(2+d)$.

Preuve de lemme 1.2.8

Sans perte de généralité, on peut choisir $R > 0$ tel que la donnée initiale x soit dans la boule $B_{R+1}(0)$ (de centre 0 et de rayon $R+1$). On suppose également que X_t^0 ne quitte pas cette boule avant le temps T. On définit le temps d'arrêt

$$\tau_R' = \inf\left\{t : t \geq 0 \mid |\overline{X}_t^\epsilon| \vee |\overline{Y}_t^\epsilon| \geq R+1\right\},$$

puis on note $\tau_R = \min\{T, \tau_R'\}$. Dans la suite, on considère $\overline{z}_t := \overline{X}_t^\epsilon - \overline{Y}_t^\epsilon$, le nouveau processus satisfait l'équation suivante

$$\mathrm{d}\overline{z}_t = \int_0^t b_s \,\mathrm{d}s + \sqrt{\varepsilon}\int_0^t \sigma_t \,\mathrm{d}W_t, \quad \overline{z}_t = 0, \tag{1.2.12}$$

où

$$b_t := \frac{b_t\left(X_t^\epsilon, \mathscr{L}_{X_t^\epsilon}\right) - b_t\left(\tilde{Y}_t^\epsilon, \delta_{X_t^0}\right)}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\epsilon)}, \quad \sigma_t := \frac{\sigma_t\left(X_t^\epsilon, \mathscr{L}_{X_t^\epsilon}\right) - \sigma_t\left(\tilde{Y}_t^\epsilon, \delta_{\tilde{X}_t^\epsilon}\right)}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\epsilon)}.$$

Notons que b_t et σ_t sont des processus progressivement mesurables. Si $t \leq \tau_R$, alors d'après (2.6), on obtient

$$\begin{aligned}
|b_t| &= \frac{\left|b_t\left(X_t^\epsilon, \mathscr{L}_{X_t^\epsilon}\right) - b_t\left(X_t^\epsilon, \delta_{X_t^0}\right) + b_t\left(X_t^\epsilon, \delta_{X_t^0}\right) - b_t\left(\tilde{Y}_t^\epsilon, \delta_X\right)\right|}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\epsilon)} \\
&\leq \frac{K(t) W_t\left(\mathscr{L}_{X_t^\epsilon}^\epsilon, \delta_{X_t^0}\right)}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\epsilon)} + \frac{K(t)|X_t^\epsilon - \tilde{Y}_t^\epsilon|}{\sqrt{\varepsilon}\lambda(\epsilon)} \\
&\leq K(t)\left(\rho^2(\epsilon) + |\overline{z}_t|^2\right)^{1/2}.
\end{aligned}$$

où $\rho^2(\varepsilon) = \sup_{0\leq t\leq T} \mathbb{E}|\overline{X}_t|^2$. De même, nous avons

$$|\sigma_t| \leq K(t)\left(\rho^2(\varepsilon) + |\overline{z}_t|^2\right)^{1/2}.$$

Notons que $\overline{z}_0 = 0$. Pour tout $\delta > 0$, ρ^ε, et tout ϵ suffisamment petit, nous déduisons du Lemme 1.2.9 que

$$\epsilon \log \mathbb{P}\left(\sup_{t\in[0,\tau_d]} |\overline{z}_t| \geq \delta\right) \leq KT + \log\left(\frac{\rho^2(\epsilon)}{\rho^2(\epsilon)+\delta^2}\right).$$

De manière analogue à la preuve de (3.7), on peut montrer que $\rho^2(\epsilon)$ converge vers 0 lorsque $\epsilon \to 0$. Par conséquent, nous obtenons

$$\limsup_{\epsilon\to 0} \epsilon \log \mathbb{P}\left(\sup_{t\in[0,\tau_R]} |\overline{z}_t| \geq \delta\right) = -\infty. \tag{1.2.13}$$

Maintenant, puisque

$$\left\{\|\overline{X}^\epsilon - \overline{Y}^\epsilon\|_\infty \geq \delta\right\} \subset \{\tau_R \leq T\} \cup \left\{\sup_{0\leq t\leq \tau_R} |\overline{X}^\epsilon_t - \overline{Y}^\epsilon_t| \geq \delta\right\},$$

nous pouvons conclure à condition de démontrer que

$$\lim_{R\to\infty} \limsup_{\epsilon\to 0} \epsilon \log\left(\mathbb{P}(\tau_R < T)\right) = -\infty.$$

Définissons $\eta_R := \inf\{t : t \geq 0 : |\overline{Y}^\epsilon_t| \geq R\}$, c'est-à-dire le premier temps où $\overline{Y}^\epsilon$ sort de la boule $B_R(0)$ (de centre 0 et de rayon R).

Soit $\tau_R < T$, alors nous avons $\{|\overline{X}^\epsilon_{\tau_R}| \vee |\overline{Y}^\epsilon_{\tau_R}| = R+1\}$.

Si $|\overline{Y}^\epsilon_{\tau_R}| = R+1$, alors nous avons immédiatement $\eta_R < T$. Ceci implique que

$$\mathbb{P}(\tau_R < T) \leq \mathbb{P}(\eta_R < T).$$

Si $|\overline{X}^\epsilon_{\tau_R}| = R+1$, on peut déduire que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\tau_R < T) &\leq \mathbb{P}\left(|\overline{X}^\epsilon_{\tau_R}| = R+1\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\left\{\sup_{t\in[0,\tau_R]} |\overline{z}_t| \geq \frac{1}{2},\ |\overline{X}^\epsilon_{\tau_R}| = R+1\right\}\right) \\
&\quad + \mathbb{P}\left(\left\{\sup_{t\in[0,\tau_d]} |\overline{z}_t| < \frac{1}{2},\ |\overline{X}^\epsilon_{r_R}| = R+1\right\}\right) \\
&\leq \mathbb{P}\left(\sup_{t\in[0,\tau_d]} |\overline{z}_t| \geq \frac{1}{2}\right) + \mathbb{P}(\eta_R < T).
\end{aligned}$$

D'après (1.2.13), pour terminer la preuve, il suffit de montrer que la probabilité que $\overline{Y}^\epsilon$ sorte de la boule $B_R(0)$ est très petite lorsque $\epsilon \to 0$, c'est-à-dire

$$\lim_{R\to\infty} \limsup_{\epsilon\to 0} \epsilon \log\left(\mathbb{P}(\eta_R < T)\right) = -\infty.$$

Rappelons que $\overline{Y}^\epsilon$ satisfait un principe de grandes déviations (LDP) pour la norme uniforme avec une bonne fonction de taux $I(g)$, donnée en (1.2.3). Alors, pour tout ensemble fermé $F \subset C([0,T];\mathbb{R}^d)$, nous avons

$$\limsup_{\epsilon\to 0} \epsilon \log \mathbb{P}\{\overline{Y}^\epsilon \in F\} \leq -\inf_{g\in F} I(g).$$

Par conséquent,

$$\limsup_{\epsilon\to 0} \epsilon \log\left(\mathbb{P}(\eta_R < T)\right) = \limsup_{\epsilon\to 0} \epsilon \log\left(\mathbb{P}\left[\sup_{0\le t\le T} |\overline{Y}^{\epsilon}_t| \ge R\right]\right)$$

$$\le - \inf_{\{h\in\mathbb{H}, g=\Gamma^0(\int_0^\cdot \dot{h}(s)\mathrm{d}s), \|g\|_\infty \ge R\}} \frac{1}{2}\int_0^T |\dot{h}(s)|^2 \,\mathrm{d}s.$$

Nous remarquons que l'infimum de $I(g)$ sur l'ensemble des chemins sortant de la boule $B_R(0)$ tend vers l'infini lorsque $R \to \infty$.

D'après (H1) et (3.3), nous obtenons que

$$\begin{aligned}
|g(t)| &\le \int_0^t \left|\nabla_{g(s)} b_s(\cdot, \delta_{X^0_s})(X^0_s) + \sigma_s(X^0_s, \delta_{X^0_s})\dot{h}(s)\right| \,\mathrm{d}s \\
&\le \int_0^t K(s)\left(|g(s)| + (1+|X^0_s|)|\dot{h}(s)|\right) \,\mathrm{d}s \\
&\le C_t\left(\int_0^t |g(s)| \,\mathrm{d}s + \left(\int_0^t |\dot{h}(s)|^2 \,\mathrm{d}s\right)^{1/2}\right),
\end{aligned}$$

et, par l'inégalité de Gronwall, nous avons

$$|g(t)| \le C_t\left(\int_0^t |\dot{h}(s)|^2 \,\mathrm{d}s\right)^{1/2} < \infty.$$

En faisant tendre $R \to \infty$, on obtient que

$$\left\{h \in \mathbb{H}\,;\, g = \Gamma^0(\int_0^\cdot, \dot{h}(s)\,\mathrm{d}s),\ \|g\|_\infty \ge R\right\} = \emptyset,$$

ce qui implique que $\inf I(g) = -\infty$. Autrement dit, $\overline{X}^{\epsilon}$ et $\overline{Y}^{\epsilon}$ sont exponentiellement équivalents.

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le Théorème 1.2.1.

Preuve de théorème 1.2.1

Sous les hypothèses (**H1**) et (**H2**), nous allons montrer que la famille $(X^{\varepsilon}_s)_{\varepsilon>0}$ satisfait un principe de grandes déviations dans $C([0,T],\mathbb{R}^d)$ muni de la norme uniforme

D'après le lemme 1.2.3, la famille $(\overline{Y}\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ satisfait un principe de grandes déviations dans $C([0,T],\mathbb{R}^d)$ avec la bonne fonction de taux I définie par

$$I(g) := \inf_{\{h\in\mathbb{H}; g=\Gamma^0(\int_0^\cdot h(s)ds)\}} \left\{\frac{1}{2}\int_0^T |\dot{h}(s)|^2 ds\right\}, \quad g \in C([0,T];\mathbb{R}^d).$$

D'après le lemme 1.2.8, pour tout $\delta > 0$

$$\limsup_{\varepsilon\to 0} \varepsilon \log\left(\mathbb{P}(\sup\left|\overline{X}^{\varepsilon}_t - \overline{Y}^{\varepsilon}_t\right| \ge \delta)\right) = -\infty$$

Cela signifie que les deux famille $(\overline{X}^{\varepsilon})$ et $(\overline{Y}^{\varepsilon})$ sont exponentiellement équivalentes dans $C([0,T],\mathbb{R}^d)$. On déduit que $(\overline{X}^{\varepsilon})_{\varepsilon>0}$ satisfait un principe de grandes déviations dans $C([0,T],\mathbb{R}^d)$ avec la même fonction de taux I. Par définition de Γ^0, le chemin limite

$$Y^h := \Gamma^0\Big(\int_0^\cdot \dot{h}(s)ds\Big)$$

est l'unique solution de l'équation déterministe

$$dY_t^h = \Big\{\nabla_{Y_t^h} b_t(\cdot, \delta_{X_t^0})(X_t^0) + \sigma_s(X_t^0, \delta_{X_t^0})\dot{h}(t)\Big\}dt$$

La fonction de taux est donc bien donnée par

$$I(g) := \inf_{\{h\in\mathbb{H}; g=\Gamma^0(\int_0^\cdot h(s)ds)\}} \left\{\frac{1}{2}\int_0^T |\dot{h}(s)|^2 ds\right\}, \quad g \in C([0,T];\mathbb{R}^d).$$

la convention $I(g) = \infty$ si l'ensemble est vide. Alors la famille (X_t^0) satisfait un principe de grandes déviation sur $C([0,T],\mathbb{R}^d)$ muni de la topologie uniforme, avec la bonne fonction de taux I.