

TABLE 2.—ECOLOGICAL AND ALTITUDINAL DISTRIBUTION OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN MICHOACÁN.—Continued

SPECIES	Arid tropical scrub forest	Tropical semi-deciduous forest	Mesquite-grassland	Pine-oak forest	Fir forest	Altitudinal range in meters
<i>Rana pustulosa</i>	—	M	—	M	—	850–2150
<i>Kinosternon hirtipes hirtipes</i>	—	—	M	—	—	1525–2160
<i>Kinosternon integrum</i>	A	M	A	M	—	0–2200
<i>Geomyda pulcherrima pulcherrima</i>	?	—	—	—	—	?
<i>Geomyda rubida perixantha</i>	R	—	—	—	—	0–635
<i>Pseudemys scripta ornata</i>	?	—	—	—	—	?
<i>Crocodylus acutus acutus</i>	M	—	—	—	—	0–10
<i>Bipes canaliculatus</i>	?	—	—	—	—	?
<i>Coleonyx elegans nemoralis</i>	?	?	—	—	—	?
<i>Phyllodactylus duellmani</i>	M	—	—	—	—	180–500
<i>Phyllodactylus homolepidurus</i>	—	M	—	—	—	0–500
<i>Phyllodactylus lanei</i>	—	A	—	M	—	0–1100
<i>Phyllodactylus paucituberculatus</i>	R	—	—	—	—	270
<i>Anolis dunni</i>	—	—	—	R	—	700–850
<i>Anolis nebulosus</i>	A	A	R	M	—	0–2100
<i>Anolis schmidtii</i>	—	R	—	—	—	0–10
<i>Basiliscus vittatus</i>	M	A	—	—	—	0–350
<i>Iguana iguana rhinolopha</i>	M	M	—	—	—	0–800
<i>Ctenosaura pectinata</i>	A	M	—	—	—	0–1000
<i>Enyaliosaurus clarki</i>	A	—	—	—	—	200–510
<i>Phrynosoma asio</i>	R	—	—	—	—	300–700
<i>Sceloporus aeneus aeneus</i>	—	—	—	A	A	1850–3100
<i>Sceloporus asper</i>	—	R	—	M	—	335–1630
<i>Sceloporus bulleri</i>	—	—	—	A	—	2000–2350
<i>Sceloporus dugesi intermedius</i>	—	—	A	M	—	1500–2200
<i>Sceloporus gadowae</i>	M	—	—	—	—	250–1050
<i>Sceloporus grammicus microlepidotus</i>	—	—	—	A	M	1550–3100
<i>Sceloporus heterolepis</i>	—	—	—	M	R	1800–2700
<i>Sceloporus horridus oligoporus</i>	A	—	—	—	—	0–1600
<i>Sceloporus melanorhinus calligaster</i>	—	A	—	—	—	30–1500
<i>Sceloporus pyrocephalus</i>	A	—	—	—	—	0–1000
<i>Sceloporus scalaris scalaris</i>	—	—	M	M	—	1550–2300
<i>Sceloporus siniferus siniferus</i>	M	—	—	—	—	0–150
<i>Sceloporus spinosus spinosus</i>	—	—	M	—	—	1500–2300
<i>Sceloporus torquatus torquatus</i>	—	—	M	A	M	1450–3000
<i>Sceloporus utiformis</i>	—	M	—	M	—	0–1550
<i>Urosaurus bicarinatus tuberculatus</i>	—	M	—	M	—	0–1700
<i>Urosaurus gadowi</i>	A	—	—	—	—	180–1200
<i>Mabuya brachypoda</i>	M	M	—	—	—	0–1050
<i>Scincella assata taylora</i>	—	R	—	—	—	120–850
<i>Eumeces altamirani</i>	R	—	—	—	—	350–1050
<i>Eumeces colimensis</i>	—	R	—	—	—	130–950
<i>Eumeces copei</i>	—	—	—	R	R	1800–2700
<i>Eumeces dugesi</i>	—	—	—	A	M	1550–1850
<i>Eumeces indubitus</i>	—	—	—	R	—	2750
<i>Eumeces parvulus</i>	—	M	—	—	—	30–500
<i>Ameiva undulata sinistra</i>	—	A	—	—	—	10–950
<i>Cnemidophorus calidipes</i>	A	—	—	—	—	200–650
<i>Cnemidophorus communis communis</i>	A	—	—	—	—	10–950
<i>Cnemidophorus costatus occidentalis</i>	—	—	R	—	—	1570