

分型	分子学特征	生物学行为	特征性诊断	治疗和预后
VETC 癌巢型 HCC	Ang-2 ↑ COX-2 ↑ Integrin B1 ↑ Integrin α5 ↑ CXCR4 ↑ Slug/ Snail/Twist ↓	癌细胞不发生 EMT, 内皮细胞包绕肿瘤细胞 形成VETC 癌巢, 癌 巢与血管融合后 整体 进入血管	超声造影/CT/MRI特征性表 现(有) 病理HE染色特征性 表现(有) AST > 40 U/L(阳 性预测) AFP > 100 ng/ ml(阳性预测) HBV感染(阳 性预测)	首选手术治疗 索拉菲 尼敏感 术后易复发 缩 短复查间隔 dTACE/ CTACE(未见对比研究)
VETC 非癌巢 型 HCC	Ang-2 ↓ COX-2 ↓ Integrin B1 ↓ Integrin α5 ↓ CXCR4 ↓ Slug/ Snail/Twist ↑	肝癌细胞发生EMT, 癌 细胞侵蚀进入血 管,发 生肝内及肝外 转移	超声造影/CT/MRI特征性表 现(无) 病理HE染色特征性 表现(无) 无血清学特征性 指标	首选手术治疗 索拉菲 尼不敏感 术后不易复 发 常规复查 dTACE/ TACE(未见对比研究)