

分型	分子学特征	生物学行为	特征性诊断	治疗和预后
VETC 癌巢型 HCC	Ang-2 ↑ COX-2 ↑ Integrin B1 ↑ Integrin a5 ↑ CXCR4 ↑ Slug/Snail/Twist ↓	癌细胞不发生 EMT, 内皮细胞包绕肿瘤细胞形成VETC 癌巢,癌 巢与血管融合后整体 进入血管	超声造影/CT/MRI特征性表现(有) 病理 HE染色特征性表现(有) AST > 40 U/L(阳性预测) AFP > 100 ng/ml(阳性预测) HBV感染(阳性预测)	首选手术治疗 索拉菲尼敏感 术后易复发 缩短复查间隔 dTACE/CTACE(未见对比研究)
VETC 非癌巢型 HCC	Ang-2 ↓ COX-2 ↓ Integrin B1 ↓ Integrin a5 ↓ CXCR4 ↓ Slug/Snail/Twist ↑	肝癌细胞发生EMT,癌 细胞侵蚀进入血管,发 生肝内及肝外转移	超声造影/CT/MRI特征性表现(无) 病理 HE染色特征性表现(无) 无血清学特征性指标	首选手术治疗 索拉菲尼不敏感 术后不易复发 常规复查 dTACE/TACE(未见对比研究)