

ANSWER FOR 1B 2016

NAOKI YANO

(1)

$$\begin{aligned}\frac{x^3 - 3}{x^3 - x^2 - x + 1} &= \frac{x^3 - x^2 - x + 1 + (x^2 + x - 4)}{x^3 - x^2 - x + 1} \\ &= 1 + \frac{x^2 + x - 4}{x^3 - x^2 - x + 1}\end{aligned}$$

ここで

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)^2(x + 1)$$

だから

$$\frac{x^2 + x - 4}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{A}{(x - 1)^2} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 1}$$

とおけて、

$$x^2 + x - 4 = A(x + 1) + B(x + 1)(x - 1) + C(x - 1)^2$$

$$x^2 + x - 4 = (B + C)x^2 + (A - 2B)x + A - B + C$$

係数を比較して、

$$\begin{cases} B + C = 1 \\ A - 2B = 1 \\ A - B - C = -4 \end{cases}$$

これを拡大係数行列にして連立方程式を解くと、

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore C = 3, B = -2, A = -3$$

$$\begin{aligned}I &= \int 1 dx + \int \left(\frac{-3}{(x - 1)^2} + \frac{-2}{x - 1} + \frac{1}{x + 1} \right) dx \\ &= x + \frac{3}{x - 1} + \log \left| \frac{x + 1}{(x - 1)^2} \right| + \text{const.}\end{aligned}$$

(2)

$$\mathcal{D} := \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y^3 \leq x \leq 2 - y^2\}$$

これをグラフに書くと

$$\mathcal{D}' = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, \begin{cases} 0 \leq y \leq \sqrt[3]{x} & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 \leq y \leq \sqrt{2 - x} & (1 \leq x \leq 2) \end{cases} \right\}$$

従って定積分は

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt[3]{x}} \frac{y^2}{x\sqrt{2-x}} dy \right) dx + \int_1^2 \left(\int_0^{\sqrt{2-x}} \frac{y^2}{x\sqrt{2-x}} dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{3\sqrt{2-x}} dx + \int_1^2 \frac{2-x}{3x} dx = \left[-\frac{2}{3}\sqrt{2-x} \right]_0^1 + \left[\frac{2}{3}\log x \right]_1^2 - \left[\frac{1}{3}x \right]_1^2\end{aligned}$$

$$(3) \quad = \frac{2}{3}(\sqrt{2} + \log 2) - 1$$