
線型写像としての行列

K上の線型空間V^nの基底$\{a_1,\cdots,a_n\}$, K上の線型空間W^mの基底$\{b_1,\cdots,b_m\}$を取る$(m,n<\infty)$. 線型空間V^nからW^mへの線型写像$f:V^n\to W^m$の全体の集合を$\mathcal{L}_K(V^n,W^m)$とおくとき,



④ $f:(a_1\cdots a_n)\longmapsto(f(a_1)\cdots f(a_n))=(b_1\cdots b_m)A$

を満たす様に定めることにより, 次の定理を得る:

定理9

$\mathcal{L}_K(V^n,W^m)\simeq M_{mn}$である. すなわち, 線型写像$f_A$は, 行列$A_f$に置き換えることができる.

◎ ④で定められる線型写像fを, 行列Aによって定義される線型写像f_Aといい, 行列Aを, 線型空間V^nの基底$\{a_1,\cdots,a_n\}$と線型空間W^mの基底$\{b_1,\cdots,b_m\}$に関する, 線型写像fの表現行列(行列表示)A_fという.

線型代数学とは, 線型空間V^n上の線型写像f_Aについての学問である. 定理8, 定理9より,

線型代数学とは, n次元数ベクトル空間K^n上のmxn型行列A_fについての学問であるといえる.

線型写像$f:V^n\to W^m$の像$\mathrm{Im}f$の次元$\dim(\mathrm{Im}f)$を, 線型写像fの階数といい, $\mathrm{rank}f$と表す. また, 核$\mathrm{Ker}f$の次元$\dim(\mathrm{Ker}f)$を, 線型写像fの退化次数という. 線型写像fの表現行列を$A_f=(A_1\cdots A_n)$ $(A_i\in K^m, 1\le i\le n)$とおくと, 線型空間$V^n$, W^mの標準基底に対して, $A_i=A_f(e_i)=f(e_i)$ $(1\le i\le n)$であるので,

$$A_f:K^n\longrightarrow K^m$$
$$x=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}\longmapsto y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_m\end{pmatrix}=A_fx=(A_1\cdots A_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

$\mathrm{Im}f=\langle A_1,\cdots,A_n\rangle$

である. したがって, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f$となる. このとき, 以下の性質が成り立っている:

線型写像の階数

$\mathrm{rank}f:=\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f$ である. 特に,

(i) fは全射 $\iff W^m=\langle A_1,\cdots,A_n\rangle$, $\mathrm{rank}A_f=m$ $(\le n)$

(ii) fは単射 $\iff A_1,\cdots,A_n$は線型独立, $\mathrm{rank}A_f=n$ $(\le m)$
$\iff$ 斉次連立一次方程式 $A_fx=0_m$ の解は, $x=0_n$ のみ

(iii) fは全単射 $\iff \mathrm{rank}A_f=m=n$
$\iff \det A_f\neq 0$

次元定理

K上の線型空間V $(\dim V<\infty)$からWへの線型写像$f:V\to W$について,

$$\dim V=\dim(\mathrm{Im}f)+\dim(\mathrm{Ker}f)$$

◎ 線型写像$f:V^n\to W^m$ $(\dim V=n<\infty, \dim W=m<\infty)$の表現行列$A_f$について, $\mathrm{rank}A_f=k$のとき, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V-\dim(\mathrm{Im}f)=n-k$. すなわち, 斉次連立一次方程式$A_fx=0_m$の一般解$\mathrm{Ker}f=\{x\in K^n\mid A_fx=0_m\}$は, K^nの$(n-k)$次元部分空間であり, $(n-k)$この基本解を持つ$(n-k)$この$\square$のパラメータを持つ.

(例) $V=\mathbb{R}^3$, $W=\mathbb{R}^3$, $f:\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}X\\ Y\\ Z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y-z\\ 4x+y-2z\\ 2x-y\end{pmatrix}$

線型写像fの表現行列$A_f=\begin{pmatrix}1&1&-1\\ 4&1&-2\\ 2&-1&0\end{pmatrix}$より, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f=\mathrm{rank}\begin{pmatrix}1&1&-1\\ 0&-3&2\\ 0&0&0\end{pmatrix}=2$.

実際, $\begin{cases}x+y-z=X\\ 4x+y-2z=Y\\ 2x-y=Z\end{cases}$

$\begin{pmatrix}1&1&-1&1&0&0\\ 4&1&-2&0&1&0\\ 2&-1&0&0&0&1\end{pmatrix}\overset{x(-4)\ x(-2)}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1&1&-1&1&0&0\\ 0&-3&2&-4&1&0\\ 0&-3&2&-2&0&1\end{pmatrix}\overset{x(-\frac{1}{3})\ x(-1)}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0&0\\ 0&1&-\frac{2}{3}&\frac{4}{3}&-\frac{1}{3}&0\\ 0&0&0&2&-1&1\end{pmatrix}\overset{x3}{\to}\begin{pmatrix}3&0&-1&-1&1&0\\ 0&-3&2&-4&1&0\\ 0&0&0&2&-1&1\end{pmatrix}$

$\begin{cases}3X-Z=-X+Y\\ -3Y+2Z=-4X+Y\\ 0=2X-Y+Z\end{cases}$

であるから, $\mathrm{Im}f=\left\{\begin{pmatrix}X\\ Y\\ Z\end{pmatrix}\middle|\ 2X-Y+Z=0\right\}$ (2次元平面).

また, 次元定理より, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V-\mathrm{rank}A_f=3-2=1$. 実際,

$\begin{cases}x+y-z=0\\ 4x+y-2z=0\\ 2x-y=0\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}3x-z=0\\ -3y+2z=0\\ 0=0\end{cases}$ より, $\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}$ $(t\in\mathbb{R})$ であるから,

$\mathrm{Ker}f=\left\{\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}\middle|\ \frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}\right\}$ (1次元直線).

$\dim V=3$ $\neq$ $\mathrm{rank}A_f=2$ $\neq 3=\dim W$ であるから, 線型写像fは全射でも単射でも全単射でない.

(別解) $\mathrm{rank}A_f=2$より, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f=2$, $\mathrm{Im}f=\left\langle\begin{pmatrix}1\\ 4\\ 2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -1\end{pmatrix}\right\rangle=\left\langle\begin{pmatrix}4\\ 2\\ 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 3\end{pmatrix}\right\rangle$.

次元定理より, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V-\mathrm{rank}A_f=1$, $\mathrm{Ker}f=\left\langle\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}\right\rangle$.