

TEORIJA GRAFOV

Osnovni pojmi

- graf** G je urejen par $(V(G), E(G))$ množice **vozlišč** (vertex) in **povezav** (edge) med njimi.
- krajišči povezave** sta *vozlišči* $\{u, v\} \in E(G)$ (krajši zapis $uv = \{u, v\}$)
- soseščina vozlišča** v v je $N_G(v) = \{u \in V(G) : uv \in E(G)\}$
- u **sosed** v , če velja $uv \in E(G)$. (u in v sta **sosednji** vozlišči, pišemo $u \sim v$)
- stopnja vozlišča** v je $\deg_G(v) = |N_G(v)|$
- maksimalna stopnja vozlišč** $\Delta(G)$
- r -**regularen graf** je tak graf, da imajo vsa vozlišča stopnjo r .
- izolirano vozlišče** je vozlišče stopnje 0.
- matrika sosednosti** grafa G z $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ je matrika $A(G) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ za katero velja:

$$A(G)_{i,j} = \begin{cases} 1; & v_i v_j \in E(G) \\ 0; & \text{sicer} \end{cases}$$

- incidenčna matrika** grafa G z $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ in $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}$ je matrika $B(G) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ za katero velja:

$$B(G)_{i,j} = \begin{cases} 1; & v_i \in e_j \\ 0; & \text{sicer} \end{cases}$$

Lema o rokovanju

Za vsak graf G velja:

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|$$

Posledica: Število vozlišč lihe stopnje v grafu je sodo.

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = \underbrace{\sum_{v \in V_{\text{sodo}}(G)} \deg(v)}_{\text{očitno sodo}} + \underbrace{\sum_{v \in V_{\text{lihe}}(G)} \deg(v)}_{\text{mora biti sodo}} = \underbrace{2|E(G)|}_{\text{očitno sodo}}$$

Podgrafi

- Graf H **podgraf** grafa G , če je $V(H) \subseteq E(G)$ in $V(H) \subseteq E(G)$. Pišemo $H \subseteq G$.
- Graf H **vpeti podgraf** grafa G , če se razlikuje samo v množici povezav: $V(H) = V(G)$ in $E(H) \subseteq E(G)$.
- inducirani** ali **porojeni** podgraf H grafa G dobimo tako da iz G odstranimo le nekatera vozlišča (in dotične povezave).

Družine grafov

$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}$$
$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

- polni grafi** $K_n : V(K_n) = [n] \quad E(K_n) = \{ij \mid i \neq j; i, j \in [n]\}$ (vsa vozlišča so sosednja).
- pot** $P_n : V(P_n) = \mathbb{Z}_n \quad E(P_n) = \{i(i+1) \mid i \in \{0, \dots, n-1\}\}$
- cikel** $C_n : V(C_n) = \mathbb{Z}_n \quad E(C_n) = \{i(i+1) \mid i \in \mathbb{Z}_n\}$ (\mathbb{Z}_n je grupa: $(n-1) + 1 = 0$)
- polni dvodelni graf** $K_{m,n}; m, n \geq 1 :$
 $V(k_{m,n}) = \{v_1, \dots, v_m\} \cup \{u_1, \dots, u_n\}$
 $E(k_{m,n}) = \{v_i u_j \mid i \in [m], j \in [n]\}$

- kocke** $Q_d; d \geq 1 :$
 $V(Q_d) = \left\{ \{0, 1\}^d \right\} = \{(b_1, \dots, b_d) \mid b_i \in \{0, 1\}\} \dots$ *to so vsa binarna števila dložine d*
 $E(Q_d) = \{(b_1, \dots, b_d)(p_1, \dots, p_d) \mid p_1 = b_1, \dots, p_i \neq b_i, \dots, p_d = b_d\}$
... vozlišči sta sosednji, če se razlikujeta le v enem bitu.
 Q_d je d -regularen graf.
- posplošeni petersonovi grafi** $P_{n,k}; n \geq 3; 2k < n$
 $V(P_{n,k}) = \{v_0, \dots, v_{n-1}\} \cup \{u_0, \dots, u_{n-1}\}$
$$E(P_{n,k}) = \{v_i v_{i+1} \mid i \in \mathbb{Z}_n\} \cup \{v_i u_i \mid i \in \mathbb{Z}_n\} \cup \{u_i u_{i+k} \mid i \in \mathbb{Z}_n\}$$

- Petersenov graf** $P = P_{5,2}$

Razširjene definicije grafov

- dopuščamo **zanke** (povezave iz vozlišča v isto vozlišče)
- dovolimo večkratne povezave
- digrafi** ali grafi usmerjenih povezav (povezave so urejeni pari, vozlišča imajo lahko različno vhodno in izhodno stopnjo)
- uteženi grafi** (omrežje) $G = (V(G), E(G))$ skupaj s funkcijo $W_V : V(G) \rightarrow \mathbb{R}$ in/ali $W_E : E(G) \rightarrow \mathbb{R}$

Poti in cikli

- sprehod** je zaporedje vozlišč, ki so zaporedno sosednja
- dolžina sprehoda** je število povezav v sprehodu.
- sprehod je **enostaven**, če so vse povezave različne.
- pot** v grafu G je sprehod v katerem so vsa vozlišča različna.
- sprehod je **sklenjen**, če $v_0 = v_n$.
- cikel** v grafu G je sklenjen sprehod, kjer so vsa vozlišča razen prvega in zadnjega različna.
- notranje disjunktna uv-poti** so take uv -poti, ki imajo skupni le vozlišči u in v

Vozlišči u in v sta v relaciji $u \approx v$, če med njima obstaja uv -pot (sprehod).
 \approx je *ekvivalenčna relacija* in razdeli graf na ekvivalenčne razrede.
Podgrafom, ki jih inducirajo ti ekvivalenčni razredi, rečemo **komponente** grafa.
Število komponent grafa G označimo z $\Omega(G)$

- graf je **povezan**, če ima samo eno komponento.
- razdalja** $d_G(u, v)$ je dolžina najkrajše uv -poti. Če taka pot ne obstaja je razdalja 0.
- premer grafa** $\text{diam}(G)$ je največja razdalja med vozlišči. (G je povezan $\Leftrightarrow \text{diam}(G) < \infty$)
- notranji premer** ali **ožina** grafa je dolžina najkrajšega cikla.

Dvodelni grafi

Graf G je **dvodelen**, če obstaja razdelitev množice $V(G)$ v množici A in B , tako, da ima vsaka povezava iz $E(G)$ eno krajišče v A in drugo v B .

$$V(G) = A \cup B \quad \text{in} \quad A \cap B = \emptyset$$

Dvodelen graf ne vsebuje lihih ciklov.

Morfizmi grafov

- homomorfizem** iz G v H je preslikava $f : V(G) \rightarrow V(H)$, ki ohranja povezave:

$$u \sim_G v \Rightarrow f(u) \sim_H f(v)$$

- epimorfizem** je funkcija, ki je *surjektivna* na vozliščih in povezavah.
- monomorfizem** ali **vložitev** je funkcija, ki je *injektivna* na vozliščih (posledično na povezavah).
- Vložitev $f : G \rightarrow H$ je **izometrija**, če ohranja razdalje:
 $\forall u, v \in V(G) : d_H(f(u), f(v)) = d_G(u, v)$

- Če je $f : V(G) \rightarrow V(H)$ bijekcija in sta f in f^{-1} homomorfizma, je f **izomorfizem**.
- Grafa G in H sta **izomorfna** ($G \cong H$), če med njima obstaja izomorfizem. *Izomorfnost grafov pomeni, da se razlikujeta le v poimenovanju vozlišč.*
- avtomorfizem** je izomorfizem $f : G \rightarrow G$. Množico avtomorfizmov grafa G označimo $\text{Aut}(G)$. Če dodamo še operacijo komponiranja, dobimo grupo avtomorfizmov grafa G .

Operacije na grafih

Komplementarni graf

Komplementarni graf \overline{G} grafa G je graf z $V(\overline{G}) = V(G)$ in

$$uv \in E(\overline{G}) \Leftrightarrow uv \notin E(G)$$

$$\overline{(\overline{G})} = G$$

$$\text{Aut}(\overline{G}) \cong \text{Aut}(G)$$

Odstranjevanje vozlišč in povezav

Če je $X \subseteq V(G)$, je graf $G - X$ podgraf grafa G **induciran** z vozlišči $V(G) \setminus X$

Če je $F \subseteq E(G)$ potem je $G - F$ upet podgraf z množico povezav $E(G) \setminus F$.

Poljuben podgraf H grafa G lahko zapišemo kot $H = (G - X) - F$.

Skrčitev ali minor

Če je $e \in E(G)$, graf G/e dobimo tako, da identificiramo (združimo) krajišči povezave e , odstranimo zanko in morebitne večkratne povezave. (če delamo z multigraf, pustimo večkratne povezave)

Če je $F \subseteq E(G)$, graf G/F dobimo tako, da zaporedno skrčimo vse povezave iz F .

Graf H je **minor** grafa G , če obstaja $G' \subseteq G$ in $F' \subseteq E(G')$, da je $H \equiv G'/F'$.

Subdivizije povezav

$G^+(e)$ je graf, ki ga dobimo tako, da povezavo e nadomestimo s potjo dolžine 2 (povezavo e *subdividiramo*).

Graf H je **subdivizija** grafa G , če ga lahko dobimo tako, da subdiviziramo povezave v G .

Glajenje povezav

$G^-(u)$ je graf, ki ga dobimo tako, da odstranimo vozlišče u (mora biti stopnje 2) in dodamo povezavo med u -jevimi sosedi.

Kartezični produkt grafov $G\Box H$

$$V(G\Box H) = V(G) \times V(H)$$

$$E(G\Box H) = \{(g, h)(g', h') \mid \\ (g = g' \wedge hh' \in E(H)) \vee (h = h' \wedge gg' \in E(G))\}$$

Lastnosti

- komutativnost $G\Box H \cong H\Box G$
- enota $G\Box K_1 \cong K_1\Box G \cong G$
- asociativnost $(G_1\Box G_2)\Box G_3 \cong G_1\Box (G_2\Box G_3)$

k-povezanost grafa

- vozišče *v* je **prerezno**, če ima graf $G - v$ več komponent kot G
- povezava *e* je **prerezna** ali **most**, če ima $G - e$ več komponent kot G .
- množica vozišč $S \subseteq V(G)$ je **prerez** grafa G , če je $\Omega(G - S) > \Omega(G)$
- množica povezav $F \subseteq E(G)$ je **povezavni prerez** grafa G , če je $\Omega(G - F) > \Omega(G)$
- Graf G je ***k*-povezan**, če ima vsaj $k + 1$ vozišč in nobena podmnozica z manj kot *k* vozišči ni prerezna.
- povezanost** grafa $\kappa(G)$ je največji *k* za katerega je graf *k*-povezan. *Najmanjše število vozišč, ki jih moramo odstraniti, da graf postane nepovezan*

globalna inačica: Graf G s $k + 1$ vozišči je *k*-povezan \Leftrightarrow za vsak par vozišč obstaja *k* notranjih disjunktnih poti.
lokalna inačica: Če sta *u* in *v* nesosednji vozišči, je maksimalno število notranjih disjunktnih *uv*-poti enako moči minimalne prerezne množice, ki graf razdeli tako, da sta *u* in *v* v različnih komponentah.

Drevesa

- gozd** je graf brez ciklov
- drevo** je *povezan* graf brez ciklov
- list** je vozišče stopnje 1

Vsako drevo z vsaj 2 voziščema vsebuje vsaj dva lista.
Za poljuben graf *T* so ekvivalentne naslednje trditve:

- T* je drevo
- za vsak par vozišč obstaja enolična pot
- T* je povezan in vsaka povezava je most
- $|E(T)| = |V(T)| - 1$

Za povezane grafe velja $|E(T)| \geq |V(T)| - 1$

Vpeta drevesa

Vpeto drevo grafa *G* je vpet podgraf, ki je drevo.

Graf je **povezan** \Leftrightarrow vsebuje vpeto drevo.

Število vpetih dreves v grafu *G* označimo $T\tau(G)$.

Če je *e* povezava multighafa *G* je

$$\tau(G) = \underbrace{\tau(G - e)}_{\text{odstranitev}} + \underbrace{\tau(G/e)}_{\text{skrčitev}}$$

$$\tau(G) = \tau(G_1) \cdot \tau(G_2)$$

$G_1, G_2 \subset G$ nimata nobene skupne povezave in le eno skupno vozišče

Laplaceova matrika $L(G)$ multigrafa *G* je kvadratna matrika, katere vrstice in stolpci predstavljajo vozišča.

$$L(G)_{i,j} = \begin{cases} deg(v_i); & i = j \\ -(\text{št. povezav med } v_i \text{ in } v_j); & i \neq j \end{cases}$$

Število vpetih dreves grafa *G* lahko izračunamo z determinanoto matrike $L(G)$, ki ji odstranimo vrstico in stolpec poljubnega vozišča.

Prüferjeva koda

T je drevo z vozišči 1, ..., *n*. Po vrsti odstranjujemo liste z najmanjšo oznako in v kodo postavimo oznako sosedra ravnokar odstranjenega lista.

Eulerjevi grafi

- eulerjev sprehod** je sprehod, ki prehodi vsako povezavo grafa natanko enkrat.
- eulerjev obhod** je sklenjen eulerjev sprehod.
- eulerjev graf** je graf v katerem obstaja eulerjev obhod.
 - Povezan graf je eulerjev \Leftrightarrow vsa njegova vozišča so sode stopnje

Eulerjev obhod poiščemo z **eulerjevim algoritmom**.

- Začnemo v poljubnem vozišču
- Premaknemo se po poljubni povezavi (most izberemo le, če ne gre drugače), ki jo za sabo pobrišemo
- Postopek ponavljamo dokler ne pridemo naokrog

Hamiltonovi grafi

- hamiltonova pot** *P* v grafu *G* je taka, da velja $V(P) = V(G)$ (= vpeta pot)
- hamiltonov cikel** *C* v grafu *G* je tak, da velja $V(C) = V(G)$ (= vpet cikel)
- hamiltonov graf** je graf v katerem obstaja hamiltonov cikel.
 - Če je $S \subseteq G$ in $\Omega(G - S) > |S|$ *G* ni hamiltonov.
 - Naj bo *G* graf z $|V(G)| \geq 3$. Če za vsak par nesosednjih vozišč *u* in *v* grafa *G* velja:

$$deg_G(u) + deg_G(v) \geq |V(G)|$$
je *G* hamiltonov.
 - Naj bo *G* graf z $|V(G)| \geq 3$. Če za vsako vozišče *u* velja

$$deg(u) \geq \frac{|V(G)|}{2}$$
je *G* hamiltonov.

Ravninski grafi

Ranvinski graf, je tak graf, ki ga lahko narišemo tako, da se nobeni povezavi ne sekata. Taki risbi rečemo **ravninska risba grafa**. Rečemo, da je graf **vložen v ravnino**.

Če iz ravninske risbe izrežemo vse črte in točke, dobimo nekaj ločenih območji, ki jim pravimo **lica**. Množico lic označimo z $F(G)$.

Če graf lahko vložimo v ravnino, ga lahko tudi na sfero.

Dolžina lica *l(f)* je število povezav, ki jih prehodimo, ko obhodimo lice. Če obhodimo vsa lica v grafu vloženem v ravnino, smo vsako povezavo prehodili dvakrat:

$$\sum_{f \in F(G)} l(f) = 2|E(G)|$$

Ožina grafa *g(G)* je dolžina najkrajšega cikla. Če graf nima cikla je *g(G)* = ∞

Očitno je $f(G) \geq g(G)$.

Če je *G* povezan ravninski graf vložen v ravnino, velja:

$$2|E(G)| = \sum_{f \in F(G)} l(f) \geq \sum_{f \in F(G)} g(G) = |F(G)| \cdot g(G)$$

$$|E(G)| \geq \frac{g(G)}{2}|F(G)|$$

Naj bo *G* ravninski graf vložen v ravnino:

$$|V(G)| - |E(G)| + |F(G)| = 1 + |\Omega(G)|$$

Če je *G* povezan ravninski graf, ki ni drevo ($g(G) \neq \infty$), velja

$$|E(G)| \leq \frac{g(G)}{g(G) - 2} (|V(G)| - 2)$$

Ker je $g(G) \geq 3$, velja

$$|E(G)| \leq 3|V(G)| - 6$$

Če *G* nima trikotnikov ($g(G) \geq 4$), velja

$$|E(G)| \leq 2|V(G)| - 4$$

Kuratowski izrek: Graf je ravninski \Leftrightarrow ne vsebuje podgrafa izomornega subdiviziji K_5 ali $K_{3,3}$.

Wagnerjev izrek: Graf je ravninski \Leftrightarrow nima minorja izomornega K_5 ali $K_{3,3}$.

Barvanje vozišč

Naj bo *K* množica baru. Tedaj je preslikava $c : V(G) \rightarrow K$ **barvanje grafa** *G*. Barvanje je **dobro**, če velja:

$$\forall u, v \in V(G) \quad : \quad uv \in E(G) \Rightarrow c(u) \neq c(v)$$

Če je $k = |K|$ govorimo o *k*-barvanju. Najmanjši *k* za katerega obstaja doboro barvanje grafa *G*, imanujemo **kromatično število** grafa *G*; oznaka $\chi(G)$.

Če je $H \subseteq G$ je $\chi(H) \leq \chi(G)$.

Požrešni algoritem

Barve označimo z \mathbb{N} . Vzamemo poljubni vrstni red vozišč grafa *G*. Po vrsti barvamo tako, da vozišče *v_i* pobarvamo z najmanjšo možno barvo. Obstaja tak vrstni red, da požrešni algoritem porabi le $\chi(G)$ baru.

Če je *G* graf, je $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

Če je *G* povezan graf in ni C_{2n+1} ali K_n , je $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

Za vsak ravninski graf velja $\chi(G) \leq 4$.

Barvanje povezav

Ko barvamo povezave, zahtevamo, da vse povezave s skupnim krajiščem prejmejo različne barve. Najmanjše število baru za barvanje povezav grafa *G* je **kromatični index** grafa; oznaka $\chi'(G)$.

Vse povezave vozišča *v* dobijo različne barve, zato je $\chi'(G) \geq \Delta(G)$.

$$\chi'(G) \in \{ \underbrace{\Delta(G)}_{\text{razred 1}}, \underbrace{\Delta(G) + 1}_{\text{razred 2}} \}$$

K_{2n} je iz razreda 1, K_{2n+1} pa iz razreda 2. Vsi dvodelni grafi so iz rezreda 1.

OSNOVE ALGEBRE

Algebrske struktre

- **grupoid** (M, \cdot) urejen par z neprazno množico M in zaprto opreacijo \cdot .
- **polgrupa** grupoid z asociativno operacijo $\forall x, y, z \in M : (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
- **monoid** polgrupa z enoto $\exists e \in M \forall x \in M : e \cdot x = x \cdot e = x$.
- **grupa** polgrupa v kateri ima vsak element inverz $\forall x \in M \exists x^{-1} \in M : x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e$.
- **abelova grupa** grupa s komutativno operacijo $\forall x, y \in M : x \cdot y = y \cdot x$.

Potence elementov

Naj bo (A, \cdot) polgrupa in $a \in A$. Potem je potenca a^n , $n \in \mathbb{N}$ induktivno definirana z:

$$a^0 = e \quad \text{in} \quad a^n = a^{n-1} \cdot a$$

Iz definicije sledi:

$$a^n a^m = a^{n+m} \quad (a^n)^m = a^{nm}$$

Recimo, da je a obrnljiv:

$$(a^{-1})^n = (a^n)^{-1}$$

Množica \mathbb{Z}_m

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$$

Vpeljemo seštevanje $+_m$ po modulu m in množenje \cdot_m po modulu m .

Dobimo grupo $(\mathbb{Z}_m, +_m)$ in monoid (\mathbb{Z}_m, \cdot_m) .

Cayleyeva tabela

Za vsak element množice imamo en stolpec in eno vrstico. V vsakem polju je produkt elementa stolpca in elementa vrstice.

Red elementa

Naj bo (G, \cdot) grupa. Red elemneta a je najmanjše naravno število $n \in \mathbb{N}$, da velja

$$a^n = e$$

Če je grupa končna, tak eksponent vedno obstaja. Pri neskončnih grupah pa je red ∞ , če tak n ne obstaja.

Red enote je 1. Enota je tudi edini element grupe, ki ima red 1.

Podgrupe

Naj bo (G, \cdot) grupa. Tedaj je $H \subseteq G$ podgrupa, je je (H, \cdot) grupa. Če je H podgrupa G in $H \neq G$ pišemo $H \subset G$ (**prava podgrupa**). $\{e\}$ je vedno podgrupa G (**trivialna grupa**).

Naj bo (G, \cdot) grupa in $\emptyset \neq H \subseteq G$. Tedaj je

$$(H, \cdot) \subseteq (G, \cdot) \Leftrightarrow \forall x, y \in H : x^{-1}y \in H$$

Naj bo (G, \cdot) končna grupa in $\emptyset \neq H \subseteq G$. Tedaj je

$$(H, \cdot) \subseteq (G, \cdot) \Leftrightarrow \cdot \text{ je notranja operacija}$$

Ciklična podgrupa

Naj bo (G, \cdot) grupa in $a \in G$. Potem je $\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$

$$(\langle a \rangle, \cdot) \subseteq (G, \cdot)$$

Podgrupa $(\langle a \rangle, \cdot)$ je **ciklična** podgrupa v G generirana z a .

Če je G grupa in $a \in G$ tak element, da je $\langle a \rangle = G$, je G **ciklična grupa**, element a pa **generator** grupe G .

Če ima $a \in G$ neskončen red, so vse potence a paroma različni elementi grupe G .

Če ima $a \in G$ končen red, velja

$$\forall i, j \in \mathbb{Z} : a^i = a^j \Leftrightarrow n|(i - j)]$$

$$a^n = e \wedge a^k = e \Rightarrow n|k$$

Naj bo $G = \langle a \rangle$ ciklična grupa reda n . Potem je

$$G = \langle a^k \rangle \Leftrightarrow \gcd(n, k) = 1$$

Center grupe

Naj bo (G, \cdot) grupa. Potem je **center** grupe $Z(G)$ podmnožica elementov, ki komutirajo z vsemi elementi v G :

$$Z(G) = \{a \in G : ax = xa \forall x \in G\}$$

Center grupe G je tudi podgrupa G :

$$(Z(G), \cdot) \subseteq (G, \cdot)$$

Permutacijske grupe

- **Permutacija** množice A je bijektivna funkcija $\pi : A \rightarrow A$.

- **Permutacijska grupa** na množici A je množica premutaciji množice A , ki tvorijo grupo za komponiranje funkciji.

- **Simetrična grupa** S_n je permutacijska grupa na $[n]$, ki vsebuje vse permutacije množice $[n]$.

- **Alternirajoča grupa** A_n je grupa vseh sodih permutaciji množice $[n]$

$$A_n \subseteq S_n$$

$$\forall n > 1 : |A_n| = \frac{n!}{2}$$

Izomorfizmi grup

Naj bosta (G, \cdot) in $(H, *)$ grupi. Preslikava $\alpha : G \rightarrow H$ je **homomorfizem**, če velja:

$$\forall a, b \in G : \alpha(a \cdot b) = \alpha(a) * \alpha(b)$$

Če je α še bijektivna, je **izomorfizem**.

Če je $G = H$, je α **avtomorfizem**.

Grupi sta **izomorfni**, če med njima obstaja izomorfizem. Pišemo $G \approx H$.

Cayleyev izrek: Vsaka grupa je izomorfna neki permutacijski grupi.

Izomorfizem grup pomeni, da imamo *isti* grupi, le da sta definirani na različna načina.

Grupi G in H z izpmorfizmom $\alpha : G \rightarrow H$ imata lastnosti:

- α preslika enoto G v enoto H .
- $\forall a \in G, n \in \mathbb{Z} : \alpha(a^n) = (\alpha(a))^n$
- $\forall a, b \in G : a \text{ in } b \text{ komutirata} \Leftrightarrow \alpha(a) \text{ in } \alpha(b) \text{ komutirata}$
- G je abelova $\Leftrightarrow H$ je abelova
- G je ciklična $\Leftrightarrow H$ je ciklična
- $K \subseteq G \Rightarrow \alpha(K) \subseteq H$

:

: