VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO Skin Active

Гель-фотосенсибилизатор для профессиональных протоколов ФДТ · 30 мл

ИЗДЕЛИЕ

VIREO Skin Active

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VSA-IFU-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO Skin Active — гель-фотосенсибилизатор для наружного применения в профессиональных протоколах фотодинамической терапии. Препарат наносится на кожу и активируется светом аппарата VIREO.

Применяется только по назначению специалиста. Не предназначен для самостоятельного использования в домашних условиях.

02 Состав

- Хлорофиллины, включая хлорин Е6 — фотосенсибилизирующие компоненты.
- Фикоцианин.
- Изопропанол, вода очищенная, глицерин.
- Гелеобразователь, сорбат калия.
- Объём — 30 мл.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

- акне, постакне, расширенные поры;
- гиперпигментация;
- фотостарение и снижение тонуса кожи;
- комплексные протоколы с аппаратами VIREO.

Решение о применении принимает врач с учётом состояния кожи и противопоказаний.

04 Способ применения

- Очистите кожу и высушите её.
- Нанесите гель тонким слоем на зону обработки.
- Выдержите около 20 минут согласно протоколу.
- Проведите сеанс на аппарате VIREO.
- Снимите остатки препарата и нанесите постпроцедурный уход.

> Точную экспозицию и схему применения определяет врач.

05 Меры предосторожности

- Избегайте попадания геля в глаза и на слизистые оболочки.
- После нанесения защищайте кожу от прямого солнца.
- Не наносите препарат на повреждённую кожу.
- Используйте защитные очки во время сеанса.
- При выраженном жжении или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

06 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Беременность и период лактации.
- Острые воспалительные процессы на коже.
- Нарушение целостности кожи в зоне нанесения.
- Повышенная чувствительность к свету и фотодерматозы.

07 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности и срок после вскрытия указаны на упаковке.

08 Особые указания

После процедуры рекомендуется использовать успокаивающий крем VIREO Calm и соблюдать фотопротекцию. Не сочетайте препарат с другими фотосенсибилизирующими средствами без согласования с врачом.

09 Взаимодействие

Не применяйте препарат одновременно с другими средствами, повышающими чувствительность кожи к свету, без консультации специалиста. Перед процедурой сообщите врачу о принимаемых лекарствах.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Препарат выпускается для профессионального применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны на упаковке.

11 Контакты

Телефон: +7 (495) 123-45-67
E-mail: karlovserg@mail.ru
Работаем по всей России.

12 Правовая информация

Информация в документе предназначена для специалистов и не заменяет консультацию врача. Препарат применяется только в составе профессионального протокола под контролем специалиста.

> Документ носит информационный характер. Актуальную редакцию инструкции и регистрационные документы предоставляет производитель.