VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO CALM

Гель постпроцедурный
30 мл

ИЗДЕЛИЕ
VIREO CALM

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VCM-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO CALM — постпроцедурный гель на основе пантенола и гидрогенизированного масла миндаля с добавлением лизатов лакто- и бифидобактерий и витамина Е. Повышает уровень комфорта процедуры для клиента.

02 Состав

Действующие компоненты:

- пантенол;
- гидрогенизированное масло миндаля;
- лизаты лакто- и бифидобактерий;
- витамин Е.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

Применяется после процедуры ФДТ:

- снятие возможных побочных эффектов;
- увлажнение и успокоение кожи;
- повышение комфорта после светового воздействия;
- поддержка результата процедуры.

04 Действие препарата

Гель увлажняет и успокаивает кожу, снижает ощущение дискомфорта после процедуры и усиливает моментальный эффект от ФДТ. Поддерживает барьерные свойства кожи.

05 Совместимость с процедурой

VIREO CALM — постпроцедурное средство, не требует световой активации. Наносится после сеанса ФДТ с любым аппаратом VIREO и любым гелем-фотосенсибилизатором линейки.

06 Способ применения

- Завершите процедуру ФДТ и удалите остатки фотосенсибилизатора.
- Нанесите гель тонким слоем на зону обработки.
- Распределите лёгкими массажными движениями.
- При необходимости повторяйте нанесение по рекомендации специалиста.
- Не смывайте гель сразу после нанесения.

> Кратность применения определяет специалист.

07 Меры предосторожности

- Наносите только на чистую кожу.
- Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- Не наносите на инфицированные или мокнущие участки.
- При аллергической реакции прекратите применение.
- Используйте фотопротекцию после процедуры.
- Храните в недоступном для детей месте.

08 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Нарушение целостности кожи в зоне нанесения.
- Гнойные и инфекционные процессы кожи.
- Аллергические реакции на пантенол или масла в анамнезе.
- Беременность и период лактации — по решению врача.

09 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке и в сопроводительных документах.

10 Особые указания

После процедуры рекомендуется соблюдать фотопротекцию и избегать агрессивного ухода за кожей в течение 24–48 часов. При сохранении покраснения или дискомфорта обратитесь к специалисту.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	гель
Объём	30 мл
Назначение	постпроцедурный уход
Действующие компоненты	пантенол, масло миндаля, лизаты, витамин E
Световая активация	не требуется
Страна происхождения	Россия