VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO SKIN MIX

Биогель для активного воспаления
30 мл

ИЗДЕЛИЕ
VIREO SKIN MIX

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VSM-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO SKIN MIX — сочетание производных хлорина Е6 и гиперицина (экстракта зверобоя). Состав подобран для случаев активного воспалительного процесса.

02 Состав

Два фотосенсибилизатора с разным механизмом фотохимической реакции:

- производные хлорина Е6 — реакция 2 типа;
- гиперицин (экстракт зверобоя) — реакция 1 типа.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

Применяется по назначению специалиста:

- акне любой степени воспалительного процесса;
- постакне;
- экзема;
- псориаз;
- алопеция;
- состояния после травмирования мягких тканей и кожного покрова.

Рекомендован для кожи интимной зоны.

04 Действие препарата

Препарат оказывает противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое, противовирусное, противоотечное и регенерирующее действия.

Хлорин запускает активацию молекулярного кислорода с выходом синглетного кислорода и других активных форм кислорода. Гиперицин дополнительно активирует перекисные соединения (H_2O_2) — за счёт этого реакции двух типов дополняют друг друга.

05 Совместимость со светом

Эффективен с лазерными и светодиодными аппаратами 400–700 нм, в том числе 400 нм (синий) и 660 нм (красный).

Особенно эффективен в сочетании с аппаратами VIREO, которые имеют 6 диапазонов световых волн, включая белый солнечный (400...780 нм) без опасного ультрафиолета.

06 Способ применения

- Очистите кожу препаратом VIREO CLEANER.
- Нанесите гель тонким слоем на зону воспаления.
- Выдержите экспозицию по протоколу — обычно 20 минут.
- Проведите световое воздействие аппаратом VIREO.
- Удалите излишки и нанесите гель VIREO CALM.

> При активном воспалении схему и количество процедур определяет специалист.

07 Меры предосторожности

- Наносите препарат только на чистую и сухую кожу.
- Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- После нанесения защищайте зону обработки от прямого солнца.
- Не наносите на повреждённую кожу без назначения специалиста.
- Используйте защитные очки во время светового воздействия.
- При выраженном жжении или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.
- При обработке интимной зоны действуйте строго по назначению врача.

08 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Повышенная чувствительность к свету, фотодерматозы.
- Беременность и период лактации — по решению врача.
- Острые воспалительные процессы в зоне нанесения — по назначению врача.
- Онкологические заболевания — только по назначению специалиста.

09 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке и в сопроводительных документах.

10 Особые указания

Гиперицин — растительный фотосенсибилизатор: после нанесения возможна повышенная чувствительность к свету. В день процедуры и после неё используйте фотопротекцию и избегайте длительного пребывания на солнце.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	гель
Объём	30 мл
Назначение	активное воспаление, акне, экзема, псориаз
Фотосенсибилизаторы	хлорин Е6, гиперицин
Тип реакции	1 и 2 тип
Страна происхождения	Россия