VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO Head

Спрей-фотосенсибилизатор для кожи головы · 50 мл

ИЗДЕЛИЕ

VIREO Head

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VH-IFU-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO Head — спрей-фотосенсибилизатор для кожи головы. Применяется в профессиональных протоколах фотодинамической терапии в трихологии и косметологии.

Препарат не обладает самостоятельной активностью: его действие активируется только при воздействии специального светового излучения. Применяется по назначению специалиста.

02 Состав

- Хлорофиллины, включая хлорин Е6.
- Гиперицин.
- Кофеин, биотин.
- Вода очищенная, глицерин.
- Гидроксиэтилцеллюлоза, сорбат калия.
- Объём — 50 мл.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

- протоколы ФДТ для кожи головы;
- комплексные программы в трихологии;
- работа с плотностью и качеством волос в составе комбинированных схем;
- применение совместно с аппаратами VIREO.

Целесообразность применения в каждом случае определяет врач.

04 Способ применения

- Очистите кожу головы и высушите её.
- Нанесите спрей по проборам, держа носик флакона максимально близко к корням волос.
- Мягко помассируйте кожу головы.
- Наденьте полиэтиленовую шапочку на 20 минут.
- Снимите шапочку и проведите освечивание области кожи головы аппаратом согласно протоколу.

> Экспозицию и схему применения определяет специалист. Расход — около 1,4–1,6 мл на всю поверхность кожи головы (≈8–10 нажатий), одно нажатие помпы подаёт 0,12–0,16 мл.

05 Меры предосторожности

- Избегайте попадания спрея в глаза.
- После нанесения защищайте кожу головы от прямого солнца.
- Не наносите на повреждённую кожу.
- Используйте защитные очки во время сеанса.
- При жжении или выраженном покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

06 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Беременность и период лактации.
- Острые воспалительные процессы кожи головы.
- Нарушение целостности кожи в зоне нанесения.
- Фотодерматозы и повышенная чувствительность к свету.

07 Хранение

- Храните при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке.

08 Особые указания

В трихологии ФДТ рекомендуется применять в составе комбинированных протоколов. Не сочетайте препарат с другими фотосенсибилизирующими средствами без согласования с врачом.

09 Взаимодействие

Перед процедурой сообщите специалисту о принимаемых лекарствах и средствах для ухода за кожей головы. Некоторые препараты могут повышать чувствительность к свету.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Препарат выпускается для профессионального применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны на упаковке.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: karlovserg@mail.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Объём	50 мл
Цвет	Бледно зелёный
Свет (нм)	Синий 400, жёлтый 590, красный 660, полный спектр
Сертификация	Есть
Страна происхождения	Россия