VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO DENTAL

Биогель стоматологический

ИЗДЕЛИЕ	РЕДАКЦИЯ
VIREO DENTAL	1.0 · 2026
КОД ДОКУМЕНТА	ЯЗЫК
VDN-IFU-2026	Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO DENTAL — стоматологический биогель для применения в протоколах фотодинамической терапии слизистой оболочки полости рта.

Применяется врачом-стоматологом в комплексной терапии воспалительных заболеваний слизистой и при реабилитации после вмешательств.

02 Состав

Фотосенсибилизирующие компоненты хлоринового ряда, гелевая основа.

- Компоненты, обеспечивающие светочувствительность геля.
- Гелеобразующие и увлажняющие компоненты основы.
- Полный состав указан на упаковке препарата.

> Перед применением проверьте состав на упаковке.

03 Показания к применению

Применяется по назначению врача-стоматолога:

- Афтозный стоматит и другие заболевания слизистой полости рта.
- Воспалительные процессы слизистой в составе комплексной терапии.
- Реабилитация после стоматологических вмешательств.
- Протоколы ФДТ со стоматологической капой VIREO DENTAL LED.

> Конкретный протокол определяет стоматолог.

04 Способ применения

- Очистите слизистую полости рта.
- Нанесите гель на зону обработки аппликатором.
- Выдержите экспозицию, указанную врачом.
- Установите стоматологическую капу и проведите сеанс.
- Удалите излишки геля салфеткой.
- Не принимайте пищу и напитки в течение времени, указанного врачом.

> Время экспозиции и режим определяет врач.

05 Меры предосторожности

- Избегайте попадания геля в глаза и дыхательные пути.
- Не проглатывайте препарат.
- Не наносите на участки с выраженным кровотечением.
- Используйте защитные очки во время сеанса.
- При жжении, отёке или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

06 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Острые гнойные процессы в зоне нанесения.
- Беременность и период лактации.
- Повышенная чувствительность к свету.
- Аллергические реакции на компоненты геля.

07 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности и срок после вскрытия указаны на упаковке.

08 Особые указания

Препарат предназначен для применения врачом-стоматологом. При случайном проглатывании небольшого количества прополощите рот водой и обратитесь к врачу при ухудшении самочувствия.

09 Взаимодействие

Сообщите врачу о принимаемых лекарствах и средствах для ухода за полостью рта. Некоторые препараты повышают чувствительность слизистых к свету.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Препарат выпускается для стоматологического применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны на упаковке.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	стоматологический гель
Назначение	слизистая оболочка полости рта
Объём	указан на упаковке
Применение	по назначению врача-стоматолога
Сертификация	есть
Страна происхождения	Россия