

第11回 線積分

曲線の表示と弧長要素

区分的に C^1 級の正則曲線 C を $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ($a \leq t \leq b$) で表す。パラメータが増える方向を曲線の向きとする。

$$ds = |\vec{r}'(t)| dt = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt, \quad \text{Length}(C) = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt.$$

積分は曲線の各滑らかな部分で計算して足し合わせる。

スカラー場の線積分：弧長に沿う総量

曲線上の連続なスカラー場 f に対して

$$\int_C f ds := \int_a^b f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt.$$

f が線密度なら、この積分は曲線状の物体の質量を表す。弧長要素は非負であり、曲線の向きを逆にしても値は変わらない。

例：単位円周上の $\int_C x^2 ds$ 。 $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$ 、 $0 \leq t \leq 2\pi$ 、 $|\vec{r}'| = 1$ なので

$$\int_C x^2 ds = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi.$$

ベクトル場の線積分：仕事と循環

連続なベクトル場 $\vec{F} = (P, Q, R)$ に対して

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} := \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt = \int_C (P dx + Q dy + R dz).$$

曲線の向きを逆にすると符号が変わる。閉曲線上の積分は $\oint_C$ とも書く。力の場なら仕事、速度場なら接線方向の流れの循環を表す。

例： $\vec{F} = (-y, x)$ と単位円周の反時計回り。

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = (-\sin t, \cos t) = \vec{r}'(t), \quad \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

ポテンシャルと線積分の基本定理

ϕ が C^1 級、 $\vec{F} = \nabla \phi$ 、 C が A から B への曲線なら

$$\int_C \nabla \phi \cdot d\vec{r} = \int_a^b \frac{d}{dt} \phi(\vec{r}(t)) dt = \phi(B) - \phi(A).$$

この値は端点だけで決まり、経路によらない。特に閉曲線では0になる。たとえば $\vec{F} = (x, y)$ は $\phi = (x^2 + y^2)/2$ の勾配である。

再パラメータ化と向き

同じ曲線を重複なく走る正則な表示へ変えても、弧長積分の値は変わらない。ベクトル場の線積分は、向きを保つ表示変更で値が保存される。曲線を何周も走れば、その回数に応じて積分も加算される。

$f ds$ には速度の大きさを、 $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ には速度ベクトルを使う。始点・終点と進む向きを必ず指定する。

第11回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. 半径 $R > 0$ の円周 C について、 $\int_C 1 \, ds$ と $\int_C x^2 \, ds$ を求めよ。
2. $\vec{r}(t) = (t, t^2)$ ($0 \leq t \leq 1$) で表される曲線に沿って、 $\int_C x \, ds$ を求めよ。
3. $\vec{F} = (-y, x)$ を単位円周で時計回りに積分せよ。反時計回りの値との関係も説明せよ。
4. $\vec{F} = (x, y)$ の、 $(0, 0)$ から $(1, 2)$ への線分に沿う仕事を、直接の積分とポテンシャルの両方で求めよ。
5. $\vec{F} = (2xy, x^2 + 2y)$ のポテンシャルを求め、 $(0, 0)$ から $(1, 2)$ への任意の区分的に滑らかな曲線に沿う線積分を求めよ。
6. $\vec{F} = (-y, x)$ を $(0, 0)$ から $(1, 1)$ へ積分する。対角線に沿う経路と、 $(1, 0)$ を経由する2本の線分の経路でそれぞれ計算し、経路依存性を確認せよ。