第4回　前回のコメントへのフィードバック

重積分の意味とイメージ

Q. 区分求積はいらないのでは？

A. おそらく計算するだけなら、必要ない場合のほうが圧倒的に多いと思いますが、なぜこの定義でよいのかを知ることは、他の分野とのつながりを考えると必要だと思います。例えば力学や電磁気学などを勉強するときに、「小さく分けて、それぞれの量を足し合わせる」という考え方がわかっていないと、何をやっているのかわからなくなります。

Q. 重積分は何に利用されているか？

A. 物理では色んな場面で出てきます。質量や電荷などを求めるのに必要ですね。例えば、場所によって密度が違う物体でも、その密度を物体全体にわたって積分すると、全体の質量が求められます。化学や生物学でも、濃度から物質の総量を求めるときなどに出てくると思います。

Q. 重積分の図形的なイメージがわかない


A. $f(x,y) \geq 0$ の場合は、

$$\{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ 0 \leq z \leq f(x,y)\}$$

という立体の体積が、重積分

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$$

の値になります。D を底面として、その上に高さ $f(x,y)$ まで積み上げた立体を考える感じですね。底面を細かく分けて、小さな柱の体積を全部足し合わせていると思うと、イメージしやすいかもしれません。



小さな柱の体積 $\simeq f(x_i, y_j)\,\Delta A$

Q. 前回扱った重積分は、球のような対称性があるものに対して、どのような変化が式に表れるか？

A. その場合は、例えば原点を中心とする半径1の球なら、

$$D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

とすると、(x,y) に対する高さが $2\sqrt{1-x^2-y^2}$ になるので、

$$\iint_D 2\sqrt{1-x^2-y^2}\,dx\,dy$$

を計算することになります。ここでいう高さは、球の下側から上側までの長さです。

Q. 積分が難しい（$\int\int\int\int$）

A. 楽しそうな記号ですね。

Q. 重積分がどぱると話題

A. そんなはずは、、

第4回　フィードバック（つづき）

計算の進め方と復習

Q. 計算のミスをしないための検算の仕方

A. 自分の場合は、違う方法で計算して2つが一致していたら大丈夫かなと思っています。例えば累次積分で、x を先に積分したものと y を先に積分したものが一致していたら、という感じでしょうか。積分の順番を変えるときは、積分範囲にも気をつけてください。

Q. 久々に積分をするので難しい。コツはあるか？

A. 練習あるのみですね。

Q. 春学期の知識は必要か？

A. ある程度必要ですが、高校までの範囲がわかっていれば、ある程度は大丈夫だと思います。（前期の積分のところは使いますね。）置換積分や部分積分などは、少し復習しておくとよいと思います。

授業への出席と試験

Q. 出席を取らない他クラスは10人くらいしか出席してないらしい

A. 出席を取らないとそうなりますよね、、1限は辛い部分もありますが、コンスタントに来て勉強したほうが、学期単位では圧倒的に楽に生活できるとは思います。あとでまとめて取り返そうとするのは、なかなか大変ですからね。

Q. 過去問を公開するか？

A. 期末テストの過去問は必ず公開します。公開時期については、少しお待ちください。

Q. 中間テストの難易度

A. 春と同じくらいです。基礎問題を中心に出そうと思います。

感想と近況

Q. 前回の感想がレジュメに採用された

A. これからも頑張ってください。

Q. バロンドールはケインだった

A. あら予想外。

Q. 寒くて服がまだ用意できていない

A. もう冬がきますよ！

Q. 平均何時間寝ているか？

A. 7時間くらいですかね。

第3回　小テスト：区分求積法と重積分

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

$K=[0,1]\times[0,2]$ とする。次の重積分を区分求積法で求めよ。 x 方向を N 等分、y 方向を M 等分し、各小長方形の左下の点で高さを決める。 N, M は正の整数とする。分割幅、小長方形の面積、リーマン和を書き、N, M をそれぞれ独立に無限大にした極限を求めよ。

公式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2}$, $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$（$n$ は正の整数）を用いてよい。

問題

1. $\displaystyle\iint_K y\,dx\,dy$　　（50点）

2. $\displaystyle\iint_K x^2 y\,dx\,dy$　　（50点）

小テストの解答

どちらの問題でも、分割幅、小長方形の面積、左下の点は次のとおりである。

$$\Delta_x=\frac{1}{N},\qquad \Delta_y=\frac{2}{M},\qquad \Delta_x\Delta_y=\frac{2}{NM},$$
$$(x_i,y_j)=\left(\frac{i-1}{N},\frac{2(j-1)}{M}\right)\quad (i=1,\dots,N,\ j=1,\dots,M).$$

被積分関数は K 上で連続なので、リーマン和の極限が重積分の値になる。

1. 被積分関数 y は i によらないので、i についての和は同じ項を N 回足すことになる。

$$\begin{aligned} S_{N,M}&=\frac{2}{NM}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{2(j-1)}{M}\\ &=\frac{4}{M^2}\sum_{j=1}^{M}(j-1)=\frac{4}{M^2}\frac{M(M-1)}{2}\\ &=\frac{2(M-1)}{M}. \end{aligned}$$

したがって、

$$\iint_K y\,dx\,dy=\lim_{\substack{N\to\infty\\ M\to\infty}} S_{N,M}=2.$$

2. i だけに依存する因子と j だけに依存する因子に分かれるので、二重和を積に書き直す。

$$\begin{aligned} T_{N,M}&=\frac{2}{NM}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{i-1}{N}\right)^2\frac{2(j-1)}{M}\\ &=\frac{4}{N^3M^2}\left(\sum_{i=1}^{N}(i-1)^2\right)\left(\sum_{j=1}^{M}(j-1)\right)\\ &=\frac{4}{N^3M^2}\frac{(N-1)N(2N-1)}{6}\frac{M(M-1)}{2}\\ &=\frac{(N-1)(2N-1)}{3N^2}\frac{M-1}{M}. \end{aligned}$$

したがって、

$$\iint_K x^2 y\,dx\,dy=\lim_{\substack{N\to\infty\\ M\to\infty}} T_{N,M}=\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{2}{3}.$$

第4回　重積分の計算と累次積分


到達目標：領域の図から積分範囲を読み取り、累次積分を計算できる。同じ領域を縦・横の両方に切って表し、計算しやすい順序を選ぼう。

長方形上の累次積分

$a<b$、$c<d$ とし、長方形 $K=[a,b]\times[c,d]$ 上で実数値関数 f が連続とする。重積分は、1変数の積分を繰り返して計算できる。

$$\iint_K f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx=\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy.$$

内側の積分では、外側の変数を定数として扱う。右図では $x=x_0$ を固定して y を c から d まで動かし、その結果を x について積分する。



連続関数 g,h に対し $f(x,y)=g(x)h(y)$ なら


$$\iint_K g(x)h(y)\,dx\,dy=\left(\int_a^b g(x)\,dx\right)\left(\int_c^d h(y)\,dy\right).$$

例えば $\displaystyle\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$。

一般領域：縦に切る・横に切る

各図では、下の不等式で領域 D を定め、f は D 上で連続とする。境界関数も対応する閉区間で連続とし、$\phi\le\psi$、$\alpha\le\beta$ とする。太い線は、外側の変数を固定したときの内側の積分区間を表す。


縦に切る：$x=x_0$ を固定



$$a\le x\le b,\quad \phi(x)\le y\le\psi(x)$$

$$\iint_D f\,dx\,dy=\int_a^b\left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f\,dy\right)dx.$$

横に切る：$y=y_0$ を固定




$$c\le y\le d,\quad \alpha(y)\le x\le\beta(y)$$

$$\iint_D f\,dx\,dy=\int_c^d\left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f\,dx\right)dy.$$

両方の形で表せるときは、同じ領域を別の不等式で書き直すことで順序を交換できる。

例：三角形の積分を2通りに計算する

$D=\{(x,y):0\le y\le x\le 1\}$ 上で $f(x,y)=x$ を積分する。横に切ると、範囲は $0\le y\le 1,\ y\le x\le 1$ となる。



$$\int_0^1\left(\int_0^x x\,dy\right)dx=\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3},$$

$$\int_0^1\left(\int_y^1 x\,dx\right)dy=\frac{1}{2}\int_0^1(1-y^2)\,dy=\frac{1}{3}.$$


内側の積分区間は、切り口の「始点から終点まで」。順序を変えても領域は同じなので、積分値も一致する。

計算しやすい順序を選ぶ

e^{y^2} を y で積分するのは難しいが、x で積分するなら定数として扱える。領域は $0 \le x \le y \le 1$。横に切ると $0 \le y \le 1,\ 0 \le x \le y$ となる。

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2}\, dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^y e^{y^2}\, dx \right) dy$$
$$= \int_0^1 y e^{y^2}\, dy = \frac{e-1}{2}.$$

最後は $u = y^2$ と置けば、$du = 2y\, dy$ を使って計算できる。




横の長さは y

対称な領域では、符号の打ち消しを使う

D が y 軸に関して対称で、f は D 上で可積分とする。さらに $f(-x, y) = -f(x, y)$ なら、左右の点の寄与が打ち消し合い、

$$\iint_D f(x, y)\, dx\, dy = 0.$$

例えば円板 $x^2 + y^2 \le 1$ 上の $f(x, y) = x e^{x^2+y^2}$ はこの条件を満たす。領域と被積分関数の両方を確認しよう。



領域を描く→ 外側の変数の範囲を決める→ 切り口の両端を読む→ 積分する。切り口の境界が途中で変わるときは、その位置で領域を分けて足し合わせよう。

補足：ルベーグ積分では、可測集合 D 上の可測関数 f に対し、$\iint_D |f| < \infty$ ならフビニの定理で順序を交換できる。$f \ge 0$ ならトネリの定理が使え、積分値が ∞ でもよい。

演習問題（5題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. **内側の積分。** $I = \displaystyle\int_0^1 \left(\int_0^2 (2x + y)\, dy \right) dx$ を求め、積分順序を交換した式も書け。

2. **三角形の領域。** $D = \{(x, y) : 0 \le y \le x \le 1\}$ を描き、$\iint_D (2x + y)\, dx\, dy$ を2通りの積分順序で計算せよ。

3. **曲線に囲まれた領域。** $D = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$ を描き、横に切ったときの積分範囲を示せ。また、$\iint_D xy\, dx\, dy$ を求めよ。

4. **計算しやすい順序。** $I = \displaystyle\int_0^1 \left(\int_{\sqrt{y}}^1 e^{x^3}\, dx \right) dy$ の領域を描き、積分順序を変えて計算せよ。

5. **直線で囲まれた領域。** $D = \{(x, y) : x \ge 0,\ y \ge 0,\ x + y \le 1\}$ 上の $\iint_D (1 + x)\, dx\, dy$ を求めよ。

第4回　演習問題の解答


各問の被積分関数は対応する有界な閉領域上で連続なので、積分順序を交換できる。

1. **内側の積分。** 内側では x を定数として扱う。逆順では y を定数として扱うので、
$$\int_0^2 (2x+y)\,dy = \left[2xy + \frac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=2} = 4x+2,$$
$$I = \int_0^1 (4x+2)\,dx = \left[2x^2+2x\right]_0^1 = 4,$$
$$I = \int_0^2 \left(\int_0^1 (2x+y)\,dx\right) dy = \int_0^2 (1+y)\,dy = 4.$$

2. **三角形の領域。** D の頂点は $(0,0),(1,0),(1,1)$。縦に切ると $0\le x\le 1,\ 0\le y\le x$、横に切ると $0\le y\le 1,\ y\le x\le 1$ である。
$$\iint_D (2x+y)\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_0^x (2x+y)\,dy\right) dx = \int_0^1 \frac{5}{2}x^2\,dx = \frac{5}{6},$$
$$= \int_0^1 \left(\int_y^1 (2x+y)\,dx\right) dy = \int_0^1 (1+y-2y^2)\,dy = \frac{5}{6}.$$

3. **曲線に囲まれた領域。** $x^2 = x$ より交点は $(0,0),(1,1)$。この間で $x^2\le x$ となる。

   横に切ると、$x\ge 0$ と $x^2\le y\le x$ より $0\le y\le 1,\ y\le x\le \sqrt{y}$ である。
$$\iint_D xy\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{x} xy\,dy\right) dx$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^1 (x^3-x^5)\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{24}.$$



4. **計算しやすい順序。** $0\le y\le 1,\ \sqrt{y}\le x\le 1$ は $0\le x\le 1,\ 0\le y\le x^2$ と同じ領域で、放物線の下側である。内側では e^{x^3} が定数となり、積分区間の長さは x^2 なので、
$$I = \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} e^{x^3}\,dy\right) dx = \int_0^1 x^2 e^{x^3}\,dx = \frac{1}{3}\int_0^1 e^u\,du = \frac{e-1}{3}.$$
   ここで $u = x^3$、$du = 3x^2\,dx$ と置いた。

5. **直線で囲まれた領域。** 頂点は $(0,0),(1,0),(0,1)$ で、$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x$ と表せる。
$$\iint_D (1+x)\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} (1+x)\,dy\right) dx$$
$$= \int_0^1 (1+x)(1-x)\,dx = \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$