第7回　重積分の応用：体積と質量

到達目標：体積・質量・重心を求められる。

上下のグラフに挟まれた立体の体積


$D \subset \mathbb{R}^2$ を有界な積分可能領域、ϕ, ψ を D 上の連続関数、$\phi \le \psi$ とし

$$V = \{(x, y, z) : (x, y) \in D,\ \phi(x, y) \le z \le \psi(x, y)\}$$


とする。各点の柱の高さは $\psi - \phi$ なので

$$\mathrm{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi)\, dx\, dy = \iiint_V 1\, dx\, dy\, dz.$$

上面と下面を入れ替えず、投影領域 D と高さの範囲を先に決める。



2つの曲面に挟まれた立体（模式図）



断面 $y = 0$：$r = |x|$、縦の長さは $2\sqrt{R^2 - r^2}$

例：半径 $R > 0$ の球の体積

$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le R^2\}$ の上で $\psi = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$、$\phi = -\psi$ とすると


$$\begin{aligned}\mathrm{Vol}(V) &= \int_0^{2\pi} \int_0^R 2\sqrt{R^2 - r^2}\, r\, dr\, d\theta \\ &= 4\pi \left[-\frac{1}{3}(R^2 - r^2)^{3/2} \right]_0^R = \frac{4\pi R^3}{3}.\end{aligned}$$

密度を積分して総量を求める

質量密度 $\rho \ge 0$ が与えられ、ρ が V 上可積分なら、質量は

$$M = \iiint_V \rho(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \iint_D \left(\int_{\phi(x,y)}^{\psi(x,y)} \rho(x, y, z)\, dz \right) dx\, dy.$$

密度が一定 ρ_0 なら $M = \rho_0 \,\mathrm{Vol}(V)$。電荷密度・エネルギー密度を積分すれば、それぞれ全電荷・全エネルギーになる。



密度が変わると、同じ体積でも質量が変わる

円柱座標と球面座標の体積要素

円柱座標 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$ では

$$dx\,dy\,dz = r\,dr\,d\theta\,dz.$$

球面座標を $x = s\sin\alpha\cos\theta,\ y = s\sin\alpha\sin\theta,\ z = s\cos\alpha$ （$s \geq 0,\ 0 \leq \alpha \leq \pi,\ 0 \leq \theta < 2\pi$）と定めると

$$dx\,dy\,dz = s^2\sin\alpha\,ds\,d\alpha\,d\theta.$$

円柱・球の対称性に合う座標を選ぶと、領域と被積分関数が簡単になる。

例：円柱の質量と重心


$V = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 2\}$、$\rho = z$ とする。

$$M = \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 zr\,dz\,dr\,d\theta = 2\pi.$$


一般に $M > 0$ の物体の重心は $\bar{x} = M^{-1}\iiint_V x\rho\,dV$ などで定まる。この例では回転対称性から $\bar{x} = \bar{y} = 0$、また

$$\bar{z} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 z^2 r\,dz\,dr\,d\theta = \frac{4}{3}.$$

体積は1を、質量は密度を積分する。座標を変換したら、体積要素のヤコビアンも必ず付ける。



密度 $\rho = z$ の重心は中央より上



球面座標の α は $+z$ 軸から測る

演習問題（6題）

積分範囲と計算過程を書こう。体積の割合や重心の位置にも注目しよう。

1. 底面が正方形で、天井が傾いた立体 $V = \{(x,y,z) : 0 \leq x, y \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1 + x\}$ の体積を重積分で求めよ。

2. 丸い山の形をした立体 $V = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}$ の体積を求めよ。半径1・高さ1の円柱の体積の何倍か。

3. 円すい $V = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1 - \sqrt{x^2 + y^2}\}$ の体積を円柱座標で求めよ。問2の立体と比べ、どちらの体積が大きいか。

4. 円柱 $V = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1\}$ の密度を $\rho = 1 + z$ とする。質量 M と重心の高さ $\bar{z}$ を求め、中央の高さ $1/2$ からのずれを計算せよ。

5. 半径1の球から、同じ中心の半径 $1/2$ の球をくり抜く。残った部分の体積を球面座標で求めよ。もとの球の体積の何倍が残るか。

6. 球 $V = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ の密度を $\rho = x^2 + y^2 + z^2$ とする。質量を球面座標で求めよ。同じ球で密度が一様に1の場合の質量の何倍か。