第6回　演習問題の解答

演習1：偏りのあるコイントスの標準化

独立な X_j が $P(X_j = 1) = p$、$P(X_j = -1) = 1 - p$（$0 < p < 1$）を満たし、$S_n = \sum_{j=1}^{n} X_j$ とする。$X_j^2 = 1$ より

$$\mathbb{E}[X_j] = p - (1-p) = 2p - 1, \qquad \mathrm{Var}(X_j) = 1 - (2p-1)^2 = 4p(1-p).$$

期待値の線形性と独立性から

$$\mathbb{E}[S_n] = n(2p-1), \qquad \mathrm{Var}(S_n) = 4np(1-p).$$

したがって、$Z_n := (S_n - n(2p-1))/(2\sqrt{np(1-p)})$ とおけば

$$\mathbb{E}[Z_n] = \frac{\mathbb{E}[S_n] - n(2p-1)}{2\sqrt{np(1-p)}} = 0, \qquad \mathrm{Var}(Z_n) = \frac{\mathrm{Var}(S_n)}{4np(1-p)} = 1.$$

演習2：表と裏の対称性と正の和の確率

公平なコインを独立に $2m$ 回投げる（$m \geq 1$ は整数）。表と裏をすべて入れ替える対応は、各結果の確率を変えずに S_{2m} の符号を反転する。よって $P(S_{2m} > 0) = P(S_{2m} < 0)$ であり、

$$1 = P(S_{2m} > 0) + P(S_{2m} = 0) + P(S_{2m} < 0) = 2P(S_{2m} > 0) + P(S_{2m} = 0).$$

$S_{2m} = 0$ となるのは、表と裏がちょうど m 回ずつ出る場合である。全結果は 2^{2m} 通りで等確率、表の出る位置の選び方は $\binom{2m}{m}$ 通りなので

$$P(S_{2m} = 0) = \binom{2m}{m} 2^{-2m}.$$

したがって

$$P(S_{2m} > 0) = \frac{1}{2}\left(1 - \binom{2m}{m} 2^{-2m}\right).$$

第7回　分布と特性関数

分布を振動関数の期待値で表すと、独立な和は積になる。特性関数は常に存在し、分布の一意性と極限の判定に使える。

特性関数の定義と基本性質

実数値確率変数 X の特性関数を、$i^2=-1$ として

$$\varphi_X(t) := \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\,\mu_X(dx) \qquad (t\in\mathbb{R})$$

と定める。複素数値の期待値は実部と虚部に分けて定義する。$|e^{itX}|=1$ より、X が可積分でなくても存在し、

$$\varphi_X(0)=1, \qquad |\varphi_X(t)|\le 1, \qquad \varphi_X(-t)=\overline{\varphi_X(t)}.$$

$t_n\to t$ なら、優収束定理によって $\varphi_X(t_n)\to\varphi_X(t)$。また $a,b\in\mathbb{R}$ に対し $\varphi_{aX+b}(t)=e^{itb}\varphi_X(at)$ である。

代表的な分布の特性関数

分布	特性関数 $\varphi_X(t)$
$\mathrm{Bern}(p)$	$1-p+pe^{it}$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	$(1-p+pe^{it})^n$
$\mathrm{Poi}(\lambda)$	$\exp(\lambda(e^{it}-1))$
$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\lambda/(\lambda-it)$
$N(m,\sigma^2)$	$\exp(imt-\sigma^2t^2/2)$

たとえばポアソン分布では、指数関数の級数から

$$\varphi_X(t)=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^{it})^k}{k!}=\exp(\lambda(e^{it}-1)).$$

独立な和を積に直す

独立な X,Y に対し、e^{itX},e^{itY} も独立で有界なので

$$\varphi_{X+Y}(t)=\mathbb{E}[e^{itX}e^{itY}]=\varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

独立な $X\sim\mathrm{Poi}(\lambda)$、$Y\sim\mathrm{Poi}(\mu)$ なら

$$\varphi_{X+Y}(t)=\exp((\lambda+\mu)(e^{it}-1))$$

となる。次ページの一意性定理により、$X+Y\sim\mathrm{Poi}(\lambda+\mu)$ と分かる。和の分布の計算を、関数の積と既知の形の比較へ置き換えられる。

Fourier 変換と Gauss 核による正則化

可積分な関数 f の Fourier 変換を

$$\widehat{f}(t) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-itx}\, dx$$

と定める。$f \in C_c(\mathbb{R})$（コンパクトな台をもつ連続関数）でも、$\widehat{f}$ が可積分とは限らない。そのため逆変換には条件が必要となる。

$$q_\varepsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\varepsilon} e^{-x^2/(2\varepsilon^2)}, \qquad \widehat{q_\varepsilon}(t) = e^{-\varepsilon^2 t^2/2} \quad (\varepsilon > 0)$$

を使って平滑化すると、Fubini の定理により

$$(f * q_\varepsilon)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t) e^{-\varepsilon^2 t^2/2} e^{itx}\, dt, \qquad (f * q_\varepsilon)(x) := \int_{\mathbb{R}} f(x-y) q_\varepsilon(y)\, dy.$$

$\varepsilon \downarrow 0$ で $f * q_\varepsilon \to f$ は一様収束する。$\widehat{f} \in L^1$ も仮定すれば、優収束定理により Gauss 因子を外せる。

特性関数は分布を一意に決める

上の式を期待値に入れると

$$\mathbb{E}[(f * q_\varepsilon)(X)] = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t) e^{-\varepsilon^2 t^2/2} \varphi_X(t)\, dt.$$

$\varphi_X = \varphi_Y$ なら平滑化した期待値が一致し、$\varepsilon \downarrow 0$ で $\mathbb{E}[f(X)] = \mathbb{E}[f(Y)]$（すべての $f \in C_c(\mathbb{R})$）となる。この積分の一致は $\mu_X = \mu_Y$ を意味する。開区間の指示関数を下から連続関数で近似し、測度の一意性を使えばよい。

特性関数による収束の判定

分布収束 $X_n \Rightarrow X$ とは、任意の有界連続関数 f に対して $\mathbb{E}[f(X_n)] \to \mathbb{E}[f(X)]$ となることである。Lévy の連続性定理は

$$X_n \Rightarrow X \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t) \quad (\forall t \in \mathbb{R})$$

を与える。さらに点ごとの極限 φ が原点で連続なら、それ自身がある確率分布の特性関数となる。分布収束とこの条件の役割は第9回で詳しく扱う。

モーメントが有限なら原点で微分できる

$\mathbb{E}|X| < \infty$ なら $\varphi_X'(0) = i\mathbb{E}[X]$。$\mathbb{E}[X^2] < \infty$ なら $\varphi_X''(0) = -\mathbb{E}[X^2]$ であり、

$$\varphi_X(t) = 1 + it\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2] + o(t^2).$$

この展開と独立な和の積公式が、一般の中心極限定理の証明の出発点になる。

演習問題

1. $X \sim \mathrm{Geo}(p)$（$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$、$k \geq 1$）の特性関数を求めよ。
2. $X \sim \mathrm{U}(-a, a)$（$a>0$）の特性関数を求め、$t=0$ における値と連続性を示せ。

レポート問題

1. $X \sim N(m, \sigma^2)$（$m \in \mathbb{R}$、$\sigma>0$）とする。特性関数 $\varphi_X(t)=\exp(imt-\sigma^2 t^2/2)$（$t \in \mathbb{R}$）を、授業で扱った方法とは異なる方法で導け。用いた方法と計算過程を明記せよ。
2. 実数値確率変数 X について、X の分布が原点対称であること（X と $-X$ が同じ分布をもつこと）と、すべての $t \in \mathbb{R}$ で $\varphi_X(t) \in \mathbb{R}$ となることが同値であることを示せ。ヒント：特性関数の一意性定理を用いてよい。

考えるための手がかり

離散分布では期待値を和に、密度をもつ分布では積分に書き換えて計算しよう。一様分布では $t=0$ を別に扱い、得られた式の極限と一致することを確認する。原点対称性の問題では、$\varphi_{-X}(t)=\varphi_X(-t)=\overline{\varphi_X(t)}$ と特性関数の一意性を組み合わせよう。


解答メモ：特性関数の定義、原点での連続性、分布の一意性を確認する。


コラム　分布の指紋

平均と分散は、分布の特徴を二つの数に要約する。特性関数は分布全体の情報を保ち、さらに独立な和の計算を積に変える。その働きをコインで見てみよう。

平均と分散が同じでも、出やすい範囲は違う

公平な符号 $P(R=-1)=P(R=1)=1/2$ と標準正規変数 $G\sim N(0,1)$ は、ともに平均 0、分散 1。それでも $P(|R|<1/2)=0$ だが、$P(|G|<1/2)>0$ である。平均と分散だけでは、この違いを捉えられない。






中央の帯 $(-1/2,1/2)$：左に確率はなく、右には正の面積がある。


値を矢印に変えると、分布全体を記録できる

e^{itx} は長さ 1、角度 tx の矢印。特性関数 $\varphi_X(t)=\mathbb{E}[e^{itX}]$ は、その先端を確率で重み付けして平均した点である。コインでは二つの先端の中点となり、

$$\varphi_R(t)=\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}=\cos t,\qquad \varphi_G(t)=e^{-t^2/2}.$$



青緑は矢印の平均。



同じ平均・分散でも、波形は異なる。

t を変えると、矢印の打ち消し合い方の違いが現れる。$t=\pi$ でコインは -1、正規分布は約 0.0072 となり、二つを区別できる。一つの t の値だけで分布は決まらないが、すべての t で特性関数が一致すれば分布も一致する。これが「分布の指紋」と呼べる理由である。

指紋を使えば、和の分布も読み取れる

独立な公平な符号 R_1,R_2 を足してみよう。特性関数では、独立な和が積になる。

$$\begin{aligned}\varphi_{R_1+R_2}(t)&=\varphi_{R_1}(t)\varphi_{R_2}(t)=\cos^2 t\\&=\frac{1}{4}e^{-2it}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}e^{2it}.\end{aligned}$$

右辺は $-2,0,2$ に確率 $1/4,1/2,1/4$ を置いた分布の特性関数である。一意性から、これが R_1+R_2 の分布だと分かる。多くの独立な変数の和にも、この「積を計算し、分布を同定する」方法が使える。

特性関数は、分布を見分けるための全情報を保ち、独立な足し算を積に置き換える。