1. 質量
    1. 質量 是 空間 變形、形變、應變 的 顯性特徵、現象。
        1. 散度 向內 是 重力 現象。
        2. 散度 向外 是 反重力 現象。
        3. 旋度 是 自旋、自轉 現象。
    2. 明顯例子，彈簧。
        1. 動能個體的 存在、變化 會 產生，彈簧 變形、形變、應變 現象。
            1. 彈簧 有 變形，會 產生 動能個體 之間，相互 接近、遠離 的 現象。
                1. 原因很明顯，彈簧 是 彈性體、連續體。
                1. 彈簧的每一個部分 相互連接。
                2. 彈簧的每一個部分 會互相 拉扯、推擠。
                3. 彈簧的每一個部分 有 拘束性、關聯性、相依性。
                2. <?1>個體 有機率產生 動能個體之間 有 引力、斥力 的 錯覺。
                3. 動能個體 位移 越快，該現象 越明顯。
                4. 動能個體 振幅 越大，該現象 越明顯。
            2. 動能個體的 傳遞方式 是 彈簧整體的形變、彈簧的彈性特性、力學。
                1. 彈簧整體的形變，有機率影響 電能個體的 位置、狀態、一切。
        2. 假定，該彈簧 沒有 壓電材料。
            1. 電能個體的 存在、變化 不會 產生，彈簧 變形、形變、應變 現象。
                1. 彈簧 沒有 變形，不會 產生 電能個體 之間，相互 接近、遠離 的 現象。

2. 電能個體的 傳遞方式 是 彈簧內部的電荷、彈簧的導電特性、電學。
3. 彈簧 ↔ 空間。
    1. 動能個體 ↔ 力、（人類認定的）有質量的個體。
    2. 電能個體 ↔ 光、（人類認定的）無質量的個體。
3. 假定，該彈簧 有 壓電材料。
    1. 電能個體的 存在、變化 會 產生，彈簧 變形、形變、應變 現象。
        1. 彈簧 有 變形，會 產生 電能個體 之間，相互接近、遠離 的 現象。
            1. <?1>個體 有機率產生 電能個體之間 有 引力、斥力 的 錯覺。
            2. 電能個體 位移 越快，該現象 越明顯。
            3. 電能個體 振幅 越大，該現象 越明顯。
    2. 電能個體的 傳遞方式 是 彈簧內部的電荷、彈簧的導電特性、電學、彈簧整體的形變。
        1. 彈簧整體的形變，有機率影響 電能個體的 位置、狀態、一切。
    3. 彈簧 ↔ 空間。
        1. 沒有 壓電材料 的部分。
            1. 動能個體 ↔ 力、（人類認定的）有質量的個體。
                1. 有質量的個體 伴隨著 力，出現。（產生 形變、應變 現象）
            2. 電能個體 ↔ 光、（人類認定的）無質量的個體。
                1. 光、力 不會 相生相滅。

    2. 有 壓電材料 的部分。
        1. 動能個體 ↔ 力、光、（人類認定的）有質量的個體。
        2. 電能個體 ↔ 力、光、（人類認定的）有質量的個體。
            1. 光、力 會 相生相滅。
                1. 光 伴隨著 力，出現。
                2. 力 伴隨著 光，出現。
4. 彈簧 是 <?2>個體。
    1. 力、光 是 <?1>個體。
    2. 假定，某一特定動能個體 是 <?0>個體。
    3. 假定，某一特定電能個體 是 <?0>個體。
    4. 彈簧 ↔ 空間。
        1. 彈簧 直接蘊含 力 ↔ 空間個體 直接蘊含（人類認定的）有質量的<?2>個體。
            1. 力 存在、變化 會 產生，彈簧 變形、形變、應變 現象。
            2. 有質量的<?2>個體 存在、變化 會 產生，空間 變形、形變、應變 現象。
        2. 彈簧 直接蘊含 光 ↔ 空間個體 直接蘊含（人類認定的）無質量的<?2>個體。
            1. 假定，沒有 壓電材料。
            2. 光 存在、變化 不會 產生，彈簧 變形、形變、應變 現象。
            3. 無質量的<?2>個體 存在、變化 不會 產生，空間 變形、形變、應變 現象。
        3. 彈簧 直接蘊含 該某一特定動能個體 ↔ 空間個體 直接蘊含 力。

        1. 該某一特定動能個體 存在、變化 會 產生，彈簧 變形、形變、應變 現象。
        2. 力 存在、變化 會 產生，空間 變形、形變、應變 現象。
    4. 彈簧 直接蘊含 該某一特定電能個體 ↔ 空間個體 直接蘊含 光。
        1. 假定，沒有 壓電材料。
        2. 該某一特定電能個體 存在、變化 不會 產生，彈簧 變形、形變、應變 現象。
        3. 光 存在、變化 不會 產生，空間 變形、形變、應變 現象。
5. <?a>個體 是 絕緣體型個體、電阻型個體、電容型個體、電感型個體、超導體型個體。
    1. n >= a >= u。
    2. 明顯例子，空間 是 <?3>個體。
3. 某一特定空間個體 蘊含 <?2>個體。
    1. 假定，該<?2>個體 是 動能型個體。
        1. 該<?2>個體的 存在、變化 會 產生，空間個體 變形、行變、應變 現象。
    2. 該<?2>個體的 速度 越快，空間個體受到的 衝量 越大，空間個體 被壓縮 越緊。
        1. 空間個體 被壓縮 越緊，該空間個體的 空間節點密度 越大。
            1. 其他<?2>個體 有機率認定，該<?2>個體的 質量 越大。
        2. 質量 不是 本質。
            1. 質量 是 現象、投影、假想體。
                1. 假想體的 明顯例子，科氏力。

2. 質量 是 空間 變形、形變、應變 的 投影、映射、顯性特徵。
3. 質量 是 空間節點密度的 投影、映射、顯性特徵。
    1. 該其他<?2>個體 有機率 本能、傳承 不夠高，觀測不到 空間、空間節點密度。
    2. 相同的 空間節點密度 有 相同的 質量。
        1. 假定，兩個 空間個體 在 自然狀態，空間節點 分布 相同。
        2. 相同的（空間）變形、形變、應變，兩個 空間個體的 空間節點密度 相同。
            1. 假定，第一個<?2>個體 在 第一個空間個體的 中心位置。
            2. 假定，第二個<?2>個體 在 第二個空間個體的 中心位置。
            3. 第一個、第二個 <?2>個體 的 質量相同。
                1. 假定，第一個空間個體 蘊含的力 是 F1。
                2. 假定，第一個<?2>個體 蘊含的力 是 f1。
                3. 假定，第二個空間個體 蘊含的力 是 F2。
                4. 假定，第二個<?2>個體 蘊含的力 是 F2。
                5. 假定，（F1 + f1）產生的 變形 =（ F2 + f2）產生的 變形。
                6. 第一個、第二個 空間個體的 空間節點密度 相同。

        7. 第一個、第二個 <?2>個體 的 質量 相同。
        8. 即便，f1、f2 不相等。
    3. 假定，硬度，第一個空間個體 更硬於 第二個空間個體。
        1. 硬度 是 材料特性的 硬度。
    4. 相同的 空間節點密度，所需的力，第一個空間個體 更大於 第二個空間個體。
        1. 已知，兩個 空間個體 在 自然狀態，空間節點 分布 相同。
        2. 相同的 空間節點密度，（空間）變形、形變、應變 相同。
    5. 力 越大，空間節點密度 越高，<?2>個體 傳遞 越慢，<?2>個體 質量 越大。
        1. F = m * a。
            1. F 是 力、常態力。
            2. 力 越大，空間的 變形、形變、應變 越大。
    6. <?2>個體 速度 越快，空間節點密度 越高，<?2>個體 質量 越大。
        1. P = m * v。
            1. P 是 衝量、瞬態力。
            2. 力 越大，空間的 變形、形變、應變 越大。
3. 空間節點密度 越高，質量 越大，萬有引力 越大。
    1. 即便，該空間個體 沒有 蘊含 <?2>個體。
    2. 即便，該空間個體 直接蘊含 <?1>個體。

        4. 不同的 空間個體 有機率有 不同的 節點密度、彈性係數、導電係數、材料特性。
            1. 明顯例子，不同的 彈簧 在 自然狀態，有機率有 不同的 疏密度、自然頻率。
            2. 明顯例子，不同的 彈簧 被施加 相同的 外力，有機率有 不同的 疏密度。
            3. 明顯例子，不同的 彈簧 有機率有 不同的 彈性係數、導電係數、材料特性。
4. 變形 與 移動
    1. 明顯例子，彈簧。
        1. 彈簧 其中一端 固定。
            1. 施加外力 在 彈簧 沒有固定的另一端。
                1. 彈簧變形。
                2. F = k * x。
                    1. F 是 該外力。
        2. 彈簧 沒有 固定。
            1. 施加外力 在 彈簧的 其中一端。
                1. 彈簧變形、彈簧移動。
                2. F = m * a。
                    1. F 是 該外力。
        3. 彈簧 施加 第一個外力 在 彈簧的 其中一端。
            1. 施加 第二個外力 在 彈簧的 另一端。
                1. 假定，彈簧 其中一端 固定。
                    1. 彈簧變形。
                2. 假定，彈簧 其中一端、另一端 都 沒有 固定。
                    1. 彈簧變形、彈簧移動。

3. F = 彈簧的某一特定材料特性 * 其中一端疏密度 * 另一端疏密度 /（距離^2）
    1. F 是 該其中一端、該另一端 之間的 相對力、相差力、力勢。
        1. 假定，彈簧的材料特性 是 均勻分布。
        2. 假定，第一個外力 是 某一特定常數。
        3. 假定，第二個外力 是 某一特定常數。
        4. 假定，外力，第一個外力 大於 第二個外力。
        5. 變形、形變、應變，該其中一端 大於 該另一端。
    2. F 是 以 該其中一端 為 零點，該另一端 感受到的 力。
    3. F 是 以 該另一端 為 零點，該其中一端 感受到的 力。
        1. 零點 是 坐標系零點、假想支點、假想固定點。
    4. 抽象例子，電位勢 ↔ 力勢。
        1. 直流電壓源 電位勢 ↔ 力勢。（交流電壓源 ↔ 會週期性變化的力勢）
            1. 直流電壓源 正極 ↔ 該其中一端 外力。
            2. 直流電壓源 負極 ↔ 該另一端 外力。

2. 假定，直流電壓源 正極、負極 不會 移動。
    1. 直流電壓源 內部，化學能，電荷 從 負極 流向 正極。
3. 假定，直流電壓源 正極、負極 會 移動。
    1. 假定，直流電壓源 形成 磁場。
        1. 化學能 產生 電荷移動。
        2. 電荷移動 產生 電流。
        3. 電流 產生 磁場。
    2. 直流電壓源 內部，磁場，正極、負極 互相 吸引、接近、縮短距離。
4. 假定，直流電壓源 正極、負極 會 移動。
    1. 假定，直流電壓源 形成 磁場。
    2. 假定，有 兩個 直流電壓源。
    3. 兩個 直流電壓源，正極、負極 互相 吸引。
    4. 兩個 直流電壓源，正極 互相 排斥。
    5. 兩個 直流電壓源，負極 互相 排斥。

5. 力 有機率產生 質量 現象。
    1. 力的 質量 = 力 / 力的加速度。
        1. 力（本身）的 質量 = 力（本身）/ 力（本身）的加速度。
        2. m = F / a。

        1. F = m * a。
6. 光、電磁波 有機率產生 質量 現象。
    1. 電磁波 頻率 越高，空間個體的 變形、形變、應變 越明顯。
        1. 電磁波頻率 越高，某一特定空間的 電磁波密度 越高。
            1. 某一特定空間 的 明顯例子，單位空間、普朗克空間、宇宙胞空間。
        2. 明顯例子，光電效應。
            1. 已知，W = h * f - E。
            2. 已知，E = m * c^2。
                1. m = E / (c ^ 2)。
            3. W = h * f - m * c^2。
            4. m * c^2 = h * f - W。
            5. m = (h * f - W) / (c ^ 2) 。
                1. m 是 光、電磁波 的 質量。
                2. h 是 普朗克常數。
                3. f 是 光、電磁波 的 頻率。
                4. W 是 逸出功。
                5. c 是 光、電磁波 的 速度。
            6. 假定，W = 0。
            7. m = (h * f) / (c ^ 2) 。
        3. E = P * c。
            1. P = E / c。
        4. F = P / t。
            1. 力 = 能量 / 時間。
            2. 力 =（光的能量 / c）/ 時間。
            3. 已知，W = h * f - E。

    4. 假定，W = 0。
    5. 力 =（h * f / c）/ 時間。
        1. f / 時間 = 光的頻率變化。
    6. 力 = 光的頻率變化 * h / c。
2. 電磁波 頻率 越高，（存在 /（存在 + 變化））越大。
    1. 存在 是 電磁波 本身、蘊含的宗量、靜態。

        1. 存在 是 電磁波（存在）（本身）蘊含的 宗量。
    2. 變化 是 變化、變化變化、變化變化變化、變化變化變化變化、變化變化變化變化。
        1. 變化 是 電磁波變化（本身）蘊含的 宗量。
    3. 某一特定個體 存在 越小，該個體 受到 內在物質、內在機制、交互作用 的 影響 越大。
        1. 交互作用 是 該個體、其他個體 之間的 交互作用。
    4. （存在 /（存在 + 變化））越大，該電磁波 被 光痕影響 越隱晦。
        1. 隱晦 是 不明顯。
        2. 該電磁波 影響 空間個體的 變形、形變、應變 越明顯。
        3. 該電磁波的 質量 現象 越明顯。
3. （存在 + 變化）越大，空間個體的 變形、形變、應變 現象 越明顯。
    1. 某一特定個體的 衝量、力 ↔ 空間個體的 幾何形狀。
        1. 該某一特定個體 有機率是 該空間個體（自己）。
        2. 該某一特定個體 有機率是 其他<?a>個體。

    1. n >= a >= u。
  3. 衝量、力 存在、變化 ↔ 幾何形狀 存在、變化。
    1. 幾何形狀 存在 是 該空間個體（的 幾何形狀）本身。
    2. 幾何形狀 變化 是 該空間個體（的 幾何形狀）變形、形變、應變。
2. 存在 大 的 明顯例子，力、空間個體的形變現象（本身）。
  1. F。
    1. F 是 力。
    2. 某一特定空間個體 直接蘊含 該力。
      1. 該力 越大，該空間個體的 變形、形變、應變 現象 越明顯。
    3. <?2>個體 有機率認定 該空間個體 不可能直接蘊含 該力。
      1. <?2>個體 有機率認定 該空間個體 不可能 無中生有 該力。
      2. <?2>個體 有機率認定 該力 不是 力。
      3. <?2>個體 有機率認定 該力 是 暗能量。
      4. 明顯例子，某一特定人類個體 無中生有動能個體 的現象。
        1. 該現象 讓 該人類個體的 手臂 舉起來。
        2. 細胞個體 有機率認定，該人類個體不可能 無中生有 該動能個體。
          1. 該細胞個體 是 該人類個體的某一特定細胞個體。

        3. 該細胞個體 有機率認定 該動能個體 是 暗能量。
    2. 空間個體的形變現象（本身）。
        1. 明顯例子，幾何形狀 自然而然、理所當然 產生 力。
            1. 幾何形狀 是 某一特定空間個體的 幾何形狀。
            2. 幾何形狀 是 幾何形狀（本身）。
            3. 幾何形狀 是 幾何形狀（存在）。
        2. 明顯例子，幾何形狀 自然而然、理所當然 產生 質量 現象。
3. 變化 大 的 明顯例子，速度、加速度、加加速度、空間個體的形變變化現象（本身）。
    1. P = m * v。
        1. P 是 衝量、瞬態力。
            1. m 是 質量。
            2. v 是 速度。
        2. E = m * c^2。
            1. v = c^2。
        3. 某一特定空間個體 直接蘊含 某一特定<?2>個體。
            1. 該<?2>個體的 速度 越大，該空間個體 感受到的 衝量 越大。
                1. 衝量 越大，該空間個體的 變形、形變、應變 現象 越明顯。
    2. F = m * a。
        1. F 是 力、常態力。
            1. m 是 質量。

        2. a 是 加速度。
    2. 某一特定空間個體 直接蘊含 某一特定<?2>個體。
        1. 該<?2>個體的 加速度 越大，該空間個體 感受到的 力 越大。
        2. 力 越大，該空間個體的 變形、形變、應變 現象 越明顯。
3. 空間個體的形變變化現象（本身）。
    1. 變化 是 變化、變化變化、變化變化變化、變化變化變化變化。
    2. 明顯例子，幾何形狀 變化 自然而然、理所當然 產生 衝量、力。
        1. 幾何形狀 變化 的 明顯例子，收縮、擴張、扭曲、旋轉、公轉、自轉、螺旋。
        2. 明顯例子，人類個體的肌肉個體 變化，自然而然、理所當然 產生 衝量、力。
        3. 明顯例子，打槌球，該人類個體的肌肉個體 變化，產生 衝量、力 揮動球桿。

7. 光、電磁波 有機率 產生 粒子 現象。
    1. 電磁波 頻率 越高，粒子的 輪廓 越明顯。
        1. 粒子的 輪廓 越明顯，粒子的 現象 越明顯。
        2. 電磁波 頻率 越高，（存在 /（存在 + 變化））越大。
            1. （存在 /（存在 + 變化））越大，該電磁波被 光痕影響 越隱晦。
    2. 電磁波 頻率 越高，波的 輪廓 越隱晦。
        1. 波的 輪廓 越不明顯，波的 現象 越不明顯。
        2. 電磁波 頻率 越高，（存在 /（存在 + 變化））越小。

        1. （存在 /（存在 + 變化））越小，該電磁波被 光痕影響 越明顯。
    3. 明顯例子，某一特定型號的飛機 在 空中 飛行。
        1. 該飛機的 質量 越大，受到其他飛機的 渦流影響越低。
        2. 飛機 ↔ 光、電磁波。
            1. 空中 ↔ <?3>個體中。
            2. 飛行 ↔ 運動、感測、交互作用。
            3. 質量 ↔ 頻率、單位空間的電磁波密度。
            4. 其他飛機 ↔ 其他 光、電磁波、個體。
            5. 渦流 ↔ 光痕。
8. 質量的 本質 是 空間節點密度。
    1. 反重力、反萬有引力。
        1. 形變、變形、應變 空間個體，達到 反重力、反萬有引力。
        2. 明顯例子，假定，某一特定行星個體 造成 空間 產生 45 度的斜坡。
            1. 45 度 的 明顯例子，空間節點密度 沿著 45 度變化。
                1. 距離 該行星個體 越近，空間節點密度 越高。
                2. 抽象例子，散度。
            2. 某一特定個體 有機率沿著 45 度的 斜坡 往下滑。
                1. 往下滑 是 往 空間節點密度 更高的 方向，滑動、位移、移動。
                1. 向量。

2. 抽象例子，假定，某一特定電路 是 兩個電阻並聯的電路。
    1. 假定，R1 > R2。
        1. R1 是 第一個電阻的電阻值。
        2. R2 是 第二個電阻的電阻值。
    2. I1 < I2。
        1. I1 是 第一個電阻的電流值。
        2. I2 是 第二個電阻的電流值。
        3. V = I * R。
    3. 電荷 往 低電阻的 電線 移動。
        1. I = q / t。
            1. q 是 電荷數量。
            2. t 是 時間。
        2. 電阻值 越低，單位時間的 電荷越多。
    4. 空間節點密度 越高 ↔ 電線 越寬。
        1. 電線 越寬，電阻值 越低。
        2. 原因很明顯，空間節點密度 越高，能 包覆更多（空間個體的）雜質。
            1. 包覆 不是 蘊含。
            2. 明顯例子，人類個體 包覆細胞個體。
            3. 明顯例子，人類個體 蘊含動能個體。
            4. 空間節點密度 是 空間個體的 密度。
            5. 空間個體 是 <?3>個體。

6. （空間個體的）雜質 是 <?3>個體。

3. 假定，該個體 反重力、反萬有引力。
    1. 該個體 在 空間 產生 0度的平面、均勻空間節點密度。
    2. 該個體 有機率在 空間 產生 任意角度、任意空間節點密度。
    3. 該個體 有機率 有重力、無重力。
        1. 有重力 是 不是 0度的平面 的 現象。
        2. 有重力 是 不均勻 空間節點密度的 分布 的 現象。
        3. 無重力 是 0度的平面、均勻空間節點密度。
        4. 反重力 是 有重力。
        5. 反重力 是 不同於 該行星個體 產生的空間角度、空間節點密度的分布。
        6. 明顯例子，飛行器（本身）、表層、外部的周遭環境 反重力。
            1. 飛行器 內部 正常重力。

2. 消除 質量。
    1. 質量 是 空間節點密度 不均勻的 現象。
        1. 某一特定個體 產生的 空間節點密度 越高，該個體的 質量 越高。
            1. 某一特定個體 是 該個體 本身、存在（本身）、變化（本身）。
            2. 產生 是 造成。
    2. 消除 質量 是 均勻 空間節點密度。

1. 達到 均勻 的方法 的 明顯例子，拉平、壓平、攤平。
    1. 明顯例子，曲線引擎。
2. 某一特定個體 產生的 空間節點密度 越均勻於周遭環境，該個體 越 反重力。
    1. 抽象例子，均勻壓拉的紙（平整的紙）、變色龍、匿蹤戰機。
3. 該個體 產生的 空間節點密度 越接近 空間個體的 自然狀態，該個體的 質量 越低。
    1. 空間個體 在 不同部位，有機率有 不同的自然狀態。
        1. 自然狀態 是 沒有 外力、應力 作用的材料特性、幾何形狀、空間節點密度。
    2. 在 進入、到達 之前，該個體 要先 感測該空間部位的 材料特性、幾何形狀。
        1. 該個體 一邊移動、一邊均勻空間節點密度。
        2. 該個體 維持 相同的 空間節點密度 是反重力。
            1. 相同 是 空間節點密度，該個體進入之前、該個體進入之後 相同。
            2. 反重力 不是 消除 質量。
        3. 該個體 產生 接近 空間個體的 自然狀態，是 消除 質量。
            1. 假定，空間個體 沒有 形變、變形、應變 現象。
                1. 沒有 質量。
            2. 假定，該個體（本身）產生，空間個體 有 形變、變形、應變 現象。

        1. 該個體 有 質量。
    3. 假定，該個體 施加宗量 產生，空間個體 沒有 形變、變形、應變 現象。
        1. 宗量 的 明顯例子，外力。
        2. 該個體 沒有 質量。
        3. 該個體 消除 質量。
3. 明顯例子，假定，某一特定變色龍個體 在進入、到達 之前。
    1. 該變色龍個體 感測 周遭 顏色。
    2. 該變色龍個體 感測到 即將、下一瞬間進入、到達（周遭環境）的 顏色。
    3. 該變色龍個體 有機率 一邊移動、一邊變色。
    4. 該變色龍個體 有機率完全匿蹤。
    5. 完全匿蹤，該變色龍個體 感測越廣、變色越快，能夠移動的速度 上限 越高。
    6. 顏色 ↔ 材料特性、幾何形狀、空間節點密度。
4. 假定，某一特定空間個體 在 自然狀態 是 均勻分布。
    1. 假定，該空間個體 蘊含 某一特定個體。
    2. 假定，該個體 產生、造成，該空間個體 有形變、變形、應變。
        1. 該個體 有 質量。
    3. 假定，該個體 產生、造成，該空間個體 沒有 形變、變形、應變。
        1. 該個體 沒有 質量。

        2. 該個體 消除 質量。
        3. 該空間個體 恢復到 自然狀態、均勻分布。
3. 消除 慣性。
    1. 消除 慣性 是 消除 質量。
    2. P = m * v。
        1. P 是 慣性衝量。
        2. m 是 質量。
        3. v 是 慣性速度。
        4. （人類 認定的）慣性 是 慣性衝量。
        5. 質量 越低，慣性 越小。
        6. 假定，m = 0。
            1. P = 0。
        7. 假定，消除 質量。
            1. 消除 慣性。
    3. 消除質量的 工具，要 設置 多重、多個、緊急 安全裝置。
        1. 原因很明顯，假定，某一特定個體 消除質量的工具 失控。
            1. 該個體 有機率 墜毀、崩塌、自滅。
9. 明顯例子。
    1. 銀河系、太陽系 ↔ <?3>個體的 變化 形成的 漩渦、幾何形狀。
        1. <?2>個體的 存在、變化，讓 <?3>個體 形成的 漩渦、幾何形狀。
        2. <?3>個體的 變化 形成的 漩渦、幾何形狀，讓 <?2>個體 存在、變化。
            1. 抽象例子，雞生蛋，蛋生雞。

2. 黑洞、太陽、地球 ↔ <?3>個體 蘊含的 <?2>個體。
    1. 黑洞、太陽、地球 ↔ <?3>個體 蘊含的 <?2>個體的 散度、旋度。
    2. 黑洞、太陽、地球 ↔ <?3>個體的 變化 形成的 漩渦 蘊含的 <?2>個體的 散度、旋度。
3. 抽象例子，牛頓的 水桶實驗。
    1. （水桶實驗 的 描述在 能量、儲量 文件群的 光）

10. 明顯例子。
    1. 漩渦結構 ↔ 海洋的 變化 形成的 漩渦、幾何形狀。
        1. 力的 存在、變化，讓 海洋 形成的 漩渦、幾何形狀。
        2. 海洋的 變化 形成的 漩渦、幾何形狀，讓 力 存在、變化。
    2. 低水壓區 ↔ 海洋 蘊含的 力。
        1. 低水壓區 ↔ 海洋 蘊含的 力的 散度、旋度。
        2. 低水壓區 ↔ 海洋的 變化 形成的 漩渦、幾何形狀 蘊含的 力的 散度、旋度。
            1. 低水壓區 ↔ 低密度區。
            2. 低水壓區 ↔ 低<?2>壓區。
            3. 低<?2>壓區 ↔ 低<?a>壓區。
            4. 低<?a>壓區 ↔ 低<?3>壓區。
            5. 低<?3>壓區 ↔ 黑洞、太陽、地球。
                1. 低<?3>壓區 ↔ <?2>肉質層、<?2>肉質層個體。
                1. <?2>肉質層個體 不是 <?2>意識層個體。
                2. <?2>意識層個體 不是 <?2>肉質層個體。
            6. 高<?3>壓區、平均<?3>壓區 ↔（人類認定的）空無一物的 外太空。

7. 高<?3>壓區、平均<?3>壓區 ↔ 高密度區、平均密度區。
    1. 高<?3>壓區的 壓力 越高，<?2>肉質層個體越難以 接近、到達、進入。
    2. <?2>肉質層個體 有機率 沒有、不會、無法意識到 高<?3>壓區的 存在、變化。
        1. 意識到 是 感知到、感受到、偵測到、注意到、感測到、觀測到、認知到。
    3. <?2>肉質層個體 有機率被 高<?3>壓區 瞬間、逐漸、不可逆 傷害、殲滅、滅絕。
    4. 假定，<?2>肉質層個體的 本能、傳承 夠高，能夠 感測到 <?3>個體。
        1. 假定，<?2>肉質層個體的 本能、傳承 夠高，能夠 感測到 <?3>個體的 壓力。
        2. <?2>肉質層個體 有機率能夠 意識到 高<?3>壓區、平均<?3>壓區。
        3. 抽象例子，溫度。
            1. 溫度、壓力 有 相依性。
            2. 溫度 是 <?2>個體的 振動。
            3. 偵測 <?3>個體的 <?3>溫度。
                1. <?3>溫度 不是 <?2>溫度。
                1. <?2>溫度 是 人類 認定的溫度。
                2. <?2>溫度 的 明顯例子，氣溫、水溫、體溫。
                2. <?3>溫度 是 <?3>個體的 振動。
                1. 明顯例子，空間個體的 振動。
                2. 振動 的 明顯例子，低頻振動、中頻振動、高頻振動。

3. 振動 的 抽象例子，傅立葉轉換。

2. 量子力學
    1. 量子力學 不是（人類 認定的）遇事不決，量子力學。
    2. 量子力學 不是（人類 認定的）反直覺、違反直覺。
        1. 明顯例子，天文學 不是（地心說 認定的）反直覺、違反直覺。
            1. 明顯例子，太陽、行星 的 公轉、運行 不是（地心說 認定的）反直覺、違反直覺。
            2. 假定，某一特定個體的 投影世界觀 是 地心說。
                1. 該個體 有機率認定 太陽、行星 的 公轉、運行 反直覺、違反直覺。
                2. 明顯例子，（地心說 認定的）輪。
                1. 該個體 有機率認定（地心說 認定的）輪 反直覺、違反直覺。
    3. 量子力學 是 量子物理。
    4. 量子物理 ↔ 經典物理。
        1. 暫態 ↔ 穩態。
        2. 瞬態 ↔ 常態。
        3. 過程 ↔ 結果。
        4. 動態 ↔ 靜態。
            1. 明顯例子，量子軌道圖 ↔ 行星軌道圖。
        5. 不穩定 ↔ 穩定。
        6. 非週期性 ↔ 週期性。
        7. 容易 受到光痕影響 ↔ 不容易 受到光痕影響。
        8. （存在 /（存在 + 變化））小 ↔（存在 /（存在 + 變化））大。
            1. 存在 是 本身、蘊含的宗量、靜態。

    2. 變化 是 變化、變化變化、變化變化變化、變化變化變化變化、變化變化變化變化變化。
    3. 某一特定個體 存在 越小，該個體 受到 內在物質、內在機制、交互作用 的 影響 越大。
        1. 交互作用 是 該個體、其他個體 之間的 交互作用。
9. 莫非定律 ↔ 大數法則。
10. 機率 ↔ 統計。
11. 容易 受到<?3>個體運動的影響 ↔ 不容易 受到<?3>個體運動的影響。
    1. 明顯例子，量子起落現象，量子軌道圖、行星軌道圖。
        1. 量子、行星 遭受 量子起落的 撞擊。
            1. 明顯例子，撞球。
                1. 母球 撞擊 子球。
                1. 子球 撞擊 母球。
                2. 母球、子球 交互作用。
                2. 蘊含的質量，母球 越多於 子球。
                1. 母球 越不容易 受到 影響。
                2. 子球 越容易 受到 影響。
                3. 母球 ↔ 量子、行星。
                4. 子球 ↔ 量子起落現象。
                5. 質量 ↔ 宗量。
            2. 存在 /（存在 + 變化），量子 小於 行星。
            3. 受到 量子起落 的 影響，量子 大於 行星。
12. 不容易 影響到<?3>個體的運動 ↔ 容易 影響<?3>個體的運動。
    1. 明顯例子，量子、行星。

        1. 量子 存在、變化 不容易 改變 空間節點密度。
        2. 行星 存在、變化 容易 改變 空間節點密度。
5. 相對論、量子物理、經典物理。
    1. 相對論 ↔ <?1>物理學~<?3>物理學。
    2. 認定 <?3>個體、空間個體 是 剛體。（剛體 不存在）
        1. 量子物理、經典物理 ↔ <?1>物理學~<?2>物理學。
            1. 量子物理 ↔（存在 /（存在 + 變化））小 的 <?1>物理學~<?2>物理學。
            2. 經典物理 ↔（存在 /（存在 + 變化））大 的 <?1>物理學~<?2>物理學。
            3. 明顯例子，光譜（光學）、光譜（心理學）、相態（三相變化 關係圖）。
                1. 三相 是 固體、液體、氣體。
                2. 關係圖的 軸 是 壓力、溫度。
                3. 明顯例子，光譜（光學）↔ 物理。（綠色 ↔ 相對論、經典、量子、複合型物理。明例：三相平衡（相態））
                    1. 紅外線（低頻的 不可見光）↔（人類還沒有認知到該存在的）學門。（明例：<?2>物理）
                    2. 紅色（低頻的 可見光）↔ 相對論、黑洞。（黑洞 ↔ <?3>天象學、相關指述在 ... 文件裡的 黑洞）
                    3. 綠色（中頻的 可見光）↔ 經典物理、天文學。（明例：人類固態、容易觀測到。綠色 ↔ 經典物理）
                    4. 紫色（高頻的 可見光）↔ 量子物理、布朗運動。（綠色、紫色 三角 ↔ 經典、量子、複合型物理）
                    5. 紫外線（高頻的 不可見光）↔（人類還沒有認知到該存在的）學門。（明例：<?3>物理）
                    6. （光、電磁波 的）頻率 越高 ↔（（存在 /（存在 + 變化））越 小）學門。
3. 磁鐵

1. 抽象例子，電位勢 ↔ 磁位勢。
    1. 直流電壓源 電位勢 ↔ 磁位勢。（交流電壓源 ↔ 會週期性變化的力勢）
        1. 直流電壓源 正極 ↔ 磁鐵 正極。
            1. 直流電壓源 正極 是 直流電壓源 高電位。
            2. 磁鐵 正極 是 磁鐵 高磁位。
        2. 直流電壓源 負極 ↔ 磁鐵的 負極。
            1. 直流電壓源 負極 是 直流電壓源 低電位。
            2. 磁鐵的 負極 是 磁鐵的 低磁位。
    2. 假定，直流電壓源 正極、負極 不會 移動。
        1. 直流電壓源 內部，化學能，電荷 從 負極 流向 正極。
    3. 假定，直流電壓源 正極、負極 會 移動。
        1. 假定，直流電壓源 形成 磁場。
        2. 化學能 產生 電荷移動。
            1. 電荷移動 產生 電流。
            2. 電流 產生 磁場。
        3. 直流電壓源 內部，磁場，正極、負極 互相 吸引、接近、縮短距離。
    4. 假定，直流電壓源 正極、負極 會 移動。
        1. 假定，直流電壓源 形成 磁場。
        2. 假定，有 兩個 直流電壓源。
        3. 兩個 直流電壓源，正極、負極 互相 吸引。
        4. 兩個 直流電壓源，正極 互相 排斥。
        5. 兩個 直流電壓源，負極 互相 排斥。
2. 磁鐵 有機率是 <?3>個體、磁位 交互作用的 介質、中介層、轉換器。
    1. <?3>個體 →（磁鐵）→ 磁量、磁位、磁場。

1. 當下磁量 = 自然磁量 + 額外磁量。
    1. 當下宗量 = 自然宗量 + 額外宗量。
    2. 某一特定<?2>個體 有機率量測不到 當下磁量。
    3. 該<?2>個體 有機率量測不到 自然磁量。
    4. 該<?2>個體 有機率量測到 額外磁量。
2. 磁量差 形成（相對）磁位、高磁位、低磁位。
    1. 磁位差 有機率形成 某一特定封閉迴路。
        1. 該封閉迴路 是 磁場。
    2. 假定，磁鐵的 正極、負極 有 連接、磁阻值、磁容值、磁感值。
        1. 磁位差 會形成 該封閉迴路。
            1. 明顯例子，該正極、該負極 之間，<?3>個體 連接、（無限大>磁阻值>零）。
    3. 假定，磁鐵的 正極、負極 之間 斷路，沒有磁阻值、磁容值、磁感值。
        1. 磁位差 不會形成 該封閉迴路。
            1. 明顯例子，該正極、該負極 之間，<?3>個體 斷路、磁阻值是無限大。
    4. 假定，磁鐵的 正極、負極 之間 短路，沒有磁阻值、磁容值、磁感值。
        1. 磁位差 不會形成 該封閉迴路。
            1. 明顯例子，該正極、該負極 之間，<?3>個體 短路、磁阻值是零。
3. 磁鐵內部 攝取 <?3>個體，低磁位的宗量 轉變成高磁位的宗量。
    1. 磁鐵外部 產出 磁量、磁位、磁場，高磁位的宗量 轉變成 低磁位的宗量。
2. 明顯例子，某一特定人類個體 有 脂肪個體、動能個體。
    1. 該人類個體 是 <?2>個體。

2. 脂肪個體 是 <?2>個體。
3. 動能個體、動能個體蘊含的宗量 是 <?a>個體。
    1. 1 >= a >= u。
4. 該人類個體 運動，燃燒 脂肪個體，提升 動能個體、動能個體蘊含的宗量。
5. （脂肪→動能） ↔ 磁鐵的 內部機制、轉換、現象。
    1. 該人類個體 ↔ <_?3_>個體。
    2. 脂肪個體 ↔（磁鐵 攝取的）<?3>個體。
    3. 動能個體蘊含的宗量 ↔ 磁量、磁位、磁場。

3. 磁鐵的 極性 倒轉 有機率產生 渦流 現象。
    1. 倒轉 是 對調、對流、內在物質交互作用。
    2. 明顯例子，某一特定磁鐵個體 固定不動。
        1. 該磁鐵個體的 S極、N極 倒轉。
    3. N極、S極 處於 平衡狀態、均勻狀態、奇點狀態，有機率產生 磁單極 現象。
        1. N極、S極 的 極性 處於 平衡。
            1. 抽象例子，磁鐵 ↔ sin波。
                1. N極 ↔ sin波的 波峰。
                2. S極 ↔ sin波的 波谷。
                3. 磁極倒轉 ↔ sin波的 相位 增加 180度。
                    1. N極 ↔ sin波的 波谷。
                    2. S極 ↔ sin波的 波峰。
                    3. 磁極偏轉 ↔ sin波的 相位 增加 θ 度。
                        1. θ 是 某一特定角度。
                        2. θ 有機率是 複數。
                4. 平衡狀態 ↔ sin波 無限趨近於 直線。
                （傅立葉轉換）
                    1. N極 ↔ 無限趨近於 a。

        1. a 是 某一特定數值、某一特定振幅。
        2. a 有機率是 複數。
    2. S極 ↔ 無限趨近於 a。
2. N極、S極 倒轉 是 連續曲線。
    1. 平衡狀態 是 該曲線 位於（某一特定磁極座標系的）零點 的 狀態。
3. N極、S極 磁極偏轉 週期性變化，有機率產生 渦流 現象。
4. 磁單極狀態。
    1. 當下的磁極、10000秒之後的磁極 ↔ N極、S極。
        1. 磁力線 在 時間域 貫穿，當下 到 10000秒之後，之間。
        2. 磁力線 在 空間域 貫穿，當下 到 10000秒之後，之間 的 <?3>位移。（以太）
        3. 抽象例子，假定，某一特定個體 轉換成 儲量、磁能。
            1. 該個體 有機率通過 該磁力線 傳輸到 10000秒之後。
            2. 假定，10000秒之後，其他個體 接收到 該磁力線，進行 解調變。
                1. 該個體 有機率 從 該磁力線，轉變成、還原成 該個體。
                2. 該個體 有機率 進入『完全死亡狀態』。
                3. 該個體的 肉質層、意識層 有機率 殘缺、缺損、發散、龜裂、錯亂。
                4. 該個體的 肉質層、意識層 有機率 蒸發、重組、亂組、嵌入其他個體。

5. 該個體的 肉質層、意識層 有機率被該磁鐵攝取、被<?3>個體攝取。
6. 假定，該個體、該群體、該文明 的本能、傳承 足夠高。
7. 假定，該磁力線 沒有 功率消耗、功率損耗、能量遺失。
8. 該個體（認定自己）瞬間 到達10000秒之後、某一特定目標空間。
9. 抽象例子，該個體 從 當下 出發。
    1. 出發 是 該個體 轉變成磁力線、壓縮、調變。
    2. 當下 ↔ N極。
    3. 該個體 進入 S極 之前，其他個體 進行 攔截。
        1. 10000秒之後 ↔ S極。
        2. 其他個體 的 明顯例子，天線。
    4. 其他個體 解調變、解壓縮、從磁力線還原成該個體。
10. 磁單極型 時間旅行、空間旅行、時空旅行，極端 原始、危險、低效。
    1. 僅適合 用於 時光盒、時空玩具、留聲機型紀錄。
    2. 磁力線，從 當下的磁極 傳遞到10000秒之後的磁極。
    3. 磁力線 蘊含的 訊息，從 當下的磁極 傳遞到 10000秒之後的磁極。

        4. 其他個體 有機率認定 該磁力線是 雜訊、異常現象、磁場高能現象。
            1. 其他個體 是 沒有 對應的、正確的 接收裝置的 其他個體。
2. 當下的磁極、10000秒之前的磁極 ↔ N極、S極。
    1. 訊息 無法 逆向傳遞。
        1. 逆向傳遞 是 改變當下的磁極，傳遞到、影響到 10000秒之前的磁極。
        2. 原因很明顯，當下的磁極 是由 10000秒之前的磁極 決定。（混沌理論）
            1. 當下的磁極 是 當下的磁極 的 狀態、存在、變化。
            2. 當下的磁極 是由 過去的磁極 決定。
                1. 過去 的 明顯例子，10000年 之前。
                2. 過去 的 明顯例子，0.001秒 之前。
        3. 磁力線，從 當下的磁極 傳遞到 10000秒之前的磁極。
        4. 磁力線 蘊含的 訊息，不是 從 當下的磁極 傳遞到 10000秒之前的磁極。
        5. 磁力線 蘊含的 訊息，是 從 10000秒之前的磁極 傳遞到 當下的磁極。
    2. 錯誤使用 磁單極，有機率 產生 複製個體、鏡像個體、奇美拉個體 的 現象。
        1. 錯誤使用 是 缺德、無德、反德 使用。

2. 該現象 有機率造成 文明 崩塌、自滅。
    1. 原因很明顯，個體無法接受一模一樣的個體存在、文明的生存資源有限。
        1. 假定，某一特定個體 有 一模一樣的其他個體 存在。
            1. 意味著，該個體 有機率 被取代。
            2. 一模一樣 是 外貌、內在、年齡、指紋、DNA、記憶 一模一樣。
            3. 該個體 有機率為了 不被取代，殲滅 該一模一樣的其他個體。
            4. 明顯例子，該個體 走在 路上，看到 自己、家人 在餐廳裡面。
            5. 明顯例子，被取代感、恐怖谷效應。（鏡子裡面的自己在亂動）
        2. 假定，生存資源 是 100%。
            1. 假定，每個人類個體 被分配到的 食物、氧氣、空間 資源 相同。
            2. 每一個個體 被分配到的 資源 是（100% / 總個體數量）。
            3. 個體數量 越多，每一個個體被分配到的資源 越少。

4. 資源 有限，個體數量 越多，文明 崩塌、自滅 機率 越高。
5. 明顯例子，老鼠烏托邦、老鼠互食現象。

4. 空間節點密度
    1. 明顯例子，彈簧。
        1. 相同 彈簧長度、材料特性。
            1. 相同 彈簧受力，彈簧圈數 越多，彈簧節點密度 越大，傳遞能量 越慢。
                1. 彈簧節點密度 是 單位長度的圈數。
                2. 彈簧節點密度 是 某一特定長度的圈數。
            2. 相同 彈簧圈數，彈簧壓力 越大，彈簧節點密度 越大，傳遞能量 越慢。
            3. 相同 彈簧圈數，彈簧拉力 越大，彈簧節點密度 越小，傳遞能量 越快。
        2. 彈簧 ↔ 空間。
            1. 彈簧節點密度 ↔ 空間節點密度。
            2. 傳遞能量 ↔（人類認定的）時間。
    2. 假定，空間節點密度，第一個空間 大於 第二個空間。
        1. 假定，某一特定個體 在 第一個空間 做 光速運動。
            1. 假定，其他個體 在 第二個空間 做 靜止運動。
            2. 該個體 有機率認定 該其他個體 在做 低於 光速運動。
                1. 該個體 有機率沒有意識到 自己在做 光速運動。
                    1. 明顯例子，地球上的個體 有機率沒有意識到 太陽系 在做 公轉運動。
            3. 該其他個體 有機率認定 該個體 在做 低於 光速運動。
        2. 假定，某一特定個體 在 第一個空間 做 靜止運動。

        1. 假定，其他個體 在 第二個空間 做 光速運動。
        2. 該個體 有機率認定 該其他個體 在做 超光速運動。
        3. 該其他個體 有機率認定 該個體 在做 光速運動。
5. 黑洞
    1. （人類 認定的）黑洞 存在 時間、空間、物理定律、化學反應、萬物法則。、能量、儲量、宗量
        1. 時間、空間、物理定律、化學反應、萬物法則，在 黑洞 裡面，沒有 失效。
            1. 明顯例子，黑洞 ↔ 颱風。
                1. 颱風 存在 流體力學。
                2. 流體力學，在 颱風 裡面，沒有 失效。
        2. 內在物質、內部機制、外在環境，在 黑洞 裡面，沒有失效。
            1. 明顯例子，假定，某一特定<?3>個體 包覆 某一特定<?3>黑洞。
                1. 該<?3>個體的 內在物質、內部機制、外在環境，在 該<?3>黑洞 裡面，沒有 失效。
                1. 內在物質 ↔ 時間、空間。
                2. 內部機制 ↔ 物理定律、化學反應、萬物法則。
                3. 外在環境 ↔ 包覆、蘊含 該<?3>個體的 某一特定其他<?3>個體、該<?$a_{n\geq4}$>個體。
            2. 明顯例子，假定，某一特定<?$a_{n\geq4}$>個體 蘊含 某一特定<?3>黑洞。
                1. $n \geq a_{n\geq4} \geq 4$。
                2. 該<?$a_{n\geq4}$>個體的 內在物質、內部機制、外在環境，在 該<?3>黑洞 裡面，沒有 失效。
        3. 明顯例子，假定，某一特定<?a>個體 包覆 某一特定<?a>黑洞。

    1. 該<?a>個體的 內在物質、內部機制、外在環境，在該<?a>黑洞 裡面，沒有 失效。
        1. n ≥ a ≥ u。
            1. a = a。
4. 明顯例子，假定，某一特定<?x>個體 蘊含 某一特定<?y>黑洞。
    1. 該<?x>個體的 內在物質、內部機制、外在環境，在該<?y>黑洞 裡面，沒有 失效。
        1. n ≥ x > y ≥ u。
2. 明顯例子，地水風火。
    1. 流沙 ↔ 地。
    2. 漩渦 ↔ 水。
    3. 颱風 ↔ 風。
    4. 對流 ↔ 火。
    5. 黑洞 ↔ 乙太。
    6. （地水風火 的 描述 在 煉金術 文件群的 地水風火）
3. 明顯例子，假定，某一特定飛機的 飛行速度 是 10000 公里/小時。
    1. 假定，該飛機的 飛行方向 是 遠離 某一特定颱風。
    2. 該飛機 距離 該颱風 越近。
        1. 該颱風的 吸力 越大。
        2. 該飛機 越難以 飛離 該颱風。
    3. 假定，該飛機 距離 該颱風 10000 公尺 的 時候，颱風的 吸力 是 10000 公里/小時。
        1. 該飛機 沒有遠離該颱風、沒有接近該颱風。（假定，沒有 考慮 慣性）
            1. 原因很明顯，該飛機的 速度 等於，脫離 該颱風 所需的 逃逸速度。

4. 假定，該飛機 距離 該颱風 小於 10000 公尺 的 時候，颱風的 吸力 大於 10000 公里/小時。
    1. 該飛機（逐漸、逐漸加加速度）接近該颱風。
        1. 原因很明顯，該飛機的 速度 低於，脫離 該颱風 所需的 逃逸速度。
5. 假定，該飛機 被吸進 該颱風。
    1. 該飛機 有機率進入（風平浪靜的）颱風眼。
    2. 該飛機 有機率被下沉氣流 往下對流、被噴射脫離該颱風。
6. 颱風 ↔（人類 認定的）黑洞。
    1. 飛機 ↔ 光。
    2. 該飛機的 速度 ↔ 光速。
    3. 颱風的 颱風眼 ↔ 黑洞的 黑洞眼。

4. 明顯例子，假定，某一特定聲音 在 空氣 傳遞，該聲音的飛行速度 是（人類 認定的）音速。
    1. 假定，該聲音的 飛行方向 是 遠離 某一特定颱風。
    2. 該聲音 距離 該颱風 越近。
        1. 該颱風的 吸力 越大。
        2. 該聲音 越難以 飛離 該颱風。
    3. 假定，該聲音 距離 該颱風 10000 公尺 的 時候，颱風的 吸力 是 音速。
        1. 該聲音 沒有遠離該颱風、沒有接近該颱風。（假定，沒有 考慮 慣性）
            1. 原因很明顯，該聲音的 速度 等於，脫離 該颱風 所需的 逃逸速度。
    4. 假定，該聲音 距離 該颱風 小於 10000 公尺 的 時候，颱風的 吸力 大於 音速。
        1. 該聲音（逐漸、逐漸加加速度）接近該颱風。

    1. 原因很明顯，該聲音的 速度 低於，脫離 該颱風 所需的 逃逸速度。
5. 假定，該聲音 被吸進 該颱風。
    1. 該聲音 有機率進入（風平浪靜的）颱風眼。
    2. 該聲音 有機率被下沉氣流 往下對流、被噴射脫離該颱風。
6. 颱風 ↔（人類 認定的）黑洞。
    1. 聲音 ↔ 光。力、
        1. 聲音、<?2>個體 ↔ 光、<?3>個體。
            1. 聲音、<?2>個體的變化 ↔ 光、<?3>個體的變化。
            2. 明顯例子，以 音速（以上）吸入 聲音 ↔ 以 光速（以上）吸入 光。
            3. 明顯例子，以 音速（以上）吸入 <?2>個體 ↔ 以 光速（以上）吸入 <?3>個體。
                1. 有機率產生 <?2>音爆 現象 ↔ 有機率產生 <?3>光爆 現象。
            4. 明顯例子，以 音速（以上）吸入 <?$a_{n\geq 2}$>個體 ↔ 以 光速（以上）吸入 <?$a_{n\geq 3}$>個體。
                1. $n \geq a_{n\geq 2} \geq 2$。
                2. $n \geq a_{n\geq 3} \geq 3$。
                3. 有機率產生 <?$a_{n\geq 2}$>音爆 現象 ↔ 有機率產生 <?$a_{n\geq 3}$>光爆 現象。
        2. <?3>個體 ↔ 重力波、<?4>個體。
            1. <?3>變化波、<?3>個體的變化 ↔ 重力波、<?4>個體的變化。
            2. 明顯例子，以 音速（以下）吸 <?3>個體 ↔以 光速（以下）吸 <?4>個體。
                1. 重力波 ↔ <?4>個體的 變化。

1. 重力波 ↔ <?$a_{n\geq4}$>個體的 變化。
2. 重力波 ↔ <?$a_{n\geq4}$>個體的 真實能量、投影能量。
    1. （真實能量、投影能量 的 描述在 能量、儲量 文件群的 能量層級 與 外在環境 與 內在物質）
3. 重力波 ↔ <?$a_{n\geq4}$>個體的 真實宗量、投影宗量。
    1. $n \geq a_{n\geq4} \geq 4$。

3. 明顯例子，假定，某一特定個體 以 音速（以上）吸入 聲音、<?2>個體。
    1. 假定，該個體 以 音速（以下）吸 <?3>個體。
    2. 假定，<?2>個體的 變化的 移動速度、傳遞速度 上限 是 音速（以下）。
        1. <?2>個體的 變化的 傳遞速度 上限 是 該個體的 吸引速度（以下）。
    3. 假定，<?3>個體的 變化的 移動速度、傳遞速度 上限 是 音速（以上）。
        1. <?3>個體的 變化的 傳遞速度 上限 是 該個體的 吸引速度（以上）。
    4. 其他個體 有機率觀測到，該個體 吸收聲音、物質。
    5. 其他個體 有機率觀測到，該個體 產生 <?3>變化波。、<?3>震動波
    6. 其他個體 有機率認定，該個體 不是 <?3>變化波型黑洞。
        1. 其他個體 有機率認定，該個體 不是 <?3>個體波型黑洞。

2. 其他個體 有機率認定，該個體 不是 <?$a_{n\geq 3}$>個體波型黑洞。
7. 其他個體 有機率認定，該個體 是 黑洞、聲音型黑洞、物質型黑洞。
1. 其他個體 有機率認定，該個體 是 <?2>個體波型黑洞。
2. 其他個體 有機率認定，該個體 是 <?$a_{2\geq u}$>個體波型黑洞。
1. $2 \geq a_{2\geq u} \geq u$。
4. 明顯例子，假定，某一特定個體 以 光速（以上）吸入 光、<?3>個體。
1. 假定，該個體 以 光速（以下）吸 <?4>個體。
2. 假定，<?3>個體的 變化的 移動速度、傳遞速度 上限 是 光速（以下）。
1. <?3>個體的 變化的 傳遞速度 ≤ 該個體的 吸引速度。
1. 假定，<?3>個體的 變化的 傳遞速度 = 該個體的 吸引速度。
1. 其他個體 有機率認定 該位置、該區域 是（有效）視野邊界。
2. 其他個體 有機率認定 該位置、該區域 有 駐波 現象。
3. 假定，<?4>個體的 變化的 移動速度、傳遞速度 上限 是 光速（以上）。
1. <?4>個體的 變化的 傳遞速度 > 該個體的 吸引速度。

4. 其他個體 有機率觀測到，該個體 吸收光、物質。
5. 其他個體 有機率觀測到，該個體 產生重力波。
6. 其他個體 有機率認定，該個體 不是 重力波型黑洞。
    1. 其他個體 有機率認定，該個體 不是 <?4>個體波型黑洞。
    2. 其他個體 有機率認定，該個體 不是 <?$a_{n\geq 4}$>個體波型黑洞。
7. 其他個體 有機率認定，該個體 是 黑洞、光型黑洞、物質型黑洞。
    1. 其他個體 有機率認定，該個體 是 <?3>個體波型黑洞。
    2. 其他個體 有機率認定，該個體 是 <?$a_{3\geq u}$>個體波型黑洞。
        1. $3 \geq a_{3\geq u} \geq u$。

2. 音速 ↔ 光速。
3. 空氣 運動、變化 ↔ 重力波。空間 運動、變化。
4. 颱風的 颱風眼 ↔ 黑洞的 黑洞眼。
5. 颱風 吸入 <?$a_{2\geq u}$>個體 ↔ 黑洞 吸入 <?$a_{3\geq u}$>個體。
    1. 吸入 是 輸入、收斂、吸收、高速吸收、散度向內。
        1. 散度 是 散度、旋度 的 散度。
        2. 空氣的 空洞區、真空區 ↔ 空間的 空洞區、真空區。
    2. $2 \geq a_{2\geq u} \geq u$。
    3. $3 \geq a_{3\geq u} \geq u$。
        1. <?x>黑洞 吸入 <?y>個體。

        1. x ≥ y ≥ u。
    2. （人類 認定的）黑洞 是 <?$a_{n\geq 3}$>個體。
        1. <?$a_{n\geq 3}$>黑洞 吸入 <?$a_{x\geq u}$>個體。
            1. x = $a_{n\geq 3}$。
        2. 明顯例子，假定，某一特定（人類 認定的）黑洞 是 <?a_3>個體。
            1. 該黑洞 吸入 <?$a_{3\geq u}$>個體。
            2. <?a_3>黑洞 吸入 <?$a_{3\geq u}$>個體。
                1. x = 3。
4. 明顯例子。
    1. 颱風 吸入 <?1>個體 ↔ 黑洞 吸入 <?1>個體。
        1. 明顯例子，颱風 吸入 <?1>個體 ↔ 明顯例子，黑洞 吸入 <?1>個體。
        2. 明顯例子，颱風 吸入 力 ↔ 明顯例子，黑洞 吸入 光、力。
            1. 颱風 有 吸 光。
                1. 颱風 有 吸（蘊含 光 的)空氣。
                1. 颱風 有 吸、吸入 該空氣。
                2. 颱風 有 吸（該空氣 蘊含 的）光。
                3. 颱風 沒有 吸入（該空氣 蘊含 的）光。
                2. 光 有機率（自己、主動）進入、離開 颱風。
                1. 明顯例子，某一特定個體 使用 手電筒 照射 颱風。
            2. 颱風 沒有 吸入 光。

            1. 颱風的 吸力 太小、不夠大，無法、極端難以 吸入、顯著減緩光。
    2. 颱風 吸入 <?2>個體 ↔ 黑洞 吸入 <?2>個體。
        1. 明顯例子，颱風 吸入 <?2>個體 ↔ 明顯例子，黑洞 吸入 <?2>個體。
        2. 明顯例子，颱風 吸入 空氣 ↔ 明顯例子，黑洞 吸入 空氣。
    3. 颱風 吸入（蘊含 <?x>個體 的）<?y>個體 ↔ 黑洞 吸入（蘊含 <?i>個體 的）<?j>個體。
        1. 2 ≥ y > x ≥ u。
        2. 3 ≥ j > i ≥ u。
        3. 明顯例子，颱風 吸入（蘊含 <?1>個體 的）<?2>個體 ↔ 黑洞 吸入（蘊含 <?1>個體 的）<?2>個體。
            1. 颱風 吸入（蘊含 力 的)空氣 ↔ 黑洞 吸入（蘊含 光、力 的)空氣。
6. 颱風 吐出 <?$a_{2\geq u}$>個體 ↔ 黑洞 吐出 <?$a_{3\geq u}$>個體。
    1. 吐出 是 輸出、發散、噴射、高速噴射、散度向外。
    2. 颱風 吐出 的 明顯例子。
        1. 颱風 吐出 <?1>個體 的 明顯例子，力。
        2. 颱風 吐出 <?2>個體 的 明顯例子，空氣。
        3. 颱風 吐出（蘊含 <?1>個體 的）<?2>個體 的 明顯例子，（蘊含 力）空氣。
    3. 黑洞 吐出 的 明顯例子。
        1. 黑洞 吐出 <?1>個體 的 明顯例子，光。

2. 黑洞 吐出 <?2>個體 的 明顯例子，空氣、電漿、夸克、輕子、費米子。
3. 黑洞 吐出（蘊含 <?1>個體 的）<?2>個體的 明顯例子，（蘊含 光、力）空氣。
4. 黑洞 吐出 <?3>個體 的 明顯例子，空間。
5. 黑洞 吐出（蘊含 <?1>個體 的）<?3>個體的 明顯例子，（蘊含 光、力）空間。

7. 颱風合併 ↔ 黑洞合併。、低氣壓合併
    1. 有機率產生 共伴效應。

5. （人類 認定的）黑洞 是 光型黑洞、電磁波型黑洞、物質型黑洞。
    1. 物質 是 人類 認定的 物質、物體。
    2. 明顯例子，假定，某一特定個體 能夠觀測 氧氣。
        1. 該個體 有機率認定 地球 是 黑洞、氧氣型黑洞。
            1. 原因很明顯，氧氣 進入 地球的 大氣層 之後，跑不出來、極端難以逃逸到外太空。
        2. 氧氣 有機率逃逸 地球。
            1. 明顯例子，假定，某一特定太空船 飛出 地球。
                1. 在 太空船 裡面的 氧氣 能夠逃逸到 外太空。
                2. 附著在 太空船的 氧氣 能夠逃逸到 外太空。
            2. 明顯例子，假定，某一特定隕石 擦過 地球的大氣層。
                1. 氧氣 有機率 逃逸到、被濺射到 外太空。
                2. 明顯例子，使用 石頭 打水漂，水 被濺射到 河岸、海岸。
                1. 石頭 ↔ 隕石。
                2. 水 ↔ 氧氣。
                3. 河、海 ↔ 大氣層。

4. 河岸、海岸 ↔ 外太空。

3. 黑洞 的 明顯例子，光型黑洞、力型黑洞、氧氣型黑洞、<?x>型黑洞。、<?[A]>型黑洞
    1. <?x>型黑洞 是 <?y>個體 一旦進入 <?x>型黑洞 裡面，就無法逃逸的 <?x>個體。
        1. n ≥ x ≥ y ≥ u。
        2. 明顯例子，假定，某一特定<?x>個體 包覆、蘊含 某一特定<?y>個體。
            1. 假定，該<?y>個體 無法離開 該<?x>個體。
            2. 對於 該<?y>個體 來說，該<?x>個體 是 黑洞。
            3. 該<?x>個體 是 該<?y>個體型黑洞。
        3. 明顯例子，假定，某一特定個體 沒有 離開地球的本能、離開地球的傳承。
            1. 該個體 無法離開 地球。
                1. 明顯例子，該個體 沒有 火箭、太空船。
            2. 對於 該個體 來說，地球 是 黑洞。
            3. 地球 是 該個體型黑洞。
        4. 明顯例子，假定，光、電磁波 沒有 離開某一特定個體的本能、離開該個體的傳承。
            1. 光、電磁波 無法離開 該個體。
            2. 對於 光、電磁波 來說，該個體 是 黑洞。
            3. 該個體 是 光型黑洞、電磁波型黑洞、（人類 認定的）黑洞。
        5. 明顯例子，假定，光、氧氣 沒有 離開某一特定個體的本能、離開該個體的傳承。
            1. 光、氧氣 無法離開 該個體。
            2. 對於 光、氧氣 來說，該個體 是 黑洞。

        3. 該個體 是 光型黑洞、氧氣型黑洞、（人類 認定的）黑洞。
    6. 明顯例子，假定，光、力、氧氣 沒有 離開某一特定個體的本能、離開該個體的傳承。
        1. 光、力、氧氣 無法離開 該個體。
        2. 對於 光、力、氧氣 來說，該個體 是 黑洞。
        3. 該個體 是 光型黑洞、力型黑洞、氧氣型黑洞。
    7. 明顯例子，假定，<?a>個體 沒有 離開某一特定個體的本能、離開該個體的傳承。
        1. <?a>個體 無法離開 該個體。
        2. 對於 <?a>個體 來說，該個體 是 黑洞。
        3. 該個體 是 <?a>個體型黑洞。
            1. n ≥ a ≥ u。
6. （人類 認定的）黑洞 ↔ 低氣壓。
    1. （人類 認定的）白洞 ↔ 高氣壓。
7. 不存在，（人類 認定的）黑洞 通往（人類 認定的）白洞 的現象。
    1. 明顯例子，不存在，颱風 通往 颱風型（人類 認定的）白洞 的現象。
    2. 設計、製造、使用 磁場，有機率產生 穿越 現象。
        1. 明顯例子，（人類 認定的）費城實驗。
8. 不存在，（人類 認定的）黑洞 記錄所有的 資訊、情報 的現象。
    1. 明顯例子，不存在，颱風 記錄所有的 資訊、情報 的現象。
9. 不存在，（人類 認定的）黑洞 產生（人類 認定的）蟲洞、平行宇宙、虛擬實境 的現象。

    1. 明顯例子，不存在，颱風 產生 蟲洞、平行宇宙、虛擬實境 的現象。
10. 兩個（以上）黑洞 之間，有機率有 通道。
    1. 明顯例子，用 手 撥動 海水。
        1. 兩側 出現 漩渦。
            1. 左右兩側 各自出現 一個漩渦。
            2. 總共產生 兩個 漩渦。
        2. 漩渦 在 海面下，出現 通道、相連的通道。
            1. 通道 不是（人類 認定的）蟲洞。
            2. 通道 是 兩個 漩渦之間的 通道。
                1. 明顯例子，（火車隧道 兩側的）出入口 ↔ 漩渦。
                1. 火車隧道 ↔ 通道。
                2. 火車隧道 不是（人類 認定的）蟲洞。
                3. 出入口、火車隧道 在 相同、同一個 維度、空間、坐標系。
            3. 通道 有機率產生 重力透鏡現象。
11. 假定，某一特定<?2>個體的 本能、傳承 足夠高。
    1. 該<?2>個體 能夠 觀測、感測、感受 <?3>個體。
    2. 該<?2>個體 有機率觀測到 <?3>都卜勒現象。
    3. 假定，某一特定<?3>個體的 速度 超過 光速。
        1. 該<?2>個體 有機率觀測到 光爆 現象。
            1. 光爆 ↔ 音爆。

6. 類星體
    1. 人類 對 類星體的光譜、類星體的極高亮度、黑洞的超光速噴流 的 認定、描述 ↔ 洞穴理論。
        1. 洞穴理論 是（柏拉圖 認定的）洞穴理論。
        2. 明顯例子，人類 認定，類星體的光譜 不是 該星體的光、光譜、光的頻率。

3. 明顯例子，人類 認定，類星體的光譜 是 恆星、黑洞、活動星系核 在 遠離 地球。
4. 明顯例子，人類 認定，類星體的極高亮度 不是（比人類 認定的距離 還）近距離 照射。
5. 明顯例子，人類 認定，類星體的極高亮度 是（原始亮度 遠遠高於 極高亮度）遠距離 照射。
6. 明顯例子，人類 認定，黑洞的超光速噴流 不是 超光速的噴流。
7. 明顯例子，人類 認定，黑洞的超光速噴流 是 視覺誤差、速度低於光速的噴流。

7. 麥斯威爾妖
    1. 第二型永動機。
    2. 明顯例子，假定，某一特定箱子 使用 某一特定隔板 分隔出 兩個 空間。
        1. 假定，左側的空間、該隔板 之間，安裝 高通濾波器。
            1. 高通濾波器 是 使用 幾何形狀、材料特性 形成的高通濾波器。
                1. 明顯例子，三稜鏡。
                1. 三稜鏡 分出 不同頻率的 光線。
                2. 紫光 通過 該隔板（事先挖好的 洞），從左側的空間 進入 右側的空間。
                1. 洞 的 抽象例子，雙狹縫實驗的 洞。
                3. 紅光 打到 該隔板，維持在 左側的空間 裡面。
                1. 隔板 的 抽象例子，雙狹縫實驗的 隔板。
            2. 高頻、高能量、高速運動 的 粒子，從 左側的空間 進入 右側的空間。
            3. 低頻、低能量、低速運動 的 粒子，維持在 左側的空間 裡面。

2. 假定，右側的空間、該隔板 之間，安裝 低通濾波器。
    1. 低通濾波器 是 使用 幾何形狀、材料特性 形成的低通濾波器。
        1. 明顯例子，三稜鏡。
            1. 三稜鏡 分出 不同頻率的 光線。
            2. 紫光 打到 該隔板，維持在 右側的空間 裡面。
                1. 隔板 的 抽象例子，雙狹縫實驗的 隔板。
            3. 紅光 通過 該隔板（事先挖好的 洞），從右側的空間 進入 左側的空間。
                1. 洞 的 抽象例子，雙狹縫實驗的 洞。
            4. 三稜鏡 是 <?2>個體。
                1. 光 是 <?1>個體。
            5. 三稜鏡 ↔ <?3>三稜鏡。
                1. <?3>三稜鏡 是 <?3>個體。
                2. 光、力、<?1>個體 ↔ <?2>個體。
                    1. <?2>個體 的 明顯例子，（人類 認定的）分子、電子、物體。
                3. 明顯例子，<?3>三稜鏡 分出 不同頻率的 粒子。
                    1. <?3>三稜鏡的 材料特性 形成 濾波器。
                    2. 洞的（相對）位置、幾何形狀 形成濾波器。
                        1. 濾波器 的 明顯例子，高通濾波器、低通濾波器、帶通濾波器。
                    3. 左側的空間、右側的空間 形成 溫度差。
                        1. 濾波器 ↔ 麥斯威爾妖。

            1. <?3>濾波器 ↔ 麥斯威爾妖。
            2. 幾何形狀、材料特性 ↔ 麥斯威爾妖。
        2. 該箱子 ↔ 第二型永動機。
            1. <?2>箱子 ↔ 第二型永動機。
            2. 左側的空間、右側的空間 ↔ 第二型永動機。
        3. 假定，某一特定<?2>個體 本能、傳承 不夠高。
            1. 該<?2>個體 有機率沒有 觀測到，<?3>個體的 存在、變化。
            2. 該<?2>個體 有機率沒有 認知到，<?3>個體的 存在、變化。
            3. 該<?2>個體 有機率認定，該箱子 是 第一型永動機。
    2. 高頻、高能量、高速運動 的 粒子，維持在 右側的空間 裡面。
    3. 低頻、低能量、低速運動 的 粒子，從 右側的空間 進入 左側的空間。
3. 左側的空間、右側的空間 形成 溫度差。
    1. 低頻、低能量、低速運動 的 粒子 聚集在 左側。
    2. 高頻、高能量、高速運動 的 粒子 聚集在 右側。

8. 力譜
    1. 明顯例子，力譜 ↔ 光譜。
        1. 明顯例子，光譜。
            1. 對於 人類個體 來說，可見光譜 是 有亮光、有顏色。

    1. 對於 人類個體（的 眼睛）來說，可見光譜 是 有亮光、有顏色。
2. 對於 人類個體 來說，不可見光譜 是 沒有亮光、沒有顏色。
    1. 對於 人類個體（的 眼睛）來說，不可見光譜 是 沒有亮光、沒有顏色。
    2. 明顯例子，紅外線、紫外線、X 光線、微波、無線電、α 射線、β 射線、γ 射線。
        1. 對於 人類個體的 眼睛 來說，不可見光譜 的 X 光線 是 沒有亮光、沒有顏色。
        2. 對於 人類個體的 骨頭 來說，不可見光譜 的 X 光線 是 有亮光、有顏色。
3. 假定，某一特定房間 有（已經點亮的）蠟燭、日光燈。
    1. 對於 人類個體 來說，該房間 有亮光、有顏色。
4. 假定，某一特定房間（只）有（已經點亮的）紅外線燈、紫外線燈。
    1. 對於 人類個體 來說，該房間 沒有亮光、沒有顏色。
    2. 對於 人類個體 來說，該房間 一片漆黑。
    3. 假定，某一特定個體 能夠看到 紅外線、紫外線。
        1. 對於 該個體 來說，該房間 有亮光、有顏色。
5. 假定，某一特定房間 沒有（已經點亮的）燈。
    1. 對於 人類個體 來說，該房間 沒有亮光、沒有顏色。
    2. 對於 人類個體 來說，該房間 一片漆黑。

        3. 假定，某一特定個體 能夠 看到、發射，某一特定光譜。
            1. 明顯例子，假定，該個體 能夠 看到、發射，可見光譜。
                1. 明顯例子，狼（的 眼睛）。
            2. 對於 該個體 來說，該房間 有亮光、有顏色。
2. 明顯例子，力譜。
    1. 對於 人類個體 來說，可觸力譜 是 有力存在、有力變化。
        1. 可觸力譜 能夠 感測、交互作用 的 力（大小、頻率、存在、變化）。
        2. 明顯例子，電磁力。
            1. 明顯例子，推力、拉力、摩擦力。
    2. 對於 人類個體 來說，不可觸力譜 是 沒有力存在、沒有力變化。
    3. 假定，某一特定房間 有（已經 存在、變化 的）可觸力譜的 力。
        1. 對於 人類個體 來說，該房間 有力存在、有力變化。
    4. 假定，某一特定房間（只）有（已經 存在、變化的）不可觸力譜的 力。
        1. 對於 人類個體 來說，該房間 沒有力存在、沒有力變化。
        2. 對於 人類個體 來說，（在）該房間（當中）沒有（感測、感知、感受 到）觸感。
        3. 假定，某一特定個體 能夠感測 不可觸力譜的 力。

        1. 對於 該個體 來說，該房間 有力存在、有力變化。
    5. 假定，某一特定房間 沒有（已經 存在、變化 的）力源。（力源 是 力的 存在、變化 的 來源）
        1. 對於 人類個體 來說，該房間 沒有力存在、沒有力變化。
        2. 對於 人類個體 來說，（在）該房間（當中）沒有（感測、感知、感受 到）觸感。
        3. 假定，某一特定個體 能夠 感測、交互作用，某一特定力譜。
            1. 明顯例子，假定，該個體 能夠 感測、交互作用，可觸力譜。
            2. 對於 該個體 來說，該房間 有力存在、有力變化。
3. 人類個體、（可觸力譜 的）力 相互接觸、有機率發生（物理、化學、萬物）作用、反應。
4. 人類個體、（不可觸力譜 的）力 相互穿透、無法發生（物理、化學、萬物）作用、反應。
5. 人類個體、（可<?a>譜 的）存在 相互接觸、有機率發生（物理、化學、萬物）作用、反應。
    1. n ≥ a ≥ u。
        1. <?a> 是 第 a 宗量層級。
        2. <?a> 是 <?a>宗量。
        3. <?a> 是（<?a>宗量 的）某一特定宗量種類。
    2. 可<?a>譜 是（（<?a>宗量 的）某一特定宗量種類的）某一特定可宗量譜。
        1. 明顯例子，（（<?1>宗量 的）光的）可見光譜。
        2. 明顯例子，（（<?1>宗量 的）力的）可觸力譜。

6. 人類個體、（不可<?a>譜 的）存在 相互穿透、無法發生（物理、化學、萬物）作用、反應。
    1. 不可<?a>譜 是（（<?a>宗量 的）某一特定宗量種類 的）某一特定不可宗量譜。
        1. 明顯例子，（（<?1>宗量 的）光的）不可見光譜。
        2. 明顯例子，（（<?1>宗量 的）力的）不可觸力譜。