

ДЗ: 1966 (замена второго типа), 1996, 2011 а) и посчитать $\int \sin^6 x dx$, 2025 (тангенс половинного угла), 2029 (обычный тангенс), 2043, 2046.

Подстановки Эйлера

Задача 1. (Д1966)

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$$

□ См. в семинаре 6. ■

Интегрирование тригонометрических функций

Использование формул понижения степени

Задача 2. (Д1996)

$$\int \sin^5 x \cos^5 x dx$$

□

$$\begin{aligned} \int \sin^5 x \cos^5 x dx &= \int \sin^5 x \cos^4 x d(\sin x) = \int t^5 (1 - t^2)^2 dt = \frac{t^6}{6} - 2\frac{t^8}{8} + \frac{t^{10}}{10} + C = \\ &= \sin^6 x \cdot \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{4} \sin^2 x + \frac{1}{10} \sin^4 x \right) + C \end{aligned}$$

Либо можно решить через формулы понижения:

$$\begin{aligned} 2 \sin x \cos x = \sin 2x &\Rightarrow \int \sin^5 x \cos^5 x dx = \frac{1}{2^5} \int \sin^5 2x dx = \frac{1}{32} \int (1 - \cos^2 2x)^2 \sin 2x dx = \\ &= -\frac{1}{64} \int (1 - \cos^2 2x)^2 d(\cos 2x) = -\frac{1}{64} \left(\int dy - 2 \int y^2 dy + \int y^4 dy \right) = \\ &= -\frac{\cos 2x}{64} + \frac{\cos^3 2x}{96} - \frac{\cos^5 2x}{320} + C \end{aligned}$$
■

Интегрирование по частям

Задача 3. (Д2011 а)) Вывести формулу понижения для интеграла:

$$I_n = \int \sin^n x dx$$

и с помощью формулы вычислить:

$$\int \sin^6 x dx$$

□

$$\begin{aligned}
\int \sin^n x dx &= - \int \sin^{n-1} x d(\cos x) = - \sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \cdot \int \sin^{n-2} x \cos^2 x dx = \\
&= - \sin^{n-1} x \cos x + (n-1)(I_{n-2} - I_n) \Rightarrow nI_n = - \sin^{n-1} x \cos x + (n-1)I_{n-2} \Rightarrow \\
&\Rightarrow I_n = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{(n-1)}{n} I_{n-2}
\end{aligned}$$

Посчитаем конкретный пример при $n = 6$:

$$\begin{aligned}
I_6 &= -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x + \frac{5}{6} \cdot \left(-\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} \cdot \int \sin^2 x dx \right) \\
\int \sin^2 x dx &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C
\end{aligned}$$

■

Интегрирование рациональных тригонометрических функций

Задача 4. (Д2025)

$$\int \frac{dx}{2 \sin x - \cos x + 5}$$

□ Ни один из описанных случаев нам не подходит, поэтому воспользуемся заменой тангенса половинного угла:

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \Rightarrow \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Это верно, поскольку:

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = 2 \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2 \operatorname{arctg} t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Таким образом:

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{2 \sin x - \cos x + 5} &= \int \frac{2dt}{1+t^2} \cdot \frac{1}{\frac{4t}{1+t^2} - \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} = \int \frac{2dt}{4t - 1 + t^2 + 5 + 5t^2} = \\
&= \int \frac{2dt}{6t^2 + 4t + 4} = \int \frac{dt}{3t^2 + 2t + 2} = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{2}{3}t + \frac{1}{9} + \frac{5}{9}} = \frac{1}{3} \int \frac{d\left(t + \frac{1}{3}\right)}{\left(t + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{5}{9}} = \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \left(\frac{3t+1}{\sqrt{5}} \right) + C = \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \left(\frac{3 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{5}} \right) + C
\end{aligned}$$

■

Задача 5. (Д2029)

$$\int \frac{\sin^2 x}{1 + \sin^2 x} dx$$

□ Здесь подходят замены второго типа: $t = \operatorname{tg} x$, тогда:

$$\begin{aligned} x = \operatorname{arctg} t, dx &= \frac{1}{1+t^2} dt, \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2} \Rightarrow \int \frac{\sin^2 x}{1 + \sin^2 x} dx = \int dx - \int \frac{dx}{1 + \sin^2 x} = \\ &= x - \int \frac{dt}{(1+t^2) \cdot \left(1 + \frac{t^2}{1+t^2}\right)} = x - \int \frac{dt}{1+2t^2} = x - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{1}{2}} = x - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \operatorname{arctg}(\sqrt{2}t) + C = \\ &= x - \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}(\sqrt{2} \operatorname{tg} x) + C \end{aligned}$$

■

Задача 6. (Д2043)

$$\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx$$

□ Применим формулу из задачи 2042:

$$\begin{aligned} \int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx &= \int \frac{pf(x) + qf'(x)}{f(x)} dx = px + q \ln |f(x)| + C \\ f(x) &= 1 \cdot \sin x + 2 \cdot \cos x, f'(x) = 1 \cdot \cos x - 2 \cdot \sin x \Rightarrow \\ \Rightarrow p \sin x + 2p \cos x + q \cos x - 2q \sin x &= \sin x - \cos x \Rightarrow p - 2q = 1, 2p + q = -1 \Rightarrow \\ \Rightarrow p = -\frac{1}{5}, q = -\frac{3}{5} \Rightarrow \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx &= -\frac{x}{5} - \frac{3}{5} \ln |\sin x + 2 \cos x| + C \end{aligned}$$

■

Задача 7. (Д2046) Доказать, что:

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a \sin x + b \cos x + c} dx = Ax + B \ln |a \sin x + b \cos x + c| + C \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$$

где A, B, C - некоторые постоянные коэффициенты

□ По аналогии с задачей 2042, введём обозначения:

$$f(x) = a \sin x + b \cos x + c, f'(x) = -b \sin x + a \cos x$$

Векторы $f(x), f'(x)$ и $1 \in \mathbb{R}$ - линейно независимы и образуют базис:

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a^2 + 0 + 0 - 0 - (-b)b - 0 = a^2 + b^2 \Rightarrow a \neq 0 \vee b \neq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 > 0$$

Тогда, вектор написанный сверху можно выразить через $f(x), f'(x)$ и 1 с некоторыми коэффициентами:

$$\begin{aligned} \int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a \sin x + b \cos x + c} dx &= \int \frac{A \cdot f(x) + B \cdot f'(x) + C \cdot 1}{f(x)} dx = A \int \frac{dx}{f(x)} + B \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} + C \int \frac{dx}{f(x)} = \\ &= Ax + B \ln |f(x)| + C \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} \end{aligned}$$

■